

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### ANGIN-HEEL SD comprimate

*Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Angin-Heel SD și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Angin-Heel SD
3. Cum să utilizați Angin-Heel SD
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Angin-Heel SD
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE ANGIN-HEEL SD ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Angin-Heel SD este un medicament homeopat, care se utilizează în tratamentul simptomatic complex al tonzilitelor (inflamarea amigdalelor) și faringitelor (inflamarea faringelui).

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ANGIN-HEEL SD**

##### **Nu utilizați Angin-Heel SD:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6)

##### **Atenționări și precauții**

Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

##### **Copii**

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

##### **Angin-Heel SD împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost stabilite interacțiuni medicamentoase; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

##### **Angin-Heel SD împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Ca și orice medicament homeopat, Angin-Heel SD nu trebuie administrat în timpul meselor. Se va administra cu 15-20 minute înainte de mese, sau cu o oră după acestea.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor în acest medicament este foarte mică, acest medicament nu este cunoscut de a fi toxic în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare. Nu au fost observate reacții adverse.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu au fost raportate efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje; acestea sunt puțin așteptate, datorită concentrației foarte mici a componentelor preparatului.

### **3. CUM SĂ UTILIZAȚI ANGIN-HEEL SD**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

#### **Doza standard:**

Adulți și copiii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copiii cu vârsta sub 2 ani: 1 comprimat 1 dată pe zi.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1 comprimat de 1-2 ori pe zi.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat de 2 ori pe zi.

#### **Doza în debut acut al maladiei sau doza inițială:**

Adulți și copiii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copiii cu vârsta sub 2 ani: 1 comprimat la fiecare 1 – 2 ore, până la 4 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: 1 comprimat la fiecare 1 – 2 ore, până la 6 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: 1 comprimat la fiecare 1 – 2 ore, până la 8 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

#### **Mod de administrare**

Este recomandat de a menține comprimatul în cavitatea bucală până la dizolvare și apoi de a înghiți. Pentru a fi administrat copiilor, este posibil de a tritura comprimatul, iar pulberea rezultată se va dizolva într-o cantitate mică de apă. Preparatul trebuie luat în afara meselor.

În funcție de cursul maladiei și a stării pacientului, medicul poate modifica durata curei de tratament și modul de administrare.

#### **Dacă utilizați mai mult Angin-Heel SD decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

#### **Dacă uitați să utilizați Angin-Heel SD**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să utilizați Angin-Heel SD**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, au fost raportate următoarele reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) la persoanele care au utilizat Angin-Heel SD.

- apariția unor pete roșii pe piele.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ ANGIN-HEEL SD**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

##### **Ce conține Angin-Heel SD**

1 comprimat conține:

*Substanțe active :*

Apis mellifica	D 4	30 mg
Arnica montana	D 4	30 mg
Atropa bella-donna	D 4	60 mg
Hepar sulfuris	D 6	60 mg
Hydrargyrum bicyanat	D 8	30 mg
Phytolacca americana	D 4	30 mg

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, stearat de magneziu.

##### **Cum arată Angin-Heel SD și conținutul ambalajului**

Angin-Heel SD se prezintă sub formă de comprimate rotunde, cu margini teșite, de culoare de la alb la alb-gălbui, fără miros.

##### **Conținutul ambalajului**

Câte 50 de comprimate ambalate în flacon din plastic. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în curție de carton.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 485

e-mail: info@heel.com

#### **Fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

**Acest prospect a fost aprobat în iulie 2017.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>