

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Anuzol-Farmaprim supozitoare

xeroform, sulfat de zinc heptahidrat, extract uscat din frunze de beladonă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Anuzol-Farmaprim și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Anuzol-Farmaprim
3. Cum să utilizați Anuzol-Farmaprim
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Anuzol-Farmaprim
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Anuzol-Farmaprim și pentru ce se utilizează

Anuzol-Farmaprim face parte din grupa medicamentelor antihemoroidale pentru utilizare locală. Este o combinație de trei substanțe active: xeroform, sulfat de zinc heptahidrat și extract uscat din frunze de beladonă ce manifestă acțiune spasmolitică, analgezică, antiinflamatoare, antiseptică, astringentă (efect de strângere a țesuturilor, de oprire a hemoragiilor capilare, de scădere a secrețiilor glandelor și mucoaselor) și sicativă (de uscare).

Anuzol-Farmaprim se utilizează pentru tratarea hemoroizilor și fisurilor anale.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Anuzol-Farmaprim

Nu utilizați Anuzol-Farmaprim

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți afecțiuni obstructive gastrointestinale;
- dacă aveți atonie intestinală (scăderea tonusului musculaturii intestinale);
- dacă aveți colită ulcerativă (inflamație a intestinului cu ulcere) în fază acută;
- dacă aveți anumite afecțiuni ale inimii cum sunt: insuficiența cardiacă, tulburări de ritm;
- dacă suferiți de miastenie (slăbiciune musculară);
- dacă aveți glaucom (presiune intraoculară crescută) cu unghi închis;
- dacă suferiți de hiperplazie benignă a prostatei;
- dacă sunteți însărcinată sau alăptați;
- dacă aveți vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți neuropatie vegetativă (afectarea anumitor nervi care controlează organele interne);
- hipertireoză (hiperactivitate a glandei tiroide);
- insuficiență cardiacă cronică;
- stenoză mitrală (îngustarea orificiului mitral);
- probleme ale rinichilor;
- hernie hiatală (o porțiune din stomac protruzează prin diafragm);
- esofagită de reflux (când conținutul acid din stomac se întoarce în esofag);
- febră;
- dacă sunteți în tratament cu alte medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos central (anestezice, antidepresive, antipsihotice, sedative).

Copii și adolescenți

Anuzol-Farmaprim nu se administrează la copii și adolescenți.

Anuzol-Farmaprim împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu trebuie să utilizați concomitent cu:

- alte medicamente cu acțiune anticolinergică,
- antidepresive triciclice (medicamente pentru tratamentul depresiei cum sunt imipramina, amitriptilina, clomipramina);
- medicamente care cresc frecvența contracțiilor cardiace (inclusiv procainamida);
- inhibitori de monoaminooxidază (MAO);
- glicozide cardiace (digoxină, digitoxină, strofantină);
- medicamente care conțin etanol (alcool etilic).

Pe perioada tratamentului evitați consumul de alcool.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a administra acest medicament.

Anuzol-Farmaprim este contraindicat în timpul sarcinii și alăptării. Dacă tratamentul este absolut necesar, alăptarea trebuie întreruptă.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În timpul tratamentului se recomandă precauție în cazul conducerii vehiculelor, folosirii utilajelor sau la exercitarea altor activități, care necesită atenție sporită, reacții psihomotorii rapide și o vedere bună.

Informații importante privind unele componente ale Anuzol-Farmaprim

Anuzol-Farmaprim conține lanolină anhidră, care poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Anuzol-Farmaprim

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare

Anuzol-Farmaprim se administrează rectal profund după clismă evacuatoare sau scaun fiziologic.

Doze

Doza recomandată este de 1-3 supozitoare pe zi.
Doza maximă nictemerală - 7 supozitoare.
Durata tratamentului constituie 10-14 zile.

Dacă utilizați mai mult Anuzol-Farmaprim decât trebuie

În cazul în care v-ați administrat o doză mai mare decât cea recomandată, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Anuzol-Farmaprim

Dacă ați omis o doză, utilizați-o cât mai curând posibil, cu excepția cazului în care se apropie ora pentru următoarea doză.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Anuzol-Farmaprim

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

1) Pe durata tratamentului pot apărea reacții adverse severe:

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):

- reacții alergice.

În cazul apariției unor astfel de reacții adverse severe opriți utilizarea de Anuzol-Farmaprim și adresați-vă IMEDIAT medicului dumneavoastră.

2) Alte reacții adverse care pot să apară:

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):

- dureri de cap, dereglări de somn, somnolență, amețeli;
- midriaza (dilatarea pupilelor), paralizia acomodatiei (pierderea capacității de acomodare), incapacitatea de a tolera lumina;
- bătăi rapide și/sau neregulate ale inimii;
- gură uscată, constipații, diaree;
- dificultate de a urina;
- senzație de arsură în zona anală.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Anuzol-Farmaprim

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!
A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Anuzol-Farmaprim

- Substanțele active sunt xeroform (tribromofenat de bismut), sulfat de zinc heptahidrat, extract uscat din frunze de beladonă. Un supozitor conține xeroform (tribromofenat de bismut) 100 mg, sulfat de zinc heptahidrat 50 mg, extract uscat din frunze de beladonă 30 mg.
- Celelalte componente sunt: lanolină anhidră, alcool etilic 96 %, apă purificată, gliceride solide de semisinteză.

Cum arată Anuzol-Farmaprim și conținutul ambalajului

Supozitoare de formă cilindro-conică de culoare de la galben-verzui până la verde sau de la galben până la cafeniu-deschis, cu miros caracteristic de xeroform, cu suprafața lucioasă și/sau mată.

Se admite prezența unor inserări de culoare închisă.

Anuzol-Farmaprim este disponibil în cutii de carton cu 2 blistere din folie PVC/PE a câte 5 supozitoare împreună cu prospectul.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

FARMAPRIM SRL

str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,

Republica Moldova, MD-4829

telefon (+373 22) 28-18-45

fax (+373 22) 28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md

Acest prospect a fost aprobat Decembrie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>