

**Prospect: Informații pentru consumator/pacient**  
**DECASAN 0,2 mg/ml soluție cutanată**  
*Decametoxină*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Decasan și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Decasan
3. Cum să utilizați Decasan
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Decasan
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE DECASAN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Decasan conține în calitate de substanță activă decametoxina, care este un medicament cu acțiune împotriva bacteriilor, fungilor, protozoarelor și virusurilor.

Decametoxina este înalt activă față de microorganismele rezistente la antibiotice.

Practic nu se absoarbe de pe mucoase, pielea intactă și suprafața plăgilor.

Decasan se utilizează pentru tratamentul afecțiunilor inflamatoare purulente bacteriene și fungice ale pielii și țesuturilor moi; afecțiunilor stomatologice; afecțiunilor tractului respirator și plămânilor, amigdalitei, portajului de stafilococi, afecțiunilor intestinului.

În practica ginecologică Decasan se utilizează pentru tratamentul candidozei vaginale, afecțiunilor inflamatoare genitale de origine microbiană, sanarea căilor de naștere, tratarea infecțiilor după naștere.

De asemenea Decasan se utilizează pentru dezinfectarea igienică a pielii mâinilor personalului medical în timpul examinării pacienților, efectuării manoperelor medicale și a intervențiilor chirurgicale minore cu scop de prevenire a dezvoltării infecțiilor.

**2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI DECASAN**

**Nu utilizați Decasan:**

- dacă aveți alergii (hipersensibilitate) la componentele medicamentului;
- împreună cu săpunurile și alți compuși anionici.

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Administrarea îndelungată a Decasan nu provoacă reacții toxice.

Încălzirea medicamentului până la 38 °C înainte de administrare sporește eficacitatea lui.

În caz de manifestări inflamatoare și iritări cutanate medicamentul se dizolvă cu apă distilată în raport de 1:1 sau 1:2.

*Copii și adolescenți*

Lipsește date privind administrarea la copii.

### **Decasan împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați luat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

### **Sarcină și alăptare**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu sunt atenționări privind administrarea în sarcină și perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor**

Nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI DECASAN**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră, dacă nu sunteți sigur.

În afecțiuni cutanate purulente și fungice, răni supurate soluția se utilizează sub formă de lavaje și aplicații. Pentru tratamentul proctitei și a colitei ulceroase soluția caldă se administrează sub formă de clisme câte 50-100 ml de 2 ori pe zi până la atenuarea completă a semnelor de inflamație acută. Fistulele în paraproctita cronică se spală cu Decasan zilnic timp de 3-4 zile. Pentru instilări în vezica urinară la adulți soluția de decametoxină se utilizează după diluarea prealabilă cu apă purificată în raport de 1:7 în doza de 500-600 ml (7-20 instilări pentru o cură de tratament).

În afecțiuni ale mucoasei cavității bucale se efectuează aplicații câte 25-50 ml pentru o durată de 10-15 min, sau gargarisme (100-150 ml). În forma distrofico-inflamatoare a paradontozei de grad I-II în faza de acutizare se efectuează irigații ale pungilor gingivale patologice cu soluție caldă (50-70 ml) sau aplicații pe gingii până la atenuarea fenomenelor inflamatoare. În candidoza mucoasei cavității bucale, gingivita ulcero-necrotizantă se efectuează gargarisme ale cavității bucale (100-150 ml) de 4 ori pe zi timp de 5-10 zile.

Tratamentul candidozei amigdalelor palatine, tonsilitei cronice se efectuează prin lavajul lacunelor (50-75 ml la un lavaj).

Sanarea purtătorilor de stafilococi, de corinebacterii difterice se efectuează prin gargarisme ale faringelui, lavajul lacunelor, irigații ale nazofaringelui, amigdalelor. Lacunele se spală de 3-5 ori pe o zi.

În abces pulmonar, boala bronșiectatică, hipoplazie pulmonară chistică, complicată cu supurare, bronșită cronică în faza de acutizare Decasan se administrează endobronhial:

- prin microtraheostomă câte 25-50 ml de 1-2 ori pe zi;
- prin cateter transnazal câte 5-10 ml 1 dată pe zi;
- lavajul arborelui traheo-bronșic cu 100 ml soluție.

Durata curei de tratament – 2-4 săptămâni.

Pentru tratamentul afecțiunilor microbiene, fungice și tricomonazice ale mucoasei vaginale Decasan se utilizează sub formă de instilări (50-100 ml soluție încălzită până la 38 °C de 3 ori pe zi). Similar se efectuează sanarea prepartum a căilor de naștere (o singură dată). Tratamentul endometritei postpartum se efectuează prin lavajul cavității uterine cu soluție caldă de medicament (150-200 ml) de 2 ori pe zi.

Dezinfectarea igienică a pielii mâinilor personalului medical în timpul examinării pacienților, efectuării manoperelor medicale și a intervențiilor chirurgicale minore cu scop de prevenire a dezvoltării infecțiilor.

Dacă aveți impresia că efectul soluției Decasan este prea puternică sau prea slabă, discutați cu medicul dumneavoastră.

### **Dacă utilizați mai mult Decasan decât trebuie**

Din cauza lipsei absorbției sistemice cazuri de supradozare nu s-au semnalat.

### **Dacă ați uitat să utilizați Decasan**

Dacă ați uitat să utilizați o doză de Decasan, medicamentul se va utiliza de cum vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, utilizați-o doar pe aceasta și continuați să utilizați medicamentul cu intervale obișnuite între doze. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să luați Decasan**

Spuneți medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Decasan poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Foarte rare (pot apărea până la 1 din 10 000 pacienți):*

- hipersensibilitate individuală, inclusiv erupții cutanate, senzația de arsură, uscăciune, mâncărime și alte reacții alergice locale după administrarea a medicamentului;
- la administrarea endobronhială poate apărea senzație de arsură în piept, care dispare de sine stătător peste 20-30 min după finisarea procedurii.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ DECASAN**

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se congela.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP".

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține Decasan**

- *Substanța activă* este decametoxina.

1 ml soluție conține 0,2 mg decametoxină.

- *Celelalte componente sunt:* clorură de sodiu, apă pentru injecții.

**Cum arată Decasan și conținutul ambalajului**

Decasan se prezintă sub formă de lichid transparent incolor.

Decasan este disponibil în flacoane din sticlă care conțin câte 200 și 400 ml soluție.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina,  
str. N. Amosov 10, 03680, or. Kiev.

**Fabricantul**

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina,  
str. Kobzarskaya 108, 18030, or. Cerkassy, reg. Cerkassy.

**Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2023**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>