

Echinacea purpurea

tinctura

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luăți întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct.4
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Echinacea și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Echinacea
3. Cum să utilizați Echinacea
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Echinacea
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE ULEI DE ECHINACEA ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Echinacea face parte din grupa farmacoterapeutică- biostimulatori (imunomodulatori).

Este utilizată pentru:

- imunitate redusă cauzată de diverse cauze (tratamentul antibiotic pe termen lung, răcirea sistematică, supraîncălzirea, radiația antitumorală crescută, chimioterapia, stresul acut și cronic, stresul fizic și neuropsihic, sarcina excesivă);
- frecvente răcelile și gripă;
- boli infecțioase (prevenirea și tratamentul);
- oboseală cronică.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ECHINACEA

Nu utilizați Echinacea

- hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1;
- dacă aveți tuberculoză;
- dacă aveți leucemie;
- dacă aveți scleroză multiplă;
- dacă aveți boli autoimune;
- copii cu vârsta sub 12 ani.

Aveți grijă deosebită când utilizați Echinacea

Înainte să luați Echinacea, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nu încalcă regulile de utilizare a medicamentului.

Medicamentul trebuie utilizat cu prudență la pacienții predispuși la reacții alergice.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Preparatul nu se administrează în timpul sarcinei și perioada de alăptare deoarece conține etanol 40 %.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul conține etanol 40 %, de aceea este necesară precauție în timpul conducerii autovehiculelor sau manevrării utilajelor potențial periculoase.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI ECHINACEA

Luăți întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

A se agita înainte de utilizare.

Administrarea orală

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani, 25-35 picături de 3 ori pe zi înainte de mese. Durata medie a tratamentului este de 2-3 săptămâni. Efectuarea unui al doilea curs este posibil după consultarea unui medic.

Dacă ați utilizat mai mult Echinacea de câțiva decât trebuie

Dacă depășiți doza recomandată sau durata de utilizare a tincturii de echinacee, puteți dezvolta simptome de disfuncție a tractului gastro-intestinal (greață, vărsături), agitație nervoasă crescută, tulburări de somn, reacții alergice.

În cazul supradozajului, întrerupeți utilizarea medicamentului și luați imediat măsuri de terapie simptomatică și de susținere (în funcție de starea clinică a pacientului).

Adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau mergeți la spitalul cel mai apropiat, dacă ați luat mai mult decât v-a fost recomandat de către medic.

Dacă ați uitat să luați Echinacea

Luăți următoarea doză când vă amintiți. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Preparatul de obicei este bine tolerat, însă la pacienții cu hipersensibilitatea e posibilă dezvoltarea reacțiilor alergice (hiperemie cutanată, erupții, prurit etc.), necesitând întreruperea tratamentului.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amed.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ECHINACEA

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejerea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Echinacea

1 flacon conține: extract din echinacea purpurea rizom cu rădăcini (1:5) – 40 ml.

Excipienților: etanol

Cum arată Echinacea și conținutul ambalajului

Tinctura. Câte 40 ml în flacon.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

«DKP «Fabrica farmaceutică» SRL,
Ucraina,12430, regiunea Jitomir,
r-l Jitomir, s. Stanishovka, str. Coroliova,4.

Fabricantul

«DKP «Fabrica farmaceutică» SRL,
Ucraina,12430, regiunea Jitomir,
r-l Jitomir, s. Stanishovka, str. Coroliova, 4.

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>