

**Prospect: Informații pentru consumator/pacient**  
**Faringosept Lămâie 10 mg comprimate de supt**  
*Ambazonă*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct.4.
- Dacă după 3-4 zile zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Faringosept Lămâie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Faringosept Lămâie
3. Cum să utilizați Faringosept Lămâie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Faringosept Lămâie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Faringosept Lămâie și pentru ce se utilizează**

Faringosept Lămâie comprimate de supt este un medicament antiseptic și aparține grupului de medicamente pentru zona oro-faringiană.

Faringosept Lămâie se utilizează la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 14 ani ca adjuvant în infecții acute cu poartă de intrare sau localizare la nivelul cavității bucale și faringelui: gingivite, faringite, amigdalite și după amigdalectomie (îndepărtarea amigdalelor pe cale chirurgicală).

Dacă după 3-4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Faringosept Lămâie**

**Nu utilizați Faringosept Lămâie:**

- dacă sunteți alergic la ambazonă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Faringosept Lămâie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Se recomandă ca pacienții cu diabet zaharat să evite utilizarea acestui medicament datorită conținutului în zahăr. Valoarea energetică a zahărului este similară cu a lactozei: 3,94 kcal/gram (16,5 kJ/gram).

**Faringosept Lămâie împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu s-au raportat interacțiuni ale Faringosept Lămâie cu alte medicamente.

### **Faringosept Lămâie împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Faringosept Lămâie se administrează imediat după mese (la 15-30 minute); se recomandă ca timp de 2-3 ore după administrare să se evite consumul de alimente sau lichide (vezi pct. “Cum să utilizați Faringosept Lămâie”).

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu utilizați Faringosept Lămâie în timpul sarcinii și alăptării numai dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Faringosept Lămâie nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Faringosept Lămâie conține zahăr și lactoză**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

## **3. Cum să utilizați Faringosept Lămâie**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală este de 3 - 5 comprimate Faringosept Lămâie (30 - 50 mg ambazonă) pe zi, timp de 3 - 4 zile.

Comprimatele de Faringosept Lămâie nu se înghit, ci se lasă să se dizolve lent în cavitatea bucală. Faringosept Lămâie se administrează imediat după mese (la 15-30 minute); se recomandă ca timp de 2-3 ore după administrare să se evite consumul de alimente sau lichide.

Nu depășiți doza recomandată. Dacă simptomele persistă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

### **Utilizare la copii și adolescenți**

Doza recomandată pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani este de 1 comprimat Faringosept Lămâie de 3 ori pe zi (30 mg ambazonă), timp de 3-4 zile.

Datorită lipsei unor informații suficiente privind siguranța în administrare, Faringosept Lămâie nu este recomandat la copii cu vârsta sub 14 ani.

### **Dacă utilizați mai mult Faringosept Lămâie decât trebuie**

Dacă ați luat mai multe comprimate decât v-a fost recomandat, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj cu Faringosept Lămâie.

Nu există antidot pentru ambazonă. În cazul ingerării unei doze foarte mari de Faringosept Lămâie, adresați-vă celei mai apropiate unități de primire a pacienților; se recomandă provocarea de vărsături și/sau lavaj gastric.

### **Dacă uitați să utilizați Faringosept Lămâie**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați doza următoare la ora stabilită.

### **Dacă încetați să luați utilizați Faringosept Lămâie**

Dacă întrerupeți tratamentul prea devreme, este posibil ca infecția din organismul dumneavoastră să persiste.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

S-au raportat reacții de hipersensibilitate, inclusiv edem al feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului, care pot determina dificultăți la înghițire sau respirație, urticarie, mâncărime, înroșirea feței și/sau erupții cutanate pe tot corpul.

Nu mai luați Faringosept Lămâie și consultați un medic imediat, dacă observați oricare dintre reacțiile adverse grave menționate mai sus – este posibil să aveți nevoie de tratament medical de urgență.

A fost de asemenea raportat un caz de colorare a salivei la utilizarea de ambazonă.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Faringosept Lămâie**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

**Ce conține Faringosept Lămâie**

- *Substanța activă* este ambazonă monohidrat.  
Fiecare comprimat de supt conține ambazonă monohidrat 10 mg.
- *Celelalte componente sunt:* zahăr, lactoză monohidrat, ciocolată, povidonă K 30, acid stearic, aromă de lămâie.

### **Cum arată Faringosept Lămâie și conținutul ambalajului**

Faringosept Lămâie se prezintă sub formă de comprimate de supt plate, de formă cilindrică, cu margini intacte, de culoare maro cu suprafețe pigmentate, marcate pe o față cu „L”.

Faringosept Lămâie este disponibil în cutii cu 1 blister sau 2 blistere din Al/PVC-PE-PVDC transparent incolor a câte 10 comprimate de supt fiecare.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Sun Pharmaceutical Industries Limited,  
Sun House, 201 B/1,  
Western Express Highway,  
Goregaon (E), Mumbai – 400063, India

#### **Fabricantul**

S.C. Terapia S.A.  
Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, România

**Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2018.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>