

Prospect: informații pentru consumator/pacient

Furagin 50 mg comprimate

Furazidină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Furagin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Furagin
3. Cum să utilizați Furagin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Furagin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Furagin și pentru ce se utilizează

Substanța activă a medicamentului Furagin – furagina (furazidina) - aparține unui grup de medicamente numite derivați de nitrofuran.

Furagin este un medicament antibacterian cu acțiune bacteriostatică (care oprește creșterea bacteriilor), activ împotriva microorganismelor gram-pozitive (*Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus faecalis*) și gram-negative (*Enterobacteriaceae* - *Salmonella*, *Shyella*, *Proteus*, *Klebsiella spp*, *Escherichia coli*, *Enterobacter etc.*).

Furagin se utilizează în caz de:

- infecții acute și cronice ale căilor urinare (pielonefrită, cistită, uretrită), prostatită (inflamația prostatei);
- infecții postoperatorii ale sistemului urogenital (pielonefrită postoperatorie, cistită, prostatită).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Furagin

Nu luați Furagin:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la furagină (furazidină), derivați de nitrofuran și/sau oricare dintre excipienți ai acestui medicament (enumerați la pct.6);
- dacă aveți insuficiență renală severă (rata filtrării glomerulare sub 30 ml/min);
- dacă suferiți de afecțiuni ale nervilor periferici (polineuropatie, inclusiv diabetică);
- dacă aveți deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază (risc de distrugere a eritrocitelor);
- dacă suferiți de porfirie (o maladie ereditară rară de dereglare a metabolismului);

- dacă sunteți gravidă;
- dacă alăptați;
- copiilor cu vârsta sub 6 ani (pentru formă farmaceutică dată).

Nu este recomandată administrarea medicamentului în sepsis urinar și infecții ale parenchimului renal.

Atenționări și precauții

Aveți grijă deosebită când utilizați Furagin

Înainte să utilizați Furagin, adresați-vă medicului dumneavoastră în caz dacă aveți sau ați avut:

- dereglări ale funcției renale (dacă aveți insuficiență renală severă, administrarea medicamentului este contraindicată),
- anemie (număr scăzut de globule roșii în sânge),
- deficit de vitamine ale grupului B și acid folic,
- boli pulmonare,
- dacă luați Furagin timp îndelungat se poate dezvolta neuropatie periferică (dureri, tulburări de sensibilitate în regiunea nervului respectiv),
- dacă aveți diabet zaharat, medicamentul poate contribui la dezvoltarea polineuropatiei.

În cadrul studiilor experimentale și observațiilor clinice a pacienților s-a stabilit ca nitrofuranii (inclusiv Furagin) afectează în mod negativ funcția testiculară, care se manifestă sub formă de număr scăzut de spermatozoizi și de material seminal, reducerea motilității spermatozoizilor și modificări patologice ale morfologiei acestora.

În cazul utilizării îndelungate medicul dumneavoastră vă poate recomanda efectuarea periodică a controlului numărului de globule albe (leucocite) în sânge, a indicilor funcției ficatului și rinichilor, precum și a funcției plămânilor, în special la pacienții cu vârsta mai mare de 65 ani.

Dacă pe parcursul tratamentului apare diaree (scaun lichid), se recomandă consultarea imediată a medicului.

Investigațiile de laborator la pacienții care iau Furagin pot prezenta reacții fals-pozitive la prezența glucozei în urină, dacă pentru determinare este utilizată o metodă bazată pe reducerea cuprului. Furagin nu influențează rezultatele determinării glucozei în urină prin metode enzimatic.

Furagin împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați alte medicamente.

Remediile care alcalinizează urina reduc efectul terapeutic al Furagin (acelerează eliminarea urinară).

Remediile care acidifică urina (acizii, inclusiv acidul ascorbic; clorură de calciu) măresc concentrația urinară a Furagin (se încetinește eliminarea medicamentului pe cale renală), efectul terapeutic se potențează, însă se mărește și riscul dezvoltării efectelor toxice.

Nu se recomandă administrarea concomitentă a Furagin cu cloramfenicol, ristomicină (antibiotice), sulfanilamide (remedii antibacteriene) - risc de deprimare a hematopoiezei.

Nitrofuranii manifestă acțiune antagonistă (inversă) față de chinolone (remedii antibacteriene ca acid nalidixic, acid oxolinic, norfloxacină), de aceea, se recomandă evitarea administrării concomitente a acestor medicamente.

Probenecidul și sulfpirazona (medicamente utilizate în gută) reduc eliminarea Furagin, majorând riscul dezvoltării efectelor adverse și a fenomenelor toxice.

Antiacidele (medicamente care neutralizează aciditatea gastrică) cu conținut de trisilicat de magneziu reduc absorbția Furagin.

La pacienții cu insuficiență renală nu se recomandă administrarea concomitentă a Furagin cu aminoglicozide (antibiotice).

Furagin împreună cu alcool

În timpul tratamentului nu se recomandă consumul de alcool, din cauza posibilității de apariție a reacțiilor adverse (bătăi prea rapide ale inimii, dureri în regiunea inimii, dureri de cap, greață, vomă, convulsii, tensiune arterială scăzută, senzație de căldură și frică).

Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Utilizarea Furagin în timpul sarcinii și în perioada de alăptare este contraindicată.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de conducere a vehiculelor și de folosire a utilajelor.

Informații importante despre unii excipienți

Furagin conține lactoză monohidrat și zaharoză.

Dacă medicul v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, consultați medicul înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Furagin

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur.

Doze

Adulți: câte 100-200 mg (2-4 comprimate) de 2-3 ori pe zi.

Cura de tratament constituie 7-10 zile. La necesitate, tratamentul se repetă peste 10-15 zile.

Doza zilnică maximă – 600 mg.

Pentru profilaxia infecțiilor cronice ale sistemului urogenital se administrează câte 50 mg pe zi.

Utilizarea la copii și adolescenți

Copii cu vârsta peste 6 ani: în infecții acute doza zilnică constituie 5-8 mg/kg masă corporală, divizată în 3-4 prize, timp de 7-8 zile. Dacă este necesar un tratament îndelungat, doza se reduce la 1-2 mg/kg pe zi.

Mod de utilizare

Medicamentul se utilizează oral, după mese, cu o cantitate mare de apă.

Dacă ați luat mai mult Furagin decât trebuie

Dacă ați luat o doză mai mare decât cea prescrisă, consultați medicul dumneavoastră.

Pot apărea următoarele simptome: dureri de cap, amețeli, depresie (stare de tristețe patologică), polineurită periferică (afectarea nervilor periferici), reacții alergice (urticarie, edem al feței, buzelor și gâtului cu dificultăți de respirație, spasm bronșic), greață, vărsături, anemie hemolitică (la pacienții cu deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază), anemie megaloblastică (scăderea numărului de globule roșii), foarte rar - tulburări ale funcției hepatice.

Dacă ați omis o doză de Furagin

Dacă ați uitat să luați o doză, luați doza omisă imediat ce vă amintiți și apoi continuați administrarea așa cum este indicat în acest prospect. Nu luați niciodată o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă ați încetat să luați Furagin

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar aceste reacții adverse, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat după ajutor medical:

Reacții adverse rare (pot apărea până la 1 din 1000 utilizatori):

- reacție pulmonară acută, care se dezvoltă rapid și se manifestă prin respirație îngreuiată, febră, durere în piept, tuse cu sau fără spută, creșterea numărului de eozinofile (celule albe sanguine speciale). Au mai fost raportate erupții cutanate, mâncărime, urticarie, edem angioneurotic (umflarea feței, gâtului, gurii) și dureri musculare. Reacția pulmonară acută se bazează pe o reacție de hipersensibilitate, care se poate dezvolta în câteva ore, rar în câteva minute. Reacția pulmonară acută are caracter reversibil, această dispăre după întreruperea utilizării medicamentului.

Reacția pulmonară cronică poate apărea după un tratament mai îndelungat, la sistarea administrării nitrofuranilor (inclusiv Furagin). Aceasta este caracterizată prin creșterea treptată a insuficienței de aer, accelerarea respirației, febră instabilă, creșterea eozinofilelor în sânge, tuse progresivă, pneumonită interstițială și/sau fibroză pulmonară.

Reacții adverse foarte rare (pot apărea până la 1 din 10 000 utilizatori):

- edem angioneurotic (o stare de natură alergică, care se dezvoltă brusc, caracterizată prin umflarea diferitelor părți ale corpului);

Alte reacții adverse posibile:

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot apărea până la 1 din 100 utilizatori):

- amețeli;
- somnolență;
- scăderea poftei de mâncare;
- greață.

Reacții adverse rare (pot apărea până la 1 din 1000 utilizatori):

- neuropatie periferică (afectarea nervilor periferici cu durere, senzație de furnicături);
- tulburări de vedere;
- vărsături;
- diaree (scaun lichid);
- erupție pe piele sub formă de papule;
- mâncărime;
- alopecie tranzitorie;
- slăbiciune;
- creșterea temperaturii corpului.

Reacții adverse foarte rare (pot apărea la până la 1 din 10000 utilizatori):

- tulburări hematopoietice (agranulocitoză, trombocitopenie, anemie aplastică);
- hipertensiunea intracraniană ușoară (creșterea ușoară a tensiunii intracraniene);
- pancreatită (inflamația pancreasului);
- icter colestatic
- hepatită (inflamația ficatului);
- urticarie (boală a pielii însoțită de mâncărime);
- dermatită exfoliativă (afecțiune inflamatorie a pielii, caracterizată prin înroșire și descumare a pielii);
- eritem multiform (afecțiune caracterizată prin apariția petelor edematoase roșii pe piele „în țintă” și localizate de obicei simetric pe întreg corp);
- dureri articulare.

La administrarea Furagin urina poate deveni de culoare maro.

Reacțiile adverse sunt reduse în intensitate dacă medicamentul este luat după masă, cu o cantitate mare de lichid.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Furagin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Furagin

- Substanța activă este furagina (furazidina).

Fiecare comprimat conține 50 mg furagină (furazidină).

- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb pregelatinizat, zaharoză, polisorbat 80, acid stearic.

Cum arată Furagin și conținutul ambalajului

Furagin se prezintă sub formă de comprimate rotunde, plat-cilindrice, de culoare de la galben până la galben cu nuanță oranj, cu margini teșite.

Câte 10 comprimate în blister din PVC/Aluminiu.

Cutie din carton cu 3 blistere (30 comprimate).

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Olainfarm”

str. Rupnicu 5, Olaine, LV-2114, Letonia.

Telefon: + (371) 67013705

Fax: +(371) 67013777

E-mail: olainfarm@olainfarm.com

Fabricantul

SA „Olainfarm”

str. Rupnicu 5, Olaine, LV-2114, Letonia.

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>