

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Gherpebloc 50 mg/g cremă

Aciclovir

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Gherpebloc și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Gherpebloc
3. Cum să utilizați Gherpebloc
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Gherpebloc
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Gherpebloc și pentru ce se utilizează

Gherpebloc conține substanța activă aciclovir și face parte din grupa chimioterapice de uz local, antivirale.

Gherpebloc este indicat în tratamentul infecțiilor cutanate cu virus *Herpes simplex*, incluzând herpesul genital și labial, inițial și recurent.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Gherpebloc

Nu utilizați Gherpebloc

- dacă sunteți alergic la aciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Gherpebloc, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

La pacienții sever imunodeprimați (de exemplu, pacienții cu SIDA, transplant de măduvă osoasă) trebuie luată în considerare administrarea orală de aciclovir.

Dacă sunteți gravidă, încercați să deveniți gravidă sau alăptați adresați-vă medicului dumneavoastră înainte să utilizați Gherpebloc.

Infecțiile de la nivelul pielii cu virus herpetic în primele stadii se manifestă prin înțepături, durere, înroșire și apariția unor leziuni ulcerative pe față sau buze sau genital. Gherpebloc 50 mg/g cremă

acționează prin distrugerea sau oprirea dezvoltării virusului herpetic. Acest medicament scurtează timpul până la vindecare și perioada de percepere a durerii.

Gherpebloc cremă este destinat exclusiv aplicării pe buze, față sau pe partea externă a organelor genitale și nu trebuie utilizat pe mucoase, în interiorul gurii, în jurul sau în interiorul ochilor sau intra-vaginal deoarece poate fi iritant.

Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a se evita contactul accidental cu ochii. Spălați bine cu apă caldă în cazul în care crema ajunge în mod accidental în ochi. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă considerați că este necesar.

Gherpebloc împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu amestecați Gherpebloc cu alte loțiuni sau creme pentru piele.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Gherpebloc nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Gherpebloc conține alcool cetostearilic. Poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu dermatită de contact).

Gherpebloc conține p-hidroxibenzoat de metil (E218) și p-hidroxibenzoat de n-propil (E216). Pot provoca reacții alergice (chiar întârziate) și, în mod excepțional, bronhospasm.

3. Cum să utilizați Gherpebloc

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Înainte și după aplicarea tratamentului pe zona infectată spălați-vă întotdeauna pe mâini și evitați ștergerea sau atingerea zonei infectate cu prosopul pentru a împiedica evoluția și răspândirea infecției.

Aplicați crema pe toată suprafața afectată.

În absența altor indicații ale medicului crema trebuie aplicată pe zona afectată de maxim cinci ori pe zi, la intervale de aproximativ 4 ore, cu excepția dozei nocturne. Totuși, folosiți de fiecare dată crema așa cum medicul v-a sfătuit să o faceți.

Dacă tot nu sunteți sigur cum să folosiți crema, cereți sfatul medicului sau farmacistului.

Folosiți Gherpebloc cremă pentru o perioadă de cel puțin patru zile pentru herpes labial și cinci zile pentru herpes genital. Dacă ulcerările nu s-au vindecat complet după cinci zile, folosiți cu atenție crema pentru încă cinci zile. Dacă ulcerările nu s-au vindecat după zece zile, opriți folosirea cremei și consultați medicul.

Gherpebloc cremă acționează cel mai bine atunci când este folosit de la primele semne ale bolii (furnicături sau mâncărime). Se recomandă începerea tratamentului cât mai repede posibil. Dacă aceasta este prima infecție cu virus herpes simplex, folosiți imediat crema. Dacă apar umflături herpetice în mod regulat, începeți să folosiți crema imediat ce simțiți apariția uneia. Acestea se manifestă prin senzații de înțepături, prurit sau dureri ascuțite. De asemenea puteți folosi crema imediat ce au apărut vezicule. O senzație de arsură ușoară sau usturime poate apărea imediat după aplicare.

Nu folosiți Gherpebloc în interiorul gurii sau al vaginului. Poate irita aceste zone. Nu folosiți crema pentru administrare la nivel ocular. Dacă ajunge totuși cremă, la nivelul ochilor dumneavoastră spălați cu multă apă rece. Dacă apar ulcerații sau sunteți îngrijorat informați medicul.

Dacă utilizați mai mult Gherpebloc decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. În caz de ingestie accidentală a cremei este puțin probabil să apară efecte nedorite. Totuși, supradoza accidentală repetată a unor cantități mari de cremă, de-a lungul mai multor zile poate să conducă la greață, vărsături, cefalee, confuzie.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Gherpebloc

Dacă ați uitat să utilizați o doză, efectuați următoarea aplicare imediat ce vă amintiți și continuați după schema obișnuită. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa aplicarea uitată.

Dacă încetați să utilizați Gherpebloc

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane)

- reacții de hipersensibilitate imediată, inclusiv angioedem și urticarie.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

- senzații de arsură sau înțepătură tranzitorie după aplicarea cremei.
- uscăre și descuamare cutanată ușoară.
- prurit.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

- eritem.
- dermatită de contact după aplicarea cremei. Testele de sensibilitate care au fost efectuate au arătat că sensibilitatea a fost datorată mai frecvent componentelor cremei bază decât aciclovirului.

Nu s-au înregistrat reacții adverse sistemice, deoarece după aplicarea locală de aciclovir nu are loc o absorbție sistemică semnificativă.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md/ sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Gherpebloc

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Gherpebloc

- Substanța activă este aciclovir. 1 gram de cremă conține aciclovir 50 mg.
- Celelalte componente sunt: parafină lichidă, alcool cetostearilic, octildodecanol, glicerol, p-hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216), apă purificată.

Cum arată Gherpebloc și conținutul ambalajului

Gherpebloc se prezintă sub formă de masă omogenă, semisolidă, de culoare albă, fără miros. Este disponibil în cutii cu un tub din Al a 15 g cremă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

S.C. HYPERION S.A.

șos. Nicolina 169A, 700669, Iași, Romania

Fabricantul

S.C. HYPERION S.A.

șos. Nicolina 169A, 700669, Iași, Romania

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>