

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT

Likopid 1 mg comprimate Glucozaminilmuramildipeptidă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament în conformitate cu informațiile din acest prospect sau conform indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă farmacistului.
 - Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Likopid și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Likopid
3. Cum se utilizează Likopid
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Likopid
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE LIKOPID ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Likopid comprimate se referă la grupul de medicamente numite imunostimulatoare și conține în calitate de substanță activă glucozaminilmuramildipeptida, cu acțiune de stimulare a sistemului imunitar, contribuind la combaterea infecțiilor produse de germeni diferiți.

Likopid este indicat în:

- infecții cronice, recurente ale tractului respirator superior și inferior la adulți și copii (cu vârsta peste 3 ani);
- boli purulente și inflamatorii acute și cronice ale pielii și țesuturilor moi (piodermite, furunculoză, etc.) la adulți și copii (cu vârsta peste 3 ani);
- infecție cu virus herpetic la adulți și copii (cu vârsta peste 3 ani) ;
- pentru profilaxia și reducerea incidenței sezoniere a infecțiilor respiratorii virale acute și a frecvenței agravării bolilor cronice ale organelor ORL și ale tractului respirator superior și inferior la adulți.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI LIKOPID

Nu utilizați Likopid dacă:

- Sunteți alergic la substanța activă sau la alte componente ale acestui medicament enumerate la pct. 6.
- sunteți gravidă sau alăptați;
- suferiți de inflamația tiroidei cauzată de tulburări ale sistemului imunitar (tiroidită autoimună) în faza de acutizare;
- suferiți de stări însoțite de temperatură crescută (> 38 °C) la momentul administrării medicamentului.
- suferiți de tulburări ereditare rare ale metabolismului zahărului și lactozei: alactazie, galactozemie, sindrom de malabsorbție a glucozei și galactozei, intoleranță la zaharoză, intoleranță la fructoză, deficit de sucraziomaltază.

Atenționări și precauții

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Likopid.

Copii și adolescenți

Likopid poate fi utilizat la copii și adolescenți.

Likopid împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați orice alte medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicul dumneavoastră dacă luați:

- Medicamente antimicrobiene – pentru tratamentul infecțiilor bacteriene,
- Medicamente antivirale – pentru tratamentul infecțiilor provocate de virusuri,
- Medicamente antifungice - pentru tratamentul infecțiilor provocate de ciuperci,
- Antiacide – pentru tratamentul acidității crescute a stomacului,
- Sorbenți – utilizați cu scop de dezintoxicare, pentru a încetini absorbția unor substanțe din tractul digestiv,
- Glucocorticosteroizi – pentru tratamentul bolilor inflamatorii, alergice și autoimune.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să deveniți gravidă consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua orice medicament.

Medicamentul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Likopid nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi alte utilaje potențial periculoase.

Informații importante despre unele componente ale Likopid

Conține zahăr și lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI LIKOPID

Luați întotdeauna Likopid exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Infecții cronice, recurente ale tractului respirator superior și inferior (în faza de exacerbare și în remisie): copii - 3 cure, câte 1 mg o dată pe zi sublingual, timp de 10 zile, cu o pauză între cure de 20 zile; adulți - 2 mg 1 dată pe zi sublingual, timp de 10 zile.

Afecțiuni inflamatorii-supurative acute și cronice ale pielii și țesuturilor moi (piodermite, furunculoză, etc.): copii - 1 mg o dată pe zi sublingual, timp de 10 zile; adulți - 2 mg de 2-3 ori pe zi sublingual timp de 10 zile.

Infecție herpetică: copii - 1 mg de 3 ori pe zi sublingual timp de 10 zile; adulți - 2 mg de 3 ori pe zi sublingual timp de 10 zile

Profilaxia sau reducerea incidenței sezoniere a infecțiilor respiratorii virale acute și a frecvenței exacerbării maladiilor cronice ale organelor ORL și ale tractului respirator superior și inferior: adulți - câte 1 mg de 3 ori pe zi, sublingual, timp de 10 zile.

Mod de administrare

Likopid se utilizează oral sau sublingual, pe nemâncate, cu 30 minute înainte de masă.

Dacă ați luat mai mult Likopid decât trebuie

Dacă ați luat în mod accidental prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului. În caz de supradozaj poate avea loc creșterea temperaturii corpului până la valori subfebrile (până la 37,9 °C).

Dacă ați uitat să luați Likopid

Dacă ați uitat să luați Likopid, luați doza următoare imediat ce v-ați amintit; luați doza următoare la ora obișnuită. Nu dublați doza pentru a substitui doza uitată.

Dacă ați încetat să luați Likopid

Durata tratamentului este determinată individual. Medicul sau farmacistul vă va spune cât timp trebuie să continuați tratamentul. Trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă ați decis să încetați să luați medicamentul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse frecvente (pot apărea la mai mult de 1 din 10 persoane):

La începerea tratamentului poate exista o creștere pe termen scurt a temperaturii corporale până la valori subfebrile (până la 37,9 °C), ceea ce nu reprezintă o contraindicație pentru administrarea medicamentului.

Reacții adverse rare (pot apărea la mai puțin de 1 din 1000 persoane):

Creșterea pe termen scurt a temperaturii corporale până la valori febrile (>38 °C). La ridicarea temperaturii peste 38 °C este posibilă administrarea medicamentelor cu acțiune de scădere a temperaturii corporale, ceea ce nu scade efectele farmacologice ale comprimatelor Likopid.

Reacții adverse foarte rare (pot apărea la mai puțin de 1 din 10000 persoane):

Diaree.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amed.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ LIKOPID

Nu lăsați acest medicament la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la loc uscat, protejat de lumină, la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați Likopid după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Likopid

Substanța activă este glucozaminilmuramildipeptidă (GMDP)

Fiecare comprimat conține glucozaminilmuramildipeptidă 1 mg.

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, zahăr, amidon de cartof, metilceluloză, stearat de calciu.

Cum arată Likopid și conținutul ambalajului

Comprimate rotunde, plat-cilindrice, de culoare albă, cu margini teșite.

Likopid este disponibil câte 10 comprimate în blister din PVC/Al. Câte 1 blister împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

S.A. „Peptek”, Rusia

117997, Moscova,

str. Mikluho-Maklay, 16/10

Fabricantul

S.A. „Peptek”, Rusia

117997, Moscova,

str. Mikluho-Maklay, 16/10

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>