

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Nolpaza 20 mg comprimate gastrorezistente Pantoprazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală cu ale dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi punctul 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Nolpaza și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Nolpaza
3. Cum să luați Nolpaza
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Nolpaza
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Nolpaza și pentru ce se utilizează

Nolpaza este un “inhibitor de pompă de protoni”selectiv, un medicament care scade cantitatea de acid produs de stomacul dumneavoastră. Este utilizat în tratamentul bolilor stomacului și intestinului, legate de aciditate.

Nolpaza este utilizat pentru:

Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste:

- Tratamentul simptomelor (de exemplu, senzație de arsură în capul pieptului, regurgitație acidă, durere la înghițire) asociate cu boala de reflux gastro-esofagian, cauzată de refluxul acidului din stomac.
- Tratamentul pe termen lung și prevenirea recurenței esofagitei de reflux (inflamarea esofagului, însoțită de regurgitații cu conținut acid din stomac).

Adulți:

- Prevenirea ulcerelor duodenale și gastrice cauzate de medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene (AINS, de exemplu, ibuprofen) la pacienții cu risc, care necesită tratament continuu cu AINS.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Nolpaza

Nu luați Nolpaza:

- Dacă sunteți alergic la pantoprazol, sorbitol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat în secțiunea 6);
- Dacă sunteți alergic la alte medicamente care conțin alți inhibitori ai pompei de protoni.

Atenționări și precauții

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Nolpaza.

- Dacă aveți probleme severe la nivelul ficatului. Vă rugăm să informați medicul dacă ați avut vreodată probleme cu ficatul. Medicul vă va verifica mai des enzimele produse de ficat din sângele dumneavoastră, mai ales dacă utilizați Nolpaza pentru o perioadă îndelungată. În caz de creștere a valorilor enzimelor hepatice din sânge, tratamentul trebuie întrerupt.
- Dacă trebuie să luați medicamente numite AINS în mod continuu și vi se recomandă Nolpaza, deoarece aveți un risc crescut de apariție a complicațiilor la nivelul stomacului sau intestinului. În evaluarea oricărui risc se ține seama de factorii individuali de risc, și anume vârsta (65 ani sau peste), istoric de ulcere la stomac sau duoden sau de sângerări la nivelul stomacului sau intestinului.
- Dacă aveți depozite reduse în organism sau prezentați factori de risc pentru absorbția redusă de vitamina B12 și vi se prescrie pantoprazol în terapie de lungă durată. Pantoprazol, similar tuturor medicamentelor care inhibă secreția acidă, poate reduce absorbția vitaminei B12.
- Dacă luați inhibitori de protează HIV cum ar fi atazanavir (folosit în tratamentul infecției HIV) concomitent cu pantoprazolul, cereți sfatul medicului dumneavoastră.
- Administrarea unui inhibitor al pompei de protoni, cum ar fi pantoprazolul, în special pe o perioadă mai mare de un an, vă poate crește ușor riscul de fractură la nivelul șoldului, încheieturii mâinii sau coloanei vertebrale.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți osteoporoză sau dacă luați corticosteroizi (care pot crește riscul de osteoporoză).
- Dacă luați Nolpaza mai mult de trei luni, este posibil ca nivelurile de magneziu din sângele dumneavoastră să scadă. Nivelurile scăzute de magneziu se manifestă ca oboseală, contracții involuntare ale mușchilor, dezorientare, convulsii, amețeli sau creșterea frecvenței cardiace. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, vă rugăm să-i spuneți imediat medicului dumneavoastră. Nivelurile scăzute de magneziu pot duce, de asemenea, la o scădere a nivelului de potasiu sau calciu în sânge. Medicul dumneavoastră poate decide să efectueze teste sanguine regulate pentru a vă monitoriza nivelul de magneziu.
- Dacă ați avut vreodată o reacție cutanată după tratamentul cu un medicament similar cu Nolpaza care reduce acidul gastric.
- Dacă aveți o erupție cutanată la nivelul pielii, în special în zonele expuse la soare, adresați-vă medicului dumneavoastră cât mai curând posibil, deoarece este posibil să vă întrerupeți tratamentul cu Nolpaza. Amintiți-vă să menționați, de asemenea, orice alte efecte negative cum ar fi durerea articulațiilor.
- Trebuie să aveți un test de sânge specific (Chromogranin A).

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă observați oricare dintre următoarele simptome:

- pierderea neintenționată a greutatei corporale
- vărsături, mai ales dacă se repetă
- vărsături de sânge; acestea pot avea aspect de zaț de cafea închis la culoare în vărsături
- observați sânge în scaune; care poate fi negru sau cu aspect de smoală
- dificultate la înghițire sau durere la înghițire
- aveți un aspect palid și vă simțiți slăbit (anemie)
- dureri în piept
- dureri de stomac
- diaree severă și/sau persistentă, deoarece Nolpaza a fost asociat cu o creștere ușoară a diareei de cauză infecțioasă.

Medicul dumneavoastră poate recomanda teste de diagnostic, pentru a exclude o afecțiune malignă, deoarece tratamentul cu pantoprazol poate masca simptomele afecțiunilor maligne și astfel să întârzie diagnosticul. Dacă în ciuda tratamentului, simptomele dumneavoastră persistă, sunt necesare investigații suplimentare.

Dacă luați Nolpaza în tratament de lungă durată (de peste 1 an) probabil că medicul dumneavoastră vă va ține sub supraveghere regulată. Atunci când consultați medicul, trebuie să-i spuneți despre orice simptome noi și neobișnuite care apar.

Copii și adolescenți

Acest medicament nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Alte medicamente și Nolpaza

Vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați alte medicamente.

Nolpaza poate influența eficacitatea altor medicamente, de aceea spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

- Medicamente cum sunt ketoconazolul, itraconazolul și posaconazolul (utilizate în tratamentul infecțiilor cu fungi) sau erlotinib (utilizat în tratamentul anumitor tipuri de cancer), deoarece Nolpaza 20 mg poate afecta acțiunea acestor medicamente și a altora.
- Warfarină și fenprocoumonă, care afectează îngroșarea sau subțierea sângelui. Aveți nevoie de controale suplimentare.
- Medicamente utilizate pentru tratamentul infecției HIV așa ca atazanavir.
- Metotrexat (utilizat în tratamentul artritei reumatoide, psoriazisului și c ancerului) - dacă luați metotrexat, medicul dumneavoastră vă poate opri temporar tratamentul cu Nolpaza deoarece pantoprazolul poate crește concentrațiile de metotrexat în sânge.
- Fluvoxamină (utilizată pentru tratamentul depresiei și a altor boli psihiatrice) - dacă luați fluvoxamină, medicul dumneavoastră poate reduce doza.
- Rifampicină (utilizată pentru tratamentul infecțiilor).
- Sunătoare (Hypericum perforatum) (utilizat pentru tratamentul depresiei ușoare).

Nolpaza cu alimente și băuturi

Luați comprimatele cu o oră înainte de mese, fără a le mesteca sau zdrobi, și înghițiți-le întregi, cu puțină apă.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că sunteți gravidă sau planificați o sarcină, consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Nu există date suficiente pentru utilizarea pantoprazolului la femeile gravide. A fost raportată excreția medicamentului în laptele uman. Trebuie să utilizați acest medicament numai dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiul pentru mamă este mai mare decât riscul potențial pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nolpaza nu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Dacă aveți reacții adverse cum ar fi amețeli sau tulburări de vedere, nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

Nolpaza conține sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum să luați Nolpaza

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Când și cum trebuie să luați Nolpaza

Luați comprimatele cu o oră înainte de mese, fără a le mesteca sau zdrobi, și înghițiți-le întregi, cu puțină apă.

Dacă medicul dumneavoastră nu v-a indicat altfel, doza recomandată este:

Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste

Pentru tratamentul simptomelor (de exemplu, arsuri în capul pieptului, regurgitații acide, durere la înghițit) asociate bolii de reflux gastro-esofagian

Doza recomandată este de 1 comprimat pe zi. De obicei, această doză ameliorează boala într-o perioadă de 2 - 4 săptămâni sau, maxim, după alte 4 săptămâni de tratament. Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp trebuie să continuați tratamentul. După tratament, simptomele care reapar pot fi controlate **luând câte un comprimat pe zi**, la nevoie.

Tratamentul pe termen lung și prevenirea reapariției esofagitei de reflux

Doza recomandată este de 1 comprimat pe zi. Dacă boala reapare, medicul dumneavoastră poate dubla doza, ceea ce înseamnă că puteți utiliza 1 comprimat Nolpaza 40 mg pe zi, în locul comprimatelor de 20 mg. După vindecare, puteți reduce din nou doza, la 1 comprimat de 20 mg pe zi.

Adulți:

Prevenirea ulcerelor gastro-duodenale la pacienții cu risc care necesită tratament continuu cu AINS

Doza este de 1 comprimat pe zi.

Grupe speciale de pacienți

Dacă aveți probleme severe la nivelul ficatului, nu trebuie să luați mai mult de 1 comprimat de pantoprazol 20 mg pe zi.

Utilizarea la copii și adolescenți

Copii cu vârsta sub 12 ani.

Aceste comprimate nu sunt recomandate la copiii cu vârsta sub 12 ani.

Dacă luați mai mult decât trebuie din Nolpaza

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Nu sunt cunoscute simptomele supradozajului.

Dacă uitați să luați Nolpaza

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați următoarea doză conform programului stabilit.

Dacă încetați să luați Nolpaza

Nu opriți administrarea comprimatelor fără să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Nolpaza poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse, întrerupeți administrarea acestor comprimate și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat spital de urgență:

Reacții alergice grave (frecvență rară (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)):

- umflarea limbii și/sau gâtului,
- dificultate la înghițire,
- blânde (urticarie),
- dificultăți în respirație,
- umflarea alergică a feței (edem Quincke/edem angioneurotic),
- amețeli severe cu bătăi foarte rapide ale inimii și transpirații abundente.

Afecțiuni grave ale pielii (cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)):

- apariția de vezicule pe piele și deteriorare rapidă a stării generale,
- eroziuni (inclusiv sângerare ușoară) la nivelul ochilor, nasului, gurii/buzelor sau organelor genitale (sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell, eritem polimorf)
- sensibilitate crescută la lumină.

Alte afecțiuni severe (cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)):

- îngălbenirea pielii sau albului ochilor (afectare severă a celulelor ficatului, icter) sau febră,
- erupție trecătoare pe piele și rinichi măriți, uneori cu urinare dureroasă și durere de spate (inflamație gravă a rinichilor eventual progresând până la insuficiență renală).

Dacă luați pantoprazol mai mult de 3 luni este posibil ca nivelul magneziului în sânge să scadă. Concentrațiile scăzute ale magneziului pot determina oboseală, contracții involuntare ale mușchilor, dezorientare, convulsii, amețea, creșterea frecvenței bătăilor inimii. Dacă aveți oricare dintre simptomele acestea, vă rugăm să vă adresați imediat medicului dumneavoastră. Concentrațiile scăzute ale magneziului pot de asemenea să ducă la scăderea concentrațiilor potasiului și calciului din sânge. Medicul dumneavoastră poate prescrie efectuarea regulată de teste de laborator, pentru monitorizarea nivelelor de magneziu din sânge.

Frecvență rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

- Reducerea severă a numărului de celule albe din sânge, ceea ce face ca infecțiile să fie mai

probabile. Raportați orice semne de febră bruscă, durere în gât, oboseală extremă, care poate fi semne de infecție.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane)

- O reducere a numărului de trombocite din sânge, care vă poate cauza sângerări sau vânătăi mai mult decât în mod normal. Vă rugăm să raportați medicul dumneavoastră orice vânătăi inexplicabile sau sângerări.

Alte reacții adverse sunt:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- Polipi benigni în stomac.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

- Durere de cap,
- amețeli,
- diaree,
- senzație de rău general, vărsături,
- balonare și flatulență (gaze),
- constipație,
- uscăciunea gurii,
- durere și disconfort abdominal,
- erupție trecătoare pe piele, exantem, erupție;
- mâncărimi;
- fractură de șold, încheietura mâinii sau coloană vertebrală;
- slăbiciune, epuizare sau stare generală de rău,
- tulburări ale somnului.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

- Tulburări ale vederii, cum este vederea încețoșată,
- urticarie,
- durere în articulații,
- dureri musculare,
- modificări ale greutateii corporale,
- creșterea temperaturii corpului,
- umflături ale extremităților (edeme periferice),
- reacții alergice,
- depresie,
- mărire a sânilor la bărbați,
- tulburări ale gustului.

Foarte rare (afectează mai puțin de 1 utilizator din 10000)

- Dezorientare.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- Halucinații, confuzie (în special la pacienții cu antecedente ale acestor simptome);
- scăderea nivelului de sodiu în sânge;
- scăderea nivelului de calciu în sânge;
- scăderea nivelului de potasiu în sânge;
- furnicături sau amorțeală la nivelul mâinilor sau picioarelor;
- inflamație la nivelul intestinului gros, care determină diaree apoasă persistentă;
- spasme musculare;

- erupție cutanată, posibil cu durere la nivelul articulațiilor.

Reacții adverse identificate prin teste de sânge:

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

- Creșterea nivelului enzimelor ficatului.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

- Creșterea nivelului de bilirubină;
- creșterea nivelului de grăsimi din sânge.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane)

- Reducerea numărului de globule albe, ceea ce poate duce la infecții mai frecvente;
- scăderea severă a numărului de globule albe poate duce la slăbiciune, apariția de vânătăi sau infecții mai frecvente.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Nolpaza

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data expirării se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de temperatură de păstrare.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

Nu aruncați medicamentele prin intermediul apei uzate sau al deșeurilor menajere. Adresați-vă farmacistului cum să eliminați medicamentele pe care nu le mai utilizați. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului înconjurător.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Nolpaza

- Substanța activă este pantoprazolul. Fiecare comprimat gastrorezistent conține pantoprazol 20 mg (sub formă de pantoprazol sodic sesquihidrat).
- Celelalte componente sunt: manitol, crosprovidonă (tip A), crosprovidonă (tip B), carbonat de sodiu, sorbitol (E420), stearat de calciu în *nucleul comprimatului*, și hipromeloză, povidonă (K25), dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), propilenglicol, copolimer de acid metacrilic-acrilat de etil, laurilsulfat de sodiu, polisorbit 80, macrogol 6000 și talc în *film*.

Cum arată Nolpaza și conținutul ambalajului

Comprimate gastrorezistente de culoare galben maroniu deschis, ovale, ușor biconvexe, filmate.

Cutii cu blistere cu 15, 30, 60 comprimate gastrorezistente.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul certificatului de înregistrare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovenia

Fabricanți

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>