

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Oxolină 2,5 mg/g unguent

Oxolinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Oxolină unguent și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Oxolină unguent
3. Cum să utilizați Oxolină unguent
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Oxolină unguent
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Oxolină unguent și pentru ce se utilizează

Substanța activă a preparatului Oxolină unguent posedă acțiune antivirală față de virusul gripei, prin blocarea fixării virusului gripei de suprafața membranei celulare, împiedicând reproducerea virusului în celule.

Oxolină unguent se utilizează în profilaxia gripei, tratamentul rinitelor virale (inflamație acută a mucoase nazale, adesea însoțită de febră, stare generală rea și secreții nazale transparente).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Oxolină unguent

Nu utilizați Oxolină unguent

- dacă sunteți alergic la substanța activă sau oricare dintre celelalte componente ale preparatului (enumerat în pct. 6);

Nu utilizați unguentul și adresați-vă medicului dacă:

- dacă eliminările nazale sunt de culoare galbenă sau verzuie, deoarece acesta este un simptom că rinita nu este provocată de virus dar de alt agent patogen la care oxolina unguent nu este eficientă;
- dacă aveți dureri de cap, dureri frontale acestea pot fi simptome că mucoasa cavității nazale este inflamată și medicul vă poate recomanda alt tratament.

Atenționări și precauții

Evitați nimerirea unguentului în ochi.

Utilizarea preparatului copiilor cu vârsta până la 2 ani se va efectua sub observație medicală.

Oxolină unguent împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați , ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Interacțiuni cu alte medicamente nu sunt înregistrate.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea preparatului în sarcină și perioada de alăptare e posibilă numai sub observație medicală.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Oxolină unguent nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Oxolină unguent

Unguentul se aplică nazal (se va aplica pe mucoasa nazală).

Pentru profilaxia gripei unguentul se aplică pe mucoasa nazală de 2-3 ori pe zi în perioada creșterii și evoluției maxime a epidemiei de gripă (timp de 25 zile) sau la contactul cu bolnavul de gripă.

Pentru tratamentul rinitei virale unguentul se aplică pe mucoasa nazală, cu ajutorul unui bețisor cu capătul de bumbac de 2-3 ori pe zi timp de 3-4 zile.

Adresați-vă medicului sau farmacistului dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău după 4 zile de tratament.

Dacă ați utilizat mai mult Oxolină unguent decât trebuie

Dacă nu ați aplicat unguentul la ora programată, aplicați de îndată ce vă amintiți și continuați să-l aplicați în conformitate cu recomandările. Nu utilizați unguent de două ori pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați utilizat mai mult Oxolină unguent decât trebuie

Dacă ați aplicat o cantitate mare de unguent pe mucoasa nazală, cantitatea în exces poate fi îndepărtat cu un tampon de bumbac.

Dacă dumneavoastră sau copilul a înghițit accidental Oxolină unguent, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, farmacistului, sau contactați departamentul de urgență al celui mai apropiat spital. Dacă este posibil, luați tub sau ambalajul pentru a arăta medicului ce preparat a luat.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

La utilizarea unguentului au fost raportate următoarele reacții adverse:

Rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți) - colorarea în albastru a mucoasei nazale;

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile)- senzație de arsură a mucoasei nazale, rinoree.

și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>