

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Quamatel Mini 10 mg comprimate filmate

Famotidinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Quamatel Mini și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Quamatel Mini
3. Cum să utilizați Quamatel Mini
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Quamatel Mini
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Quamatel Mini și pentru ce se utilizează

Acest medicament este utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al simptomelor cauzate de o cantitate excesivă de acid produsă în stomac și pentru ameliorarea de arsuri la stomac și dureri de stomac asociate cu ea. Acidul este produs în mod normal în stomac, mai ales după consumul de alimente și băuturi. Cu toate acestea, în cazul în care cantitatea de acid produsă este prea mare, aceasta poate provoca dureri puternice și un sentiment neplăcut. Quamatel Mini 10 mg comprimate filmate ameliorează arsurile la stomac, acuzele cauzate de supra-aciditatea din stomac și durerile de stomac asociate cu acesta pentru o perioadă lungă de timp.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Quamatel Mini

Nu utilizați Quamatel Mini

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la famotidină sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.
- Nu trebuie utilizat la copii (din cauza lipsei de experiență).
- Dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Atenționări și precauții

Înainte de a începe să luați Quamatel Mini trebuie să contactați medicul dacă:

- în caz de plenitudine stomacală persistentă
- dacă aveți indigestie sau pierdere în greutate
- dacă sunteți de vârstă mijlocie sau mai în vârstă și indigestia a avut loc pentru prima dată, sau simptomele anterioare s-au schimbat
- aveți scaun negru
- aveți alte boli concomitente, sunteți sub tratament medical, sau luați alte medicamente concomitent

- ați avut vreodată o (hipersensibilitate) reacție alergică la un medicament similar cu scăderea producției de acid în stomac,
- aveți probleme cu rinichii sau ficatul,
- aveți dificultăți la înghițire, sau dureri cronice abdominale, deoarece pe fundalul plângerilor ar putea exista mai multe boli grave, care necesită alt tratament.

Aveți grijă deosebită când administrați Quamatel Mini

- În caz de insuficiență hepatică Quamatel Mini comprimat filmat poate fi luat în conformitate cu instrucțiunile medicului prin reducerea dozei.
- Dacă aveți probleme renale, doza trebuie determinată individual.

Avertismente

În timp ce luați acest medicament vă poate ajuta la evitarea simptomelor următoarele sfaturi de mai jos:

- A nu se culca în decurs de 2 ore după masă.
- Ridicați perna în pat.
- Nu strângeți centura și nu purtați haine strâmte.
- Dacă fumați, ar trebui să renunțați la fumat.
- În caz de obezitate greutatea corporală trebuie să fie scăzută.
- Evitați consumul de cafeină, ceai tare, ciocolată, alimente bogate și alcool.

Quamatel Mini împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente.

Dacă Quamatel Mini comprimat filmat este administrat concomitent cu medicamente a căror absorbție este influențată de aciditatea din stomac, trebuie să se ia în considerare posibilitatea modificării absorbției acestor preparate. Datorită creșterii pH-ului gastric, famotidina poate reduce absorbția de ketoconazol utilizate concomitent. Prin urmare, ketoconazol trebuie luat cu cel puțin 2 ore înainte de administrarea Quamatel Mini comprimat filmat.

Absorbția de Quamatel Mini 10 mg comprimate filmate poate fi redus prin medicamente care contracarează sau neutralizează aciditatea gastrică (antiacide). Prin urmare, antiacidele trebuie luate cu cel puțin 2 ore înainte de administrarea Quamatel Mini 10 mg comprimate filmate.

Quamatel Mini împreună cu alimente și băuturi

Ingestia de alimente și băuturi lichide nu influențează absorbția Quamatel Mini comprimate filmate.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Sarcina

Famotidină traversează bariera placentară. Administrarea Quamatel Mini comprimate filmate este contraindicat în timpul sarcinii.

Prin urmare, dacă sunteți gravidă sau alăptați, discutați cu medicul dumneavoastră și urmați sfatul înainte de a începe să luați acest medicament.

Alăptarea

Famotidină este secretată în laptele uman, prin urmare, alăptarea trebuie întreruptă în cazul în care este necesară administrarea de Quamatel Mini 10 mg comprimate filmate.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lipsește informațiile referitor la influența preparatului asupra capacității de conducere a autovehiculelor și manevrarea a utilajelor.

Informații importante privind unele componente ale Quamatel Mini comprimate filmate

În caz de intoleranță la lactoză trebuie să se țină cont de faptul că fiecare comprimat filmat Quamatel Mini conține lactoză 52,5 mg (zahărul din lapte).

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Quamatel Mini

Utilizați întotdeauna Quamatel Mini exact așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Pentru ameliorarea arsurilor la stomac, simptomelor de hiperaciditate, pentru ameliorarea durerii gastrice asociate cu ea: 1 comprimat (10 mg) pe zi, ar trebui luat integral, fără a fi mestecat cu un pahar de apă.

Pentru prevenirea acidității excesive după masă, arsuri la stomac: 1 comprimat (10 mg) ar trebui să fie luat tot, fără a fi mestecat, cu un pahar de apă cu o oră înainte de mese.

Maxim 2 comprimate (20 mg) pot fi luate zilnic. (Maxim 2 comprimate la fiecare 24 ore.)

Quamatel Mini comprimat filmat nu ar trebui să fie luate în mod continuu pentru mai mult de 2 săptămâni fără instrucțiunile unui medic. Ar trebui să consultați un medic dacă simptomele nu încetează sau încă persistă după 2 săptămâni.

Dacă utilizați mai mult Quamatel Mini decât trebuie

Nu există experiență privind supradozajul. Dacă ați luat în mod accidental prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului, farmacistului sau mergeți la cel mai apropiat spital de urgență.

Din cunoștințele noastre, administrarea unei doze de 800 mg de famotidină pe zi, timp de mai bine de un an nu a provocat efecte adverse grave.

Dacă uitați să utilizați Quamatel Mini

Dacă ați uitat să luați o doză, nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Quamatel Mini poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Mai puțin frecvente (apar de la 1 până la 10 din 1000 de pacienți tratați): excesie de gaze intestinale

Reacții adverse rare (apar de la 1 până la 10 din 10000 de pacienți tratați): cefalee, amețeli, diaree, constipație.

Reacții adverse foarte rare (apar la mai puțin de 10 din 100.000 de pacienți tratați): reacții

anafilactice, pierderea poftelor de mâncare, anxietate, confuzie, depresie, halucinații, stare de neliniște, inima bate lent sau neregulate (aritmie), bloc atrioventricular, bronhospasm, dureri de stomac ușoare sau balonare, greață, vărsături, senzație de gură uscată, icter colestatic, erupții cutanate, piele uscată, senzație de mâncărime, căderea părului, dureri articulare, crampe musculare, mărirea sânilor a fost raportat la bărbați, care de obicei dispăre după întreruperea tratamentului, oboseală, febră ușoară, modificări în rezultatele de laborator: anomalii ale enzimelor hepatice și modificări ale testelor de sânge care arată tulburări hematopoietice.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Quamatel Mini

A se păstra în ambalajul original ferit de lumină.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Quamatel Mini după data de expirare înscrisă pe ambalaj după expiră. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Quamatel Mini

Substanța activă este de 10 mg famotidină în fiecare comprimat filmat.

Celelalte componente sunt:

Nucleu: dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, povidonă, amidon glicolat de sodiu (tip A), talc, amidon de porumb, lactoză monohidrat (52,5 mg).

Film: oxid roșu de fier E 172, dioxid de siliciu coloidal anhidru, dioxid de titan E 171, macrogol 6000, Sepifilm 003 (hipromeloză + stearat de macrogol).

Cum arată Quamatel Mini și conținutul ambalajului

Comprimate filmate.

Comprimate filmate rotunde, convexe, de culoare roz deschis, marcate pe una din fețe cu „10”.

14 comprimate filmate în blister din Al/PVC și cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Ungaria

Fabricantul

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Ungaria

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>