

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT

Tenoten 0,003 g comprimate de supt

Anticorpi purificați față de proteina cerebrală specifică S-100

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament în conformitate cu informațiile din acest prospect sau conform indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă farmacistului.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 3-4 săptămâni de utilizare a medicamentului starea dumneavoastră nu se ameliorează în mod constant, consultați medicul.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tenoten și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tenoten
3. Cum se utilizează Tenoten
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tenoten
6. Conținutul ambalajului și alte informații suplimentare

1. CE ESTE TENOTEN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Tenoten comprimate de supt referă la grupul de medicamente *Anxiolitice, nootrope*.

Tenoten este destinat pentru tratamentul complex al următoarelor stări la adulți:

- Nevroze și stări de tip nevrotic, maladii psiho-somatice, tulburări de stres însoțite de tensiune nervoasă, irascibilitate, anxietate și reacții vegetative.

- Dereglări organice moderate ale sistemului nervos central, inclusiv de origine traumatică și discirculatorie, însoțite de instabilitate emoțională, irascibilitate, scăderea memoriei, tulburări vegetative.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI TENOTEN

Nu utilizați Tenoten dacă:

- Sunteți alergic la substanțele active sau la alte componente ale acestui medicament enumerate la pct. 6.

Atenționări și precauții

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Tenoten .

Copii și adolescenți

Tenoten nu este destinat utilizării la copii. Pacienții copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani trebuie să utilizeze Tenoten pentru copii.

Tenoten împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați orice alte medicamente.

Cazuri de incompatibilitate cu alte medicamente până în prezent nu au fost raportate.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua orice medicament.

Siguranța utilizării Tenoten în timpul sarcinii nu a fost studiată. Ca măsură de precauție, se recomandă evitarea utilizării Tenoten în timpul sarcinii. Dacă în timpul administrării medicamentului veți deveni gravidă, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră pentru a determina necesitatea continuării tratamentului.

Date privind eliminarea în laptele matern lipsesc. Tenoten nu este recomandat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Tenoten nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi alte utilaje potențial periculoase.

Tenoten conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI TENOTEN

Luați întotdeauna Tenoten exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Tenoten este destinat utilizării pe cale orală, în afara meselor. Comprimatul trebuie ținut în gură, fără a fi înghițit, până la dizolvarea completă (nu în timpul mesei).

Câte 1-2 comprimate la o priză. Comprimatele se administrează de 2 ori pe zi; la necesitate – până la 4 ori pe zi. Cura de tratament constituie 1-3 luni. La necesitate tratamentul poate fi prelungit până la 6 luni sau poate fi reluat peste 1-2 luni.

În lipsa unei ameliorări constante după 3-4 săptămâni de tratament, trebuie să vă adresați medicului.

Incizia de pe fața comprimatului nu este destinată divizării comprimatului în doze egale.

Utilizarea la copii și adolescenți

Tenoten nu este destinat pentru copii și adolescenți. Pacienții cu vârsta sub 18 ani trebuie să administreze Tenoten pentru copii.

Dacă ați luat mai mult Tenoten decât trebuie

Dacă luați în mod accidental prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În cazul de supradozaj accidental sunt posibile fenomene dispeptice (diaree, dureri în abdomen, greață), cauzate de excipienții din compoziția medicamentului. Dacă semnați aceste fenomene după un supradozaj accidental, întrerupeți utilizarea medicamentului și consultați medicul.

Dacă ați uitat să luați Tenoten

Dacă ați uitat să luați Tenoten, luați doza următoare imediat ce v-ați amintit; luați doza următoare la ora obișnuită. Nu dublați doza pentru a substitui doza uitată.

Dacă ați încetat să luați Tenoten

Durata tratamentului este determinată individual. Medicul sau farmacistul vă va spune cât timp trebuie să continuați tratamentul. Trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă ați decis să încetați să luați medicamentul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot apărea la mai puțin de 1 din 1000 persoane):

– sunt posibile reacții alergice la componentele medicamentului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amed.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TENOTEN

Nu lăsați acest medicament la îndemâna și vederea copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați Tenoten după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Tenoten

Un comprimat de supt conține substanțe active: anticorpi purificați față de proteina cerebrală specifică S-100 – 0,003 g*.

*se aplică pe lactoză monohidrat sub formă de amestec hidro-alcoolic cu conținut de cel mult 10^{-15} ng/g formă activă de substanță activă.

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, stearat de magneziu.

Cum arată Tenoten și conținutul ambalajului

Comprimate plat-cilindrice, cu incizie și margini bine conturate, de culoare de la albă până la aproape albă. Pe partea cu incizie este imprimată inscripția MATERIA MEDICA, pe cealaltă parte - inscripția TENOTEN.

Tenoten este disponibil în blister din PVB și folie de aluminiu care conține 20 comprimate.
Câte 1 sau 2 blistere împreună cu prospectul în cutie.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FȘP Materia Medica Holding SRL, Rusia,
127473, or. Moscova
Str-la 3 Samoteciîi, 9,
Tel./fax: (495) 684-43-33

Fabricantul

FȘP Materia Medica Holding SRL, Rusia,
454139, or. Celeabinsk
Str. Buguruslanskaya, 54

Acest prospect a fost revizuit în August 2017

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>