

## Prospect: Informații pentru consumator/pacient

### **BRONCHOBOS 250 mg/5 ml sirop Carbocisteină**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Bronchobos 250 mg/5 ml sirop și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop
3. Cum să luați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Bronchobos 250 mg/5 ml sirop
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Bronchobos 250 mg/5 ml sirop și pentru ce se utilizează**

Bronchobos 250 mg/5 ml sirop conține medicamentul numit carbocisteină. Aparține unui grup de medicamente numite mucolitice.

Acesta acționează prin aceea ca mucusul (flegma) să devină mai puțin lipicios. Acest lucru face ca mucusul să fie mai ușor eliminat prin tuse. Bronchobos 250 mg/5 ml sirop este utilizat în probleme pasajelor de respirație (ale căilor respiratorii). Aceste probleme se întâmplă atunci când se produce prea mult mucus sau mucusul este prea lipicios.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

*Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alte medicamente, dacă suferiți de o boală cronică, o tulburare a metabolismului, dacă sunteți hipersensibil la medicamente sau ați avut reacții alergice la unele dintre ele.*

#### **Nu luați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

Nu utilizați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop și spuneți medicului dacă:

- sunteți alergic (hipersensibil) la carbocisteină sau la oricare dintre celelalte componente ale Bronchobos 250 mg/5 ml sirop (enumerare la punctul 6). Simptomele unei reacții alergice includ: o erupție cutanată, probleme la înghițire sau respiratorii, umflarea buzelor, feței, gâtului sau a limbii;
- aveți ulcer în stomac sau intestin (intestinul subțire).

Nu luați acest medicament dacă oricare dintre cele de mai sus este valabil pentru dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Bronchobos 250 mg/5 ml sirop.

#### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- Sunteți în vârstă.
- Ați avut un ulcer în stomac sau intestin.
- Luați alte medicamente cunoscute care cauzează sângerare în stomac

### **Bronchobos 250 mg/5 ml sirop împreună cu alte medicamente**

*Țineți cont de faptul că această informație se poate referi la medicamentele pe care le mai luați, precum și medicamentele pe care intenționați să le luați în viitor.*

*Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.*

Nu se cunosc interacțiuni dintre Bronchobos 250 mg/5 ml sirop și alte medicamente.

### **Bronchobos 250 mg/5 ml sirop cu alimente și băuturi**

Alimentele și băuturile nu influențează asupra eficienței Bronchobos 250 mg/5 ml sirop.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Înainte de a lua acest medicament consultați medicul dumneavoastră.

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă:

- sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Acest medicament nu trebuie să fie luat în primele trei luni de sarcină.
- alăptați sau planificați să alăptați.

*Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați orice alte medicamente, dacă sunteți gravidă sau alăptați.*

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Bronchobos 250 mg/5 ml sirop nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Alte atenționări**

**Bronchobos 250 mg/5 ml sirop conține** etanol 96% (alcool). În conformitate cu instrucțiunile de dozare atunci când se administrează 15 ml sirop în organism se aportă 375 mg alcool. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copiii și grupuri cu risc crescut cum sunt pacienți cu boli hepatice sau epilepsie.

**Bronchobos 250 mg/5 ml sirop conține** metilparahidroxibenzoat și propilparahidroxibenzoat. Pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

**Bronchobos 250 mg/5 ml sirop conține** azorubină (E122). Poate provoca reacții alergice.

## **3. Cum să luați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

*Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur/ă.*

### **Mod de administrare**

- Medicamentul se administrează pe cale orală.
- Dacă considerați că medicamentul acționează prea slab sau prea puternic, nu modificați doza de sine stătător, dar adresați-vă medicului dumneavoastră.

### **Doze**

#### ***Adulți (inclusiv vârstnici)***

Doza uzuală constituie 15 ml (3 lingurițe dozatoare anexate Bronchobos 250 mg/5 ml sirop) de 3 ori pe zi.

Dacă simptomele dumneavoastră se îmbunătățesc doza dumneavoastră poate fi redusă până la 10 ml (2 lingurițe dozatoare anexate Bronchobos 250 mg/5 ml sirop) de 3 ori pe zi.

### **Copii**

Bronchobos 250 mg/5 ml, sirop se administrează la copii cu vârsta peste 12 ani. Doza este similară celei recomandate pentru adulți.

*Pentru copii cu vârsta sub 12 ani se recomandă de administrat Bronchobos 125 mg/5 ml sirop.*

### **Notă:**

Pentru dozarea siropului Bronchobos 250 mg/5 ml sirop la ambalaj este anexată lingurița dozatoare de 5 ml gradată a câte 2,5 ml. Fiecare linguriță dozatoare (5 ml) de Bronchobos 250 mg/5 ml sirop conține 250 mg carbocisteină.

### **Dacă luați mai mult Bronchobos 250 mg/5 ml sirop decât trebuie**

Dacă dumneavoastră ați luat mai mult Bronchobos 250 mg/5 ml sirop decât trebuie, spuneți medicului dumneavoastră sau mergeți la un departament de urgență a celui mai apropiat spital. Luați cu dumneavoastră și cutia medicamentului. Acest lucru este important pentru ca medicul să știe ce ați luat. Dacă dumneavoastră ați luat prea mult Bronchobos 250 mg/5 ml sirop, este probabil ca dumneavoastră să aveți deranj gastric (tulburări gastrointestinale).

### **Dacă uitați să luați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

*Dacă ați uitat să luați medicamentul, nu luați ulterior o cantitate dublă de medicament, dar continuați administrarea medicamentului conform schemei de dozare uzuale.*

Dacă ați uitat să luați o doză de Bronchobos 250 mg/5 ml sirop, nu vă îngrijorați, omiteți doza uitată și utilizați doza următoare la momentul corespunzător. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

Este important să continuați să luați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice alte întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Bronchobos 250 mg/5 ml sirop provoacă reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

### **Încetați să luați Bronchobos 250 mg/5 ml sirop și contactați imediat un medic sau mergeți la un departament de urgență a celui mai apropiat spital dacă:**

- aveți reacții alergice. Aceste simptome includ: erupții cutanate, probleme la înghițire sau respiratorii, umflarea buzelor, feței, gâtului sau a limbii.
- apar vezicule sau sângerări ale pielii, inclusiv în jurul buzelor, ochilor, gurii, nasului și organelor genitale. Puteți prezenta simptome asemănătoare gripei și febră. Acesta de asemenea se numește sindromul Stevens-Johnson.

### **Spuneți imediat unui medic dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse grave:**

- dacă aveți sânge în vărsături sau scaune negre

**Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă oricare dintre următoarele reacții adverse devine gravă sau durează mai mult de câteva zile:**

- vărsăturile

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se congela.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului original – 60 zile.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Bronchobos 250 mg/5 ml sirop**

Substanța activă este carbocisteina.

Fiecare 5 ml sirop conține: carbocisteină 250 mg.

*Celelalte componente sunt:* glicerol 85%, etanol 96%, hidroxid de sodiu, carmeloză de sodiu, acid citric monohidrat, metilparahidroxibenzoat ( E218), zaharinat de sodiu, propilparahidroxibenzoat (E216), aromă de zmeură, azorubină (E122), apă purificată.

#### **Cum arată Bronchobos 250 mg/5 ml sirop și conținutul ambalajului**

Sirop

Lichid transparent, ușor vâscos de culoare și cu miros de zmeură.

#### **Conținutul ambalajului**

Un flacon de sticlă brună a câte 200 ml, cu capac cu filet securizat pentru copii.

Ambalajul original conține lingurița dozatoare pentru utilizarea corectă a medicamentului.

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

##### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Bosnalijek, Pharmaceuticals and Chemicals Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia și Herțegovina.

##### **Fabricantul**

Bosnalijek, Pharmaceuticals and Chemicals Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia și Herțegovina.

**Acest prospect a fost revizuit în Mai 2023.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>