

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**Gaviscon Mentol comprimate masticabile**

Alginat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu și carbonat de calciu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să luați Gaviscon Mentol cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 7 zile.
- Dacă manifestați orice reacții adverse adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Gaviscon Mentol și pentru ce se utilizează
2. Înainte să luați Gaviscon Mentol
3. Cum să luați Gaviscon Mentol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Gaviscon Mentol
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE GAVISCON MENTOL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Gaviscon Mentol comprimate masticabile formează un strat protector care plutește deasupra conținutului stomacului. Acest strat împiedică acidul gastric să părăsească stomacul și să pătrundă în esofag, alinând astfel senzația de arsură în capul pieptului și senzația de disconfort în gât și gură. Arsura în capul pieptului poate să apară după mese (de exemplu, atunci când se consumă alimente grase sau picante) sau în timpul sarcinii sau la pacienți cu simptome legate de inflamația peretelui esofagului (de exemplu, înghițire dificilă și/sau dureroasă, ulcerații la nivelul gurii, vărsături).

Gaviscon Mentol comprimate masticabile se utilizează pentru tratamentul simptomelor refluxului gastro-esofagian, cum sunt regurgitația acidă, senzația de arsură în capul pieptului și indigestia (legate de reflux) care apar, de exemplu, după mese sau în timpul sarcinii și la pacienții cu simptome asociate esofagitei.

2. ÎNAINTE SĂ LUAȚI GAVISCON MENTOL

Nu luați Gaviscon Mentol comprimate masticabile dacă:

- știți că sunteți alergic (hipersensibil) la oricare dintre componente, deoarece foarte rar au apărut dificultăți în respirație și erupții trecătoare pe piele (pentru lista completă vezi Informații suplimentare).

Aveți grijă deosebită înaintea tratamentului cu Gaviscon Mentol comprimate masticabile Acest medicament conține sodiu (5,3 mmol per doză de două comprimate) și calciu (1,6 mmol per doză de două comprimate).

- Dacă vi s-a recomandat să urmați o dietă restrictivă privind vreuna dintre aceste două săruri, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Vă rugăm adresați-vă medicului dumneavoastră privind concentrațiile acestor săruri și dacă aveți sau ați avut o afecțiune semnificativă la nivelul rinichilor sau inimii, deoarece anumite săruri pot avea un efect asupra acestor afecțiuni.

Dacă simptomele persistă după 7 zile de utilizare, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Folosirea altor medicamente

Nu luați acest medicament în decurs de două ore de la administrarea altor medicamente pe cale orală, deoarece acesta poate interacționa cu anumite medicamente.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Puteți lua acest medicament dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Informații importante privind unele componente ale Gaviscon Mentol comprimate masticabile

Dacă aveți fenilcetonurie, luați în considerare faptul că acest medicament este îndulcit cu aspartam, care este o sursă de fenilalanină.

3. CUM SĂ LUAȚI GAVISCON MENTOL

Pentru administrare orală. Mestecați bine înainte de înghițire.

Adulți, inclusiv vârstnici și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai mari: la apariția simptomelor, luați două până la patru comprimate după masă și la culcare (maxim de patru ori pe zi).

Copii și adolescenți cu vârsta sub 12 ani: trebuie administrat numai la sfatul medicului.

Dacă ați luat mai mult Gaviscon Mentol decât trebuie

Dacă utilizați prea mult din acest medicament, este posibil să vă simțiți balonat. Este puțin probabil să vă facă rău, dar vă rugăm adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă ați uitat să luați Gaviscon Mentol

Dacă ați uitat să luați o doză, nu este necesar să luați o doză dublă data viitoare, ci să continuați să luați doza obișnuită la momentul potrivit.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Gaviscon Mentol poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar aceste reacții adverse opriți administrarea acestui medicament și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Foarte rar (mai puțin de 1 din 10000), există șanse de apariție a unei reacții alergice la componente. Simptomele acestora pot include erupție trecătoare pe piele, mâncărime, dificultăți în respirație, amețeli sau umflare a feței, buzelor, limbii sau gâtului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament

5. CUM SE PĂSTREAZĂ GAVISCON MENTOL

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR.

Nu utilizați Gaviscon Mentol după data de expirare (EXP: lună/an) înscrisă pe cutie, flacon și blister. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Gaviscon Mentol

- Substanțele active în fiecare comprimat masticabil sunt: alginat de sodiu 250 mg, hidrogenocarbonat de sodiu 133,5 mg și carbonat de calciu 80 mg.
- Celelalte componente sunt :macrogol 20000, manitol (E 421), aromă de mentă, aspartam (E 951), acesulfam potasic, copovidonă, , stearat de magneziu. Aceste comprimate nu conțin zahăr sau gluten.

Cum arată Gaviscon Mentol și conținutul ambalajului

Gaviscon Mentol comprimate masticabile sunt comprimate rotunde, de culoare aproape albă până la crem, cu un aspect ușor marmorat.

Gaviscon Mentol comprimate masticabile este disponibil în cutii cu 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 36, 40, 44, 48, 64 comprimate masticabile.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.

Strada Grigore Alexandrescu Nr. 89-97, Corpul A, etaj 5,

Sector 1, București, România

Fabricanții

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE Ltd.

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, Marea Britanie

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Belgia	Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten
Bulgaria	Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets
Danemarca	Galieve Peppermint
Franța	Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique
Germania	Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten
Irlanda	Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets
Luxemburg	Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comprimé à croquer
Marea Britanie	Gaviscon Peppermint Tablets
Portugalia	Gaviscon
Republica Cehă	Gaviscon žvýkácí tablety
România	Gaviscon Mentol comprimate masticabile
Ungaria	Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2019.