

Prospect: Informații pentru utilizator

SPONDI-LIZ

cremă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este SPONDI-LIZ și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați SPONDI-LIZ
3. Cum să utilizați SPONDI-LIZ
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează SPONDI-LIZ
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este SPONDI-LIZ și pentru ce se utilizează

SPONDI-LIZ este un produs topic pentru dureri musculare și articulare, recomandat adulților și copiilor peste 14 ani în tratamentul afecțiunilor inflamatorii și traumatice ale articulațiilor, tendoanelor, ligamentelor și mușchilor: spondiloze, spondilite, osteofitoze, periartrite, sinovite, tendinite, tenosinovite, bursite, contuzii, luxații, torticolis, lumbago.

Cum acționează SPONDI-LIZ cremă

Efectul benefic al complexului activ Spondi-liz, în cazul afecțiunilor inflamatorii și traumatice ale articulațiilor, tendoanelor, ligamentelor și mușchilor este susținut de un mecanism generalizat de acțiune, orientat spre îmbunătățirea circulației și eliminarea stazei sanguine în zona afectată, blocarea enzimelor proinflamatoare.

Substanțele bioactive din extractele lichide din frunze de salvie, semințe de castan și din uleiul de rozmarin posedă proprietăți venotonizante, capilaroprotectoare, regenerante, analgezice, antiinflamatoare și antiseptice.

Nicotinatul de metil este un vasodilatator local prin acțiune directă asupra capilarelor tegumentare; are proprietăți revulsive, activând circulația la nivelul pielii și organelor interne; favorizează absorbția principiilor active din componența medicamentului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați SPONDI-LIZ

Nu utilizați SPONDI-LIZ

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la excipienți;
- dacă suferiți de boli inflamatorii ale pielii, arterită obliterantă, microangiopatie diabetică gravă;
- dacă ești un copil sau un adolescent cu vârsta mai mică de 14 ani.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că vreuna dintre afirmațiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați SPONDI-LIZ, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

A se utiliza exclusiv topic.

Crema nu se aplică pe pielea iritată, pe plăgi, la nivelul plicilor cutanate. Se vor feri ochii și mucoasele.

Dozele excesive sau aplicarea la nivelul unor regiuni sensibile pot fi cauza unor iritații locale.

Efectul poate fi diminuat prin ștergerea pielii cu ajutorul unui tampon cu ulei sau cremă.

Următorii excipienți din compoziția cremei SPONDI-LIZ – alcool cetilic, butilhidroxianisolu (E 320) și lanolina anhidră pot provoca dermatite de contact, metilparahidroxibenzoat (E 218) și propilparahidroxibenzoat (E 216) pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

Adresați-vă medicului sau farmacistului dacă aveți orice nelămuriri despre cum să aplicați SPONDI-LIZ.

SPONDI-LIZ împreună cu alte medicamente

Până în prezent nu au fost semnalate interacțiuni clinic semnificative ale cremei SPONDI-LIZ cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

SPONDI-LIZ se va aplica în sarcină și perioada de alăptare numai dacă beneficiile pentru mamă depășesc eventualele riscuri pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

SPONDI-LIZ nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați SPONDI-LIZ

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare

Extern.

Copiii peste 14 ani și adulții aplică crema local, în strat subțire, pe tegumentul intact, de 2-3 ori pe zi, prin masaj ușor al regiunii respective. Durata curei de tratament depinde de caracterul și severitatea afecțiunilor, eficacitatea terapeutică a medicamentului și este stabilită de către medic.

Dacă utilizați mai mult SPONDI-LIZ decât trebuie

În cazul în care v-ați aplicat o cantitate mai mare decât cea recomandată, pot apărea iritații locale. Efectul poate fi diminuat prin ștergerea pielii cu ajutorul unui tampon cu ulei sau cremă.

Dacă uitați să utilizați SPONDI-LIZ

Nu utilizați o cantitate dublă pentru a compensa cantitatea uitată. Aplicați crema ulterior, la timpul stabilit.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pe durata tratamentului pot apărea rar reacții adverse ca: reacții alergice, iritații locale, dermatite de contact.

În cazul apariției unor astfel de reacții adresați-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează SPONDI-LIZ

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați SPONDI-LIZ după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține SPONDI-LIZ

1 g cremă conține următoarele substanțe active: complex activ Spondi-liz – 20,0 mg; extract lichid din semințe de castan – 35,0 mg; extract lichid din frunze de salvie – 10,0 mg, ulei de rozmarin – 35,0 mg; nicotinat de metil – 3,0 mg.

Celelalte componente sunt: lanolină anhidră, vaselină albă, glicerină, acid stearic, alcool cetilic, vaselină ulei, pentylene glycol, monostearat de gliceril, hidroxid de sodiu soluție 18% (pentru ajustarea pH-ului), metilparahidroxibenzoat E 218 (Nipagin), propilparahidroxibenzoat E 216 (Nipasol), Stabilise QM (PVM/MA decadiene crosspolymer), imidazolidinyl urea, butilhidroxianisol E 320, apă purificată.

Cum arată SPONDI-LIZ și conținutul ambalajului

Medicamentul se prezintă sub formă de cremă omogenă, de culoare de la crem până la brun-deschis, cu miros caracteristic.

SPONDI-LIZ este disponibil în cutii de carton ce conțin 1 tub cu 40 g cremă împreună cu prospectul.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

NEWTONE LABORATORIES SRL

Str. Primăverii, nr. 12, Tomești, jud. Iași, România

E-mail: info@newtonelaboratories.com

Fabricantul

FARMAPRIM, Republica Moldova

str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,

MD-4829

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2023

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>