

## Fucorcin

compozitie: acid boric, fenol , rezorcina, alcool etilic 96, fucina, apa purificate

### Regimul de dozare

Pe plan extern. Soluția se aplică cu un tampon de bumbac pe zonele afectate ale pielii de 2-4 ori pe zi. După ce lichidul s-a uscat, pe zona tratată pot fi aplicate unguente și paste.

### Efect secundar

O senzație de arsură pe termen scurt și durere la locul de aplicare a soluției, care dispare de la sine și nu necesită întreruperea medicamentului.

### Contraindicații de utilizare

hipersensibilitate la componentele medicamentului.

Utilizați în timpul sarcinii și alăptării

Nu este recomandat pentru utilizare de către femei în timpul sarcinii și alăptării.

### Instrucțiuni Speciale

Medicamentul nu trebuie aplicat pe zone mari de piele, deoarece fenolul, care face parte din soluție, poate provoca efecte toxice (amețeli, slăbiciune).

Medicamentul are un miros deosebit și o culoare roșie și poate păta rufe.

### Supradozaj

Cu utilizarea prelungită a fucorcinei și utilizarea sa pe zone mari ale pielii, este posibilă o supradoză de medicament, care este însoțită de fenomene caracteristice intoxicației cu fenol (amețeli, slăbiciune, probleme de respirație).

Dacă apar astfel de fenomene, este necesar să se acorde pacientului acces la aer proaspăt și să se efectueze un tratament simptomatic.

### Interacțiuni medicamentoase

Interacțiunea cu alte medicamente este necunoscută.

Condiții de depozitare pentru medicamentul Fukortsin

Într-un loc ferit de lumină, la o temperatură de 12 până la 15°C. A nu se lăsa la îndemana copiilor.

Perioada de valabilitate a medicamentului Fukortsin

Perioada de valabilitate - 2 ani.