

Prospect: informații pentru consumator/pacient

Cinnabsin comprimate

Cinnabaris D3, Echinacea D1, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cinnabsin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cinnabsin
3. Cum să utilizați Cinnabsin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cinnabsin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE CINNABSIN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cinnabsin este un medicament homeopat.

Se utilizează pentru tratamentul simptomelor inflamațiilor acute și cronice ale sinusurilor paranazale (sinuzite).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI CINNABSIN

Nu utilizați Cinnabsin:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare din celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6);
- afecțiuni sistemice progresive (cum ar fi tuberculoza, sarcoidoza), maladii ale sângelui (de exemplu, leucemie și leucoze), maladii autoimune (de exemplu, boli inflamatorii ale țesutului conjunctiv, scleroză multiplă), stări imunodeficitare (SIDA, infecție cu HIV), imunosupresie (de exemplu, după transplantul de măduvă osoasă sau organe, chimioterapie), boli cronice virale;
- la copiii cu vârsta sub 2 ani;
- în timpul sarcinii.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cinnabsin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Este necesar să vă adresați imediat la medic pentru o reevaluare a terapiei, dacă:

- apare umflarea feței, febră sau durere de cap severă,

- dacă starea acută nu se îmbunătățește sau se agravează în primele 2 zile de tratament,
- dacă apar plângeri suplimentare.

Simptomele pentru care se administrează un medicament homeopat se pot înrăutăți temporar (agravare inițială). În astfel de cazuri reduceți dozele sau întrerupeți tratamentul. Adresați-vă medicului dacă tulburările sunt persistente sau dacă apar simptome noi.

În lipsa ameliorării clinice după 4 săptămâni sau la apariția simptomelor noi se recomandă reevaluarea tratamentului.

Cinnabsin împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc influențe ale Cinnabsin asupra altor medicamente și nici ale altor medicamente asupra Cinnabsin.

Utilizarea Cinnabsin împreună cu alimente și băuturi

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Cinnabsin este contraindicat în timpul sarcinii. În perioada de alăptare trebuie să administrați medicamentul doar la recomandarea medicului, după evaluarea raportului beneficiu-risc.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează asupra capacității de conducere a autovehiculelor sau de manevrare a utilajelor potențial periculoase.

Cinnabsin conține lactoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Cinnabsin conține amidon de grâu.

Amidonul de grâu din acest medicament conține gluten, dar numai în cantități foarte mici, și, de aceea se recomandă administrarea cu precauție la persoane cu boala celiacă.

Dacă aveți alergii la grâu (diferită de boala celiacă), nu trebuie să luați acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI CINNABSIN

Utilizați întotdeauna Cinnabsin conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dacă nu se indica altfel, Cinnabsin trebuie de administrat după cum urmează:

Copiilor cu vârsta 2-5 ani: în afecțiuni acute se administrează câte 1 comprimat de 3 ori pe zi până la ameliorarea stării; ulterior, de asemenea și în stări cronice – câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Copiilor cu vârsta 6-11 ani: în afecțiuni acute se administrează câte 1 comprimat peste fiecare 2 ore (însă nu mai mult de 6 comprimate pe zi) până la ameliorarea stării; ulterior, de asemenea și în stări cronice – câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: în afecțiuni acute se administrează câte 1 comprimat peste fiecare oră (însă nu mai mult de 12 comprimate pe zi) până la ameliorarea stării; ulterior, de asemenea și în stări cronice – câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

În stări cronice: adulți și copii – câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Durata tratamentului – 4-6 săptămâni.

Durata maximă a curei de tratament – 4 săptămâni fără sfatul medicului.

Medicamentul se administrează de preferință cu 30 min înainte de masă sau peste 30 min după masă. Comprimatele se vor dizolva lent în cavitate bucală. Pentru administrare la sugari comprimatele pot fi dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Trebuie să vă adresați medicului dacă simptomele se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc timp de 4 săptămâni.

Nu luați Cinnabsin timp îndelungat, fără recomandarea medicului.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Cinnabsin

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Cinnabsin

Dacă ați uitat să luați o doză, luați alta, imediat ce v-ați amintit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cinnabsin

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- Reacții alergice, manifestate prin reacții cutanate sau tulburări gastrointestinale. La pacienții care administrează concomitent alte produse ce conțin Echinacea, pot apărea erupții cutanate, mâncărime, umflarea feței, respirație îngreuiată, amețeli și scăderea tensiunii arteriale. Echinacea

poate declanșa reacții alergice la pacienții atopici (de exemplu, pacienții cu febră de fân, neurodermită, astm alergic);

- Agravarea inițială temporară a sinuzitei;

- Intensificarea secreției salivare.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CINNABSIN

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Cinnabsin după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

A se păstra în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Cinnabsin

Substanțele active

1 comprimat conține Cinnabaris D3 25 mg, Echinacea D1 25 mg, Hydrastis D3 25 mg, Kalium bichromicum D3 25 mg.

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de grâu, stearat de magneziu.

Cum arată Cinnabsin și conținutul ambalajului

Cinnabsin se prezintă sub formă de comprimate plate, de culoare de la alb sau aproape albe, uneori cu incluziuni ușor vizibile, cu margini teșite.

Cinnabsin este disponibil în cutii cu 3 sau 5 blistere a câte 20 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricanții

Deținătorul certificatului de înregistrare

Alpen Pharma GmbH,

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,

Germania

Fabricanții

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach,
Germania

Acest prospect a fost revizuit în mai 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>