

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg comprimate de supt

Diclorhidrat de clorhexidină/Clorhidrat de lidocaină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau a farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 până la 4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg
3. Cum să luați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg și pentru ce se utilizează

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg este un medicament sub formă de comprimate de supt cu acțiune locală la nivelul cavității bucale și a faringelui. Este un antiseptic și un analgezic local.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg este indicat pentru tratamentul durerilor în gât, inflamației gâtului, afecțiunilor faringiene și ale cavității bucale, însoțite de iritație, cum sunt inflamația gingiilor, inflamația mucoasei bucale și aftele.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg

Nu utilizați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg:

- dacă sunteți alergic la diclorhidrat de clorhexidină sau clorhidrat de lidocaină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- la copii cu vârsta sub 6 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg nu trebuie administrat pe termen lung, fără întrerupere sau în mod repetat. Limitați utilizarea acestui medicament pentru ameliorarea durerii și iritației.
- În cazul utilizării unei doze prea mari (mai mult de 20 comprimate pe zi) poate apărea un risc redus de diminuare a controlului reflexului de înghițire.
- În cazul unei infecții bacteriene însoțite de febră, este necesar tratament suplimentar cu alte grupe de medicamente. În acest caz adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări sau sfaturi.

- Dacă luați alte medicamente, vă rugăm să citiți și punctul „Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg împreună cu alte medicamente”.
- Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg nu conține zahăr și, prin urmare, poate fi utilizat de către pacienții diabetici.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă oricare dintre cele de mai sus vi se aplică dumneavoastră sau vi s-au aplicat în trecut.

Copii

Nu administrați acest medicament la copii cu vârsta sub 6 ani.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu administrați simultan alte medicamente antiseptice.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, credeți că ați putea fi însărcinată sau intenționați să rămâneți însărcinată, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Dacă sunt respectate precauțiile de mai sus, Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg poate fi utilizat în timpul sarcinii și perioada de alăptare. Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte să utilizați acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg conține sorbitol și aspartam.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg conține sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Sorbitolul poate avea un efect laxativ ușor. Valoarea calorică este de 2,6 kcal/g sorbitol.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg conține aspartam. Este o sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie (tulburare metabolică caracterizată prin niveluri crescute de fenilalanină în sânge).

3. Cum să utilizați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Acest medicament nu trebuie utilizat pentru perioade lungi de timp. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă simptomele se agravează sau nu se ameliorează după 3 până la 4 zile de tratament.

Doze

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: câte un comprimat de supt la fiecare 2-3 ore. A nu se administra mai mult de 10 comprimate într-un interval de 24 ore.

Copii cu vârsta peste 6 ani: câte un comprimat de supt la fiecare 3-5 ore. A nu se administra mai mult de 5 comprimate într-un interval de 24 ore.

Mod de administrare

Administrare bucofaringiană.

Comprimatele de supt trebuie lăsate să se dizolve lent în cavitatea bucală.

Dacă luați mai mult Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg decât trebuie

Acest medicament conține substanțe active într-o cantitate ce reprezintă doar o fracțiune din doza toxică. Dacă este utilizat în mod corespunzător, riscurile de supradozaj sunt foarte mici.

Simptomele supradozajului sunt: neliniște, tinitus, dificultate în respirație, tulburări ale ritmului cardiac, control redus asupra reflexului de înghițire.

Dacă uitați să luați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă încetați să utilizați Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse posibile care pot apărea la utilizarea acestui medicament sunt:

- *foarte rare:* reacții alergice la nivelul pielii și mucoaselor;
- în mod excepțional, pot apărea tulburări ale gustului, o senzație de iritație la nivelul limbii, reacții alergice severe (reacții anafilactice);
- în cazul administrării prelungite și neîntrerupte, poate apărea colorarea brună a dinților. Totuși, culoarea brună este ușor de îndepărtat.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie/blister după „EXP”. Primele două cifre indică luna, următoarele două sau patru cifre anul. Data expirării se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg

Substanțele active sunt: diclorhidrat de clorhexidină și clorhidrat de lidocaină. Fiecare comprimat conține diclorhidrat de clorhexidină 5 mg și clorhidrat de lidocaină 1 mg.

Celelalte componente sunt: sorbitol (E420), stearat de magneziu, aromă Lemon 501050 AP0551, acesulfam K.

Cum arată Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg și conținutul ambalajului

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă sau aproape albă, ușor pestrițate, rotunde, cu aromă și gust de lămâie.

Duoseptol Lemon 5 mg/1 mg este disponibil în cutii de carton ce conțin 24 comprimate de supt și prospectul pentru utilizator/pacient.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

TOP-PHARMA S.R.L.

str. A. Bernardazzi 78, mun. Chișinău MD-2009,
Republica Moldova

Fabricantul

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A

Rijksweg 9, Bornem 2880,
Belgia

Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>