

Prospect: Informații pentru consumator/pacient
Lopril 10 mg comprimate
Lopril 20 mg comprimate
Lisinoprilum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Lopril și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lopril
3. Cum să utilizați Lopril
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lopril
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Lopril și pentru ce se utilizează

Lopril conține un medicament numit lisinopril. Lisinoprilul aparține unui grup de medicamente denumit inhibitori ai enzimei de conversie ai angiotensinei (ECA).

Lopril poate fi utilizat în următoarele afecțiuni:

- tratamentul tensiunii arteriale crescute (hipertensiune arterială);
- tratamentul insuficienței cardiace;
- dacă ați avut recent un atac de cord (infarct miocardic);
- pentru tratamentul afecțiunilor renale cauzate de diabetul zaharat de tip 2 la persoanele cu tensiune arterială crescută.

Lisinopril acționează prin lărgirea vaselor dumneavoastră de sânge. Acest lucru ajută la scăderea tensiunii arteriale. De asemenea, face mai ușoară sarcina inimii dumneavoastră de a pompa sângele către toate părțile corpului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lopril

Nu utilizați Lopril:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la lisinopril sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă ați avut vreodată o reacție alergică la alt medicament inhibitor ECA. Este posibil ca reacția alergică să fi cauzat: umflare a mâinilor, picioarelor, gleznelor, feței, buzelor, limbii sau gâtului. De asemenea, este posibil să fi cauzat dificultăți de înghițire sau de respirație (edem angioneurotic);
- dacă ați luat sau luați în prezent sacubitril/valsartan, un medicament utilizat pentru tratarea unui tip de insuficiență cardiacă (cronică) de lungă durată la adulți, deoarece riscul de angioedem (umflare rapidă sub piele într-o zonă cum ar fi gâtul) este crescut.
- dacă oricare membru al familiei dumneavoastră a prezentat o reacție alergică severă (angioedem) la un inhibitor al ECA sau dumneavoastră ați avut vreodată o reacție alergică severă (angioedem) fără o cauză cunoscută.
- dacă sunteți gravidă de mai mult de 3 luni. (De asemenea, este mai bine să evitați să luați Lopril comprimate la începutul sarcinii – vezi secțiunea Sarcina).
- dacă aveți diabet zaharat sau funcția rinichilor afectată și urmați tratament cu un medicament pentru scăderea tensiunii arteriale care conține aliskiren.

Dacă nu sunteți sigur că vreuna din aceste situații este valabilă în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Lopril.

Dacă începeți să prezentați tuse uscată care persistă un timp îndelungat după începerea tratamentului cu Lopril, discutați cu medicul dumneavoastră.

Atenționări și precauții

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să luați Lopril:

- dacă aveți o îngustare a aortei (stenoză aortică) (o arteră a inimii) sau a valvelor inimii (stenoză de valvă mitrală)
- dacă aveți o îngustare (stenoză) a arterei rinichiului.
- dacă aveți o îngroșare a mușchiului inimii (cunoscută ca și cardiomiopatie hipertrofică).
- dacă aveți probleme la nivelul vaselor de sânge (colagenoză vasculară).
- dacă aveți tensiune arterială scăzută. Puteți observa aceasta ca o senzație de amețelă sau de pierdere a echilibrului, în special când vă ridicați în picioare.
- dacă aveți probleme la nivelul rinichilor sau urmați tratament prin dializă renală.
- dacă aveți probleme la nivelul ficatului.
- dacă aveți diabet zaharat.
- dacă luați oricare dintre următoarele medicamente, riscul de angioedem (umflarea rapidă a țesuturilor de sub piele, în zone cum este interiorul gâtului) este crescut:
 - temsirolimus, sirolimus, everolimus și alte medicamente care aparțin clasei numite inhibitori ai mTOR (utilizate pentru a preveni respingerea organelor transplantate și pentru cancer).
 - vildagliptin, un medicament utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat.
 - racecadotril, un medicament utilizat pentru tratarea diareei.
- dacă luați oricare dintre următoarele medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale mari:
 - un „blocant al receptorilor angiotensinei II” (BRA), (cunoscuți și sub denumirea de sartani – de exemplu valsartan, telmisartan, irbesartan), mai ales dacă aveți probleme ale rinichilor asociate diabetului zaharat;
 - aliskiren.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă verifice funcția rinichilor, tensiunea arterială și valorile electroliților (de exemplu, potasiu) din sânge, la intervale regulate de timp. Vezi, de asemenea, informațiile din paragraful „Nu utilizați Lopril”.

- dacă ați avut recent diaree sau vărsături (ați vomitat).
- dacă medicul dumneavoastră v-a spus să controlați cantitatea de sare din dietă.
- dacă aveți valori mari ale colesterolului și urmați un tratament numit „afereza LDL” (un tratament pentru reducerea concentrațiilor foarte mari de colesterol din sânge).
- trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că sunteți (sau ați putea rămâne) gravidă. Administrarea Lopril nu este recomandată la începutul sarcinii și nu trebuie luat dacă sunteți gravidă de peste 3 luni deoarece poate afecta în mod grav dezvoltarea fătului dumneavoastră dacă este administrat în acest stadiu al sarcinii (vezi secțiunea Sarcina).

- dacă aparțineți rasei negre, deoarece Lopril poate fi mai puțin eficient. De asemenea, puteți dezvolta mai ușor reacția adversă edem angioneurotic (o reacție alergică severă).

Dacă nu sunteți sigur că vreuna din aceste situații este valabilă în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Lopril.

Tratamentul pentru alergii, cum ar fi înțepături de insecte

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau urmează să aveți un tratament pentru scăderea efectelor unei alergii, cum ar fi înțeparea de insecte (tratament de desensibilizare). Dacă luați Lopril în timp ce aveți acest tratament, acesta poate provoca o reacție alergică severă.

Intervenții chirurgicale

Dacă urmează să fiți supus unei intervenții chirurgicale (inclusiv la nivelul dinților) spuneți medicului sau stomatologului dumneavoastră că luați Lopril. Aceasta deoarece puteți prezenta tensiune arterială redusă (hipotensiune arterială) dacă vi se administrează anumite anestezice locale sau generale pe durata administrării Lopril.

Copii și adolescenți

A fost studiată utilizarea lisinopril la copii. Pentru mai multe informații, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu se recomandă administrarea lisinoprilului la copii cu vârsta sub 6 ani sau la copii cu probleme renale severe, indiferent de vârstă.

Lopril împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Aceasta deoarece Lopril poate afecta modul în care acționează unele medicamente și unele medicamente pot avea efect asupra Lopril.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să vă modifice doza și/sau să ia alte măsuri de precauție.

În mod deosebit, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

- Alte medicamente utilizate pentru reducerea tensiunii arteriale.
- Un blocant al receptorilor angiotensinei II (BRA) sau aliskiren (vezi și informațiile de la punctele „Nu utilizați Lopril” și „Atenționări și precauții”).
- Comprimate pentru eliminarea apei (medicamente diuretice utilizate pentru a crește volumul de urină).
- Medicamente pentru dizolvarea cheagurilor de sânge (administrare de obicei în spital).
- Medicamente beta-blocante, cum sunt atenolol și propranolol.
- Medicamente care conțin nitrați (pentru afecțiuni ale inimii).
- Medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (AINS) utilizate pentru tratamentul durerii și artritei.
- Aspirină (acid acetilsalicilic), dacă luați 3 grame sau mai mult în fiecare zi.
- Medicamente pentru depresie și pentru probleme mentale, inclusiv litiu.
- Suplimente de potasiu (inclusiv înlocuitori de sare), diuretice care economisesc potasiul și alte medicamente care pot crește cantitatea de potasiu din sânge (de exemplu, trimetoprim și cotrimoxazol pentru infecțiile cauzate de bacterii, ciclosporină, un medicament imunosupresor utilizat pentru a preveni respingerea transplantului de organe; și heparină, un medicament folosit pentru a subția sângele pentru a preveni formarea de cheaguri).
- Insulină sau medicamente pe care le luați pe cale orală pentru diabet zaharat.
- Medicamente utilizate pentru tratamentul astmului bronșic.
- Medicamente pentru tratamentul congestiei nazale sau a sinusurilor sau alte remedii pentru răceală (inclusiv cele pe care le puteți cumpăra din farmacie fără prescripție medicală).
- Medicamente pentru suprimarea răspunsului imunitar al organismului (imunosupresoare).
- Alopurinol (pentru gută).
- Procainamidă (pentru tulburări ale ritmului bătăilor inimii).
- Medicamente care conțin aur, cum este aurotiomalat de sodiu, care vă poate fi administrat sub formă injectabilă.

Următoarele medicamente pot determina creșterea riscului de apariție a angioedemului (semnele angioedemului includ umflarea a feței, buzelor, limbii și/sau gâtului, cu dificultăți la înghițit sau respirat):

- Medicamente pentru dizolvarea cheagurilor de sânge (activator tisular al plasminogenului), administrate de obicei în spital.
 - Medicamente care sunt utilizate cel mai adesea pentru a preveni respingerea organelor transplantate și pentru cancer (sirolimus, everolimus, temsirolimus și alte medicamente care aparțin clasei numite inhibitori ai mTOR). Vezi secțiunea 2 „Atenționări și precauții”.
 - Racecadotril, utilizat pentru tratamentul diareei.

- Vildagliptin, un medicament utilizat pentru tratamentul diabetului zaharat.

Lopril împreună cu alimente și băuturi

Lopril poate fi folosit cu sau fără alimente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Trebuie să anunțați medicul în cazul în care credeți că sunteți (sau este posibil să rămâneți) gravidă. În mod normal, medicul dumneavoastră vă va sfătui să nu mai utilizați Lopril înainte de a rămâne gravidă sau de îndată ce ați aflat că sunteți gravidă și vă va recomanda un alt medicament în loc de Lopril. Lopril nu este recomandat la începutul sarcinii și nu trebuie utilizat în sarcina mai mare de trei luni, deoarece aceasta poate aduce prejudicii copilului dumneavoastră dacă este utilizat după cea de a treia lună de sarcină.

Alăptarea

Spuneți medicului dacă alăptați sau urmează să începeți alăptarea. Lopril nu este recomandat mamelor care alăptează, iar medicul dumneavoastră trebuie să vă aleagă un alt tratament în cazul în care doriți să alăptați, mai ales dacă este vorba de un copil nou-născut sau născut prematur.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

- Unele persoane prezintă senzație de amețală sau oboseală când iau acest medicament. Dacă este cazul dumneavoastră, nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje.
- Trebuie să așteptați să vedeți cum vă afectează medicamentul înainte de a încerca să efectuați aceste activități.

3. Cum să utilizați Lopril

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă efectueze analize de sânge după ce ați început tratamentul cu Lopril. Apoi este posibil ca medicul să vă modifice doza astfel încât să luați cantitatea de medicament potrivită pentru dumneavoastră.

Cum să luați medicamentul

- Înghițiți comprimatul cu un pahar cu apă.
- Încercați să vă luați comprimatele la aceeași oră în fiecare zi. Nu are importanță dacă luați Lopril înainte sau după alimente.
- Continuați să luați Lopril atât timp cât vă spune medicul dumneavoastră. Este un tratament pe termen lung. Este important să continuați să luați Lopril în fiecare zi.

Administrarea primei doze

- Aveți grijă deosebită când luați prima doză de Lopril sau dacă vă este crescută doza. Poate determina o scădere mai mare a tensiunii arteriale decât dozele următoare.
- Aceasta vă poate face să vă simțiți amețit sau să vă pierdeți echilibrul. Dacă este cazul dumneavoastră, poate fi util să vă întindeți. Dacă sunteți îngrijorat, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră cât mai curând posibil.

Adulți

Doza depinde de starea dumneavoastră de sănătate și de utilizarea altor medicamente. Medicul dumneavoastră vă va spune câte comprimate să luați în fiecare zi. Dacă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Pentru tensiunea arterială crescută (hipertensiune)

- Doza inițială recomandată este de 10 mg, o dată pe zi.
- Doza pentru utilizarea pe termen lung este, de obicei, de 20 mg, o dată pe zi.

Pentru insuficiență cardiacă

- Doza inițială recomandată este de 2,5 mg, o dată pe zi.
- Doza pentru utilizarea pe termen lung este de 5 până la 35 mg, o dată pe zi.

După un atac de cord (infarct miocardic)

- Doza inițială recomandată este de 5 mg în primele 24 de ore după atacul de cord, apoi încă 5 mg după 24 de ore.
- Doza pentru utilizarea pe termen lung este de obicei de 10 mg, o dată pe zi.

Tulburări ale funcției renale cauzate de diabet zaharat

- Doza recomandată este de 10 mg sau 20 mg o dată pe zi.

Dacă sunteți o persoană în vârstă, aveți afecțiuni ale rinichiului sau luați medicamente diuretice, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă administreze o doză mai mică decât doza uzuală.

Utilizarea la copii și adolescenți (cu vârste între 6 și 16 ani) cu tensiune arterială crescută

Lopril nu este recomandat copiilor sub 6 ani sau niciunui copil cu probleme renale grave.

Medicul va stabili doza corectă pentru copilul dumneavoastră. Doza este în funcție de greutatea corporală a copilului.

- La copiii cu greutatea corporală între 20 și 50 kg, doza inițială recomandată este de 2,5 mg o dată pe zi.

- La copiii cu greutatea corporală peste 50 kg, doza inițială recomandată este de 5 mg o dată pe zi

Dacă utilizați mai mult Lopril decât trebuie

Dacă luați mai mult Lopril comprimate decât v-a prescris medicul, adresați-vă medicului sau mergeți imediat la spital. Cel mai probabil vor apare următoarele efecte: amețeli, palpitații (senzația de bătăi puternice ale inimii)

Dacă uitați să utilizați Lopril

Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă se apropie ora la care trebuie să luați următoarea doză, săriți peste doza omisă.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Lopril

Nu încetați să vă luați comprimatele, chiar dacă vă simțiți bine, decât dacă vă spune medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții, opriți administrarea Lopril și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

- Reacții alergice severe (rare, pot afecta până la 1 din 10000 persoane). Semnele pot include apariția bruscă a:

- Umflare a feței, buzelor, limbii sau gâtului. Aceasta vă poate cauza dificultăți la înghițire.
- Umflare severă sau bruscă a mâinilor, picioarelor și gleznelor.
- Dificultăți la respirație.
- Mâncărimi severe la nivelul pielii (cu noduli).
 - Afecțiuni severe ale pielii, cum ar fi erupție trecătoare pe piele sau arsură, înroșire sau descumare a pielii instalate brusc, neașteptate (foarte rare, pot afecta până la 1 din 10000 persoane).
 - O infecție cu simptome cum sunt febra și degradarea severă a stării dumneavoastră generale, sau febră cu simptome de infecție locală, cum sunt: dureri la nivelul gâtului/faringelui/gurii sau probleme urinare (foarte rare, pot afecta până la 1 din 10000 persoane).

Alte reacții adverse posibile:

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- Dureri de cap.
- Senzație de amețală sau de pierdere a echilibrului, în special când vă ridicați brusc în picioare.
- Diaree.
- Tuse uscată care nu trece.
- Senzație de rău (vărsături).
- Afecțiuni ale rinichilor (dovedite printr-o analiză a sângelui).

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- Modificări ale dispoziției.
- Modificare a culorii degetelor de la mâini sau picioare (albastru palid, urmat de înroșire) sau amorțeală sau furnicături la nivelul degetelor de la mâini sau picioare.
- Modificare a gustului.
- Senzație de somnolență.
- Senzație de rotire (vertij).
- Dificultăți de a adormi.
- Atac vascular cerebral.
- Bătăi rapide ale inimii.
- Nas care curge.
- Stare de rău (greață).
- Durere de stomac sau indigestie.
- Erupție trecătoare pe piele sau mâncărime.
- Incapacitate de a obține o erecție (impotență).
- Senzație de oboseală sau de slăbiciune (pierdere a puterii).
- O scădere foarte marcată a tensiunii arteriale poate apare la persoanele care au următoarele afecțiuni: boală cardiacă coronariană; îngustare a aortei (o arteră a inimii), arterei rinichiului sau a valvelor inimii; o creștere a grosimii mușchiului inimii. Dacă este cazul dumneavoastră, este posibil să prezentați o senzație de amețală sau de pierdere a echilibrului, în special când vă ridicați brusc în picioare.
- Modificări ale analizelor de sânge care arată cât de bine funcționează ficatul și rinichii dumneavoastră.
- Atac de cord.
- Halucinații văzute și/sau auzite.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- Senzație de confuzie.
- Erupție trecătoare pe piele cu noduli (urticarie).
- Senzație de gură uscată.
- Cădere a părului.
- Psoriazis (o afecțiune a pielii).
- Modificări ale mirosului.
- Creștere a sânilor la bărbați.

- Modificări ale unor celule sau ale altor părți ale sângelui dumneavoastră. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă efectueze periodic analize de sânge pentru a verifica dacă Lopril a avut vreun efect la nivelul sângelui. Semnele pot include: senzație de oboseală, piele palidă, dureri în gât, temperatură corporală crescută (febră), dureri la nivelul articulațiilor și mușchilor, umflare a articulațiilor sau glandelor, sau sensibilitate la lumina soarelui.
- Nivele reduse de sodiu în sângele dumneavoastră (simptomele pot fi: oboseală, dureri de cap, greață, vărsături).
- Secreție inadecvată de hormon antidiuretic (SIADH).
- Insuficiență renală instalată brusc.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

- Sinuzită (o senzație de durere și de prea plin în spatele pomeților și ochilor).
- Respirație șuierătoare.
- Nivele reduse de zahăr în sângele dumneavoastră (hipoglicemie). Semnele pot include senzație de foame sau de slăbiciune, transpirații și bătăi rapide ale inimii.
- Inflamație la nivelul plămânilor (pneumonie). Semnele includ tuse, senzație de respirație superficială și temperatură corporală crescută (febră).
- Îngălbenire a pielii sau a albului ochilor (icter).
- Inflamație la nivelul ficatului (hepatită). Aceasta poate cauza pierdere a poftei de mâncare, îngălbenire a pielii și ochilor și urină închisă la culoare.
- Inflamație la nivelul pancreasului. Aceasta cauzează dureri de stomac moderate până la severe.
- Afecțiuni severe ale pielii. Simptomele includ roșeață, formarea de vezicule și descumare.
- Transpirații.
- Eliminarea unei cantități mai mici de apă (urină) decât în mod obișnuit sau lipsa urinării.
- Insuficiență hepatică.
- Noduli.
- Intestin inflamat.
- Sinteză redusă de măduvă osoasă, deficiență de celule roșii din sânge, număr redus de plachete sanguine (trombocitopenie), scădere a numărului de celule albe din sânge (neutropenie, leucopenie), reducere severă a numărului de celule albe din sânge (agranulocitoză), care crește posibilitatea de apariție a infecției, boală a nodulilor limfatici.
- O afecțiune în care sistemul dumneavoastră imunitar (care vă apără organismul împotriva bolilor) nu recunoaște celulele sănătoase și le atacă. Aceasta se numește boală autoimună.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- Simptome de depresie.
- Leșin.

Reacții adverse suplimentare la copii

Se pare că reacțiile adverse la copii sunt comparabile cu cele întâlnite la adulți.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lopril

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare, care este înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Lopril

- Substanța activă este lisinoprilul (sub formă de lisinopril dihidrat).

Lopril 10 mg conține:

Fiecare comprimat conține 10 mg lisinopril.

Celelalte componente sunt: hidrogenofosfat de calciu dihidrat, manitol, amidon de porumb, amidon pregelatinizat, stearat de magneziu, talc, siliciu coloidal anhidru, oxid galben de fier (E172).

Lopril 20 mg conține:

Fiecare comprimat conține 20 mg lisinopril.

Celelalte componente sunt: hidrogenofosfat de calciu dihidrat, manitol, amidon de porumb, amidon pregelatinizat, stearat de magneziu, talc, siliciu coloidal anhidru, oxid galben de fier (E172), oxid roșu de fier (E172).

Cum arată Lopril și conținutul ambalajului

Comprimat

Lopril 10 mg:

Comprimate rotunde, de culoare galbenă, cu suprafață netedă, margini teșite și cu o linie mediană de rupere.

Lopril 20 mg:

Comprimate rotunde, de culoare roșie-roz până la roz, cu suprafață netedă, margini teșite și cu o linie mediană de rupere.

Ambalaj:

Blistere din PVC/Al.

Câte 10 comprimate în blister. Câte 2 blistere (20 comprimate) în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukićeva 53, Bosnia și Herțegovina.

Fabricantul

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukićeva 53, Bosnia și Herțegovina.

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2022.

Pentru mai multe informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului certificatului de înregistrare.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>