

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Lymphomyosot picături orale, soluție

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Lymphomyosot și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lymphomyosot
3. Cum să utilizați Lymphomyosot
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lymphomyosot
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Lymphomyosot și pentru ce se utilizează

Lymphomyosot reprezintă un medicament homeopatic complex care este utilizat pentru ușurarea drenajului limfei, pentru a spori protecția imună nespecifică, precum și în cazuri de hipertrofie benignă (dezvoltare excesivă a volumului, fără înmulțirea celulelor) a ganglionilor limfatici, amigdalită (inflamarea amigdalelor) cronică, hipertrofie tonsilară și edem limfatic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lymphomyosot

Nu utilizați Lymphomyosot:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6.1).

Atenționări și precauții

Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, este necesar de a se adresa medicului.

Copii și adolescenți

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

Lymphomyosot împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente. Acestea sunt puțin probabile, din cauza concentrațiilor foarte mici a medicamentului.

Lymphomyosot împreună cu alimente, băuturi și alcool

Ca și orice medicament homeopat, Lymphomyosot nu trebuie administrat în timpul meselor.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor în acest medicament este foarte mică, acest medicament nu este cunoscut de a fi toxic în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lymphomyosot nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Lymphomyosot conține etanol. Acest medicament conține etanol (alcool etilic), până la 150,2 mg per doză (10 picături), echivalentul a 3 ml de bere, 1,27 ml de vin sau 49,73 ml de suc de mere.

Nociv pentru cei care suferă de alcoolism.

Este necesară prudență la administrarea preparatului femeilor însărcinate sau care alăptează, copiilor și pacienților cu boli ale ficatului sau epilepsie.

3. Cum să utilizați Lymphomyosot

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 10 picături de 3 ori pe zi.

Copii

Copii cu vârsta sub 2 ani: câte 3 picături de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: câte 5 picături de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: câte 7 picături de 3 ori pe zi.

Doza în caz de debut acut al maladiei sau doza inițială:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 10 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii

Copii cu vârsta sub 2 ani: câte 3 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: câte 5 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: câte 7 picături la fiecare 0,5 – 1 oră, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Durata curei de tratament alcătuiește 3 – 6 săptămâni.

Mod de administrare

Preparatul trebuie administrat în afara meselor.

Pentru a fi administrat copiilor, este posibilă diluarea picăturilor în o cantitate mică de apă.

Dacă utilizați mai mult Lymphomyosot decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj. Acesta este puțin probabil, din cauza concentrațiilor foarte mici a medicamentului.

Dacă uitați să utilizați Lymphomyosot

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Lymphomyosot

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Frecvențele reacțiilor adverse sunt definite după cum urmează: - foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane; - frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane; - mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane; - rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane; - foarte rare: pot afecta până la 1 din 10.000 persoane; - cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Lymphomyosot:

- apariția reacțiilor alergice la nivelul pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigelenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lymphomyosot

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Lymphomyosot

100 g soluție conține:

Substanțe active:

Araneus diadematus	D6	5 g
Calcium phosphoricum	D12	5 g

Equisetum hyemale	D4	5 g
Ferrum jodat	D12	10 g
Fumaria officinalis	D4	5 g
Gentiana lutea	D5	5 g
Geranium robertianum	D4	10 g
Juglans regia	D3	5 g
Levothyroxinum	D12	5 g
Myosotis arvensis	D3	5 g
Nasturtium officinale	D4	10 g
Natrium sulfuricum	D4	5 g
Pinus sylvestris	D4	5 g
Sarsaparilla	D6	5 g
Scrophularia nodosa	D3	5 g
Teucrium scorodonia	D3	5 g
Veronica officinalis	D3	5 g

excipienti: etanol, apă purificată.

Cum arată Lymphomyosot și conținutul ambalajului

Lymphomyosot se prezintă sub formă de picături orale, soluție transparentă, de culoare slab-gălbui, cu miros caracteristic de etanol.

Câte 30 ml de soluție în flacon picurător. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în August 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>