

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Natalsid 250 mg supozitoare

Alginat de sodiu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Natalsid supozitoare și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Natalsid supozitoare
3. Cum se utilizează Natalsid supozitoare
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Natalsid supozitoare
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Natalsid supozitoare și pentru ce se utilizează

Substanța activă a medicamentului, alginatul de sodiu, este un polizaharid natural, ce se obține din alge marine brune. Posedă acțiune hemostatică, antiinflamatoare și regeneratoare marcată.

Natalsid supozitoare se utilizează în caz de fisuri anale cronice în stadiul de epitelizare, hemoroizi cronici în faza de acutizare, proctosigmoidite și afecțiuni inflamatorii ale rectului în perioada postoperatorie.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Natalsid supozitoare

Nu utilizați Natalsid supozitoare:

- dacă sunteți alergic la alginat de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Natalsid supozitoare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Utilizarea la copii:

Nu utilizați Natalsid supozitoare la copii cu vârsta sub 14 ani, deoarece lipsesc date privind eficacitatea și siguranța medicamentului la această categorie de vârstă.

Natalsid supozitoare împreună cu alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament. Natalsid supozitoare nu este contraindicat în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Utilizarea medicamentului nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje și efectuarea activităților potențial periculoase, care necesită o concentrare sporită a atenției și reacții psihomotorii rapide.

3. Cum să utilizați Natalsid supozitoare

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată

Adulților și copiilor cu vârsta peste 14 ani – câte 1 supozitor de 2 ori pe zi.

Durata tratamentului cu Natalasid supozitoare este de 7-14 zile.

Mod de administrare

Administrare rectală.

Înainte de utilizare supozitorul se scoate din blister.

Supozitorul se introduce în rect după defecare spontană sau după clismă evacuatoare.

Dacă ați utilizat mai mult Natalsid supozitoare decât trebuie

Până în prezent nu sunt cunoscute consecințe nocive ale supradozării.

Dacă ați administrat o doză semnificativ mai mare de medicament, adresați-vă medicului (luați ambalajul medicamentului cu sine).

Dacă ați uitat să utilizați Natalsid supozitoare

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați omis o doză, utilizați-o la momentul stabilit pentru următoarea administrare, fără a mări doza.

Dacă încetați să utilizați Natalsid supozitoare

Respectați regimul de utilizare recomandat.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate următoarele reacții adverse:

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată reieșind din datele disponibile):

- reacții alergice.

Reacțiile adverse, de regulă, dispar după întreruperea tratamentului cu Natalsid supozitoare.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta

reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Natalsid supozitoare

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați medicamentul, dacă observați orice semne de modificări ale medicamentului.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și informații suplimentare

Ce conține Natalsid supozitoare

Substanța activă este alginatul de sodiu.

1 supozitor conține alginat de sodiu – 250 mg.

Celelalte componente sunt: grăsimi solide (Witepsol (H15, W 35), Suppocire (NA 15, NAS 50)).

Cum arată Natalsid supozitoare și conținutul ambalajului

Natalsid se prezintă sub formă de supozitoare de formă conico-cilindrică de culoare albă cu o nuanță maronie sau de culoare maro-deschis, sau de culoare gri-deschis cu o nuanță maronie. Se admite apariția depunerilor albe pe suprafața supozitorului, prezența în secțiune a unui ax aerian și a depresiunii în formă de pâlnie.

Natalsid este disponibil în cutii cu 2 blistere a câte 5 supozitoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Nijfarm”, Rusia

str. Salganskaya, 7,

603950, Nijni Novgorod.

Tel.: (831) 278-80-88

Fax: (831) 430-72-28

Fabricantul

SA „Nijfarm”, Rusia

str. Salganskaya, 7,

603950, Nijni Novgorod.

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>