

## **PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT**

### **ZEEL T comprimate** *Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Zeel T și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeel T
3. Cum să utilizați Zeel T
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zeel T
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### **1. CE ESTE ZEEL T ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Zeel T este un medicament homeopat, care se utilizează ca adjuvant în tratamentul complex al artrozelor (boală a articulațiilor caracterizată prin deformarea extremităților oaselor), în special artroze a genunchiului, artroze multiple, artroze a coloanei vertebrale, inflamația țesuturilor în jurul articulației umărului, precum și inflamații și dureri ale articulațiilor.

### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ZEEL T**

#### **Nu utilizați Zeel T:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la unul sau mai multe componente ale preparatului.

#### **Atenționări și precauții**

Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiența de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament.

#### **Copii**

Preparatul este indicat copiilor cu vârsta  $\geq 12$  ani.

Nu există informații clinice privitor la administrarea preparatului copiilor sub 12 ani.

### **Zeel T împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Zeel T nu interacționează cu alte medicamente.

### **Zeel T împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Ca și orice medicament homeopat, Zeel T trebuie administrat cu 15-20 minute înainte sau cu 1 oră după mese.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Zeel T nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

**Zeel T conține lactoză.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI ZEEL T**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

### **Doza standard:**

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.

### **Doza în stadiul acut al maladiei sau în caz de inițiere a tratamentului:**

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 1 comprimat la fiecare 0,5-1 ore, până la 12 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

### **Mod de administrare**

Este preferabil de a menține comprimatele în cavitatea bucală până la dizolvare. Pentru a fi administrat copiilor, este posibilă sfărâmarea comprimatului și dizolvarea acestuia într-o cantitate mică de apă. Medicamentul trebuie administrat în afara meselor.

### **Dacă utilizați mai mult Zeel T decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Zeel T**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Zeel T**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Zeel T  
- mâncărimi.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZEEL T**

A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

#### **Ce conține Zeel T**

1 comprimat conține:

#### *Substanțe active :*

Acidum silicicum	D6	3,00 mg
Acidum thiocticum	D6	0,03 mg
Arnica montana	D1	0,60 mg
Cartilago suis	D4	0,30 mg
Coenzym A	D6	0,03 mg
Embryo totalis suis	D4	0,30 mg
Funiculus umbilicalis suis	D4	0,30 mg
Nadidum	D6	0,03 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,03 mg
Placenta totalis suis	D4	0,30 mg

Rhus toxicodendron	D2	0,54 mg
Sanguinaria canadensis	D3	0,45 mg
Solanum dulcamara	D2	0,15 mg
Sulfur	D6	0,54 mg
Symphytum officinale	D8	0,15 mg

*Celelalte componente sunt: lactoză, stearat de magneziu.*

### **Cum arată Zeel T și conținutul ambalajului**

Zeel T se prezintă sub formă de comprimate rotunde cu margini rotunjite, de culoare de la albă până la galben pal, fără miros.

### **Conținutul ambalajului**

Câte 50 de comprimate ambalate în flacon din plastic. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
 Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
 76532 Baden-Baden  
 Germania  
 Telefon : 0049 7221 501 00  
 Fax : 0049 7221 501 485  
 e-mail : info@heel.com

#### **Fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
 Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
 76532 Baden-Baden  
 Germania

### **Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2016**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>