

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Lysobact DUO 20 mg/1,5 mg comprimate de supt clorhidrat de lizozim / clorură de cetilpiridiniu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este LYSOBACT DUO și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LYSOBACT DUO
3. Cum să luați LYSOBACT DUO
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează LYSOBACT DUO
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este LYSOBACT DUO și pentru ce se utilizează

LYSOBACT DUO conține 2 substanțe active numite clorhidrat de lizozim și clorură de cetilpiridiniu. Acestea aparțin unui grup de medicamente cu efect asupra sistemului respirator – preparate pentru tratamentul bolilor de gât, antispetice.

LYSOBACT DUO se utilizează pentru:

- Tratatamentul local al maladiilor inflamatorii acute ale mucoasei cavității bucale și laringelui, precum gingivite (afecțiune a gingiilor), stomatite (inflamație a mucoasei cavității bucale), și afte (răni mici pe mucoasa gurii).
- terapie de susținere a durerii în gât și înghițire dureroasă, inflamație a faringelui și a gâtului
- la recomandarea medicului, înainte și după operații pe amigdale, gât, în leziuni și abcese, precum și după extracție dentară.

LYSOBACT DUO conține sorbitol (îndulcitor artificial). Nu conține zahăr și este potrivit pentru diabetici.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LYSOBACT DUO

Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alte medicamente, dacă suferiți de o boală cronică, o tulburare a metabolismului, dacă sunteți hipersensibil la medicamente sau ați avut reacții alergice la unele dintre ele.

Nu luați LYSOBACT DUO:

- dacă sunteți hipersensibil la clorhidrat de lizozim, clorură de cetilpiridiniu sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6),
- dacă aveți hipersensibilitate la albușul de ou
- dacă copilul dumneavoastră are vârsta sub 6 ani.

Dacă oricare dintre cele de mai sus este valabil pentru dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Atenționări și precauții

Aveți grijă deosebită când utilizați LYSOBACT DUO :

Dacă simptomele durează mai mult de 5 zile și/sau temperatura corporală ridicată apare în același timp, trebuie consultat un medic.

La utilizarea acestui medicament pot apărea reacții acute de hipersensibilitate severă (cum ar fi urticarie, umflarea feței sau căilor respiratorii, îngustarea căilor respiratorii, complicații circulatorii și șoc anafilactic).

Au fost raportate cazuri izolate de reacții cutanate grave. Unele dintre reacțiile grave au pus viața în pericol.

Administrarea medicamentului trebuie întreruptă dacă apar simptome ale unei reacții de hipersensibilitate.

LYSOBACT DUO împreună cu alte medicamente

Țineți cont de faptul că această informație se poate referi la medicamentele pe care le mai luați, precum și medicamentele pe care intenționați să le luați în viitor.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu există date privind administrarea concomitentă cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu au fost efectuate studii științifice sistematice.

Înainte de a lua acest medicament consultați medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

LYSOBACT DUO nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale LYSOBACT DUO

Lysobact DUO conține sorbitol, ca îndulcitor, de aceea este potrivit pentru diabetici. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum să luați LYSOBACT DUO

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur

Luați medicamentul conform prospectului atașat. Dacă considerați că medicamentul acționează prea slab sau prea tare, consultați medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Doze

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Se administrează câte 3-6 comprimate de supt, la un interval de minim 2 ore dintre prize.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Lysobact DUO nu se recomandă de utilizat la copii cu vârsta sub 6 ani.

Mod de administrare

Comprimatele trebuie dizolvate încet în cavitatea bucală, cel mai bine sub limbă.

Dacă luați mai mult LYSOBACT DUO decât trebuie

Dacă ați luat o doză mai mare de medicament decât doza care vi s-a prescris, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului!

Nu există note suplimentare.

Dacă uitați să luați LYSOBACT DUO

Dacă ați uitat să luați medicamentul, nu luați ulterior o cantitate dublă de medicament, dar continuați administrarea medicamentului conform schemei de dozare uzuale.

Dacă ați uitat să luați o doză de LYSOBACT DUO, luați-o imediat ce vă amintiți. După aceasta administrați doza ulterioară în conformitate cu schema de dozare uzuală și în mod corespunzător.

Dacă încetați să utilizați LYSOBACT DUO

Este important să continuați să luați LYSOBACT DUO atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă încetați brusc utilizarea acestui medicament, nu sunt așteptate efecte negative.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea LYSOBACT DUO adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse asociate cu utilizarea LYSOBACT DUO sunt foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10.000 de pacienți) sau frecvența lor este necunoscută (nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile).

Pot să apară reacții de hipersensibilitate locală.

Foarte rare – au fost raportate reacții de hipersensibilitate sistemice acute inclusiv șoc anafilactic (vezi pct.

Atenționări și precauții)

Au fost raportate cazuri izolate de reacții cutanate severe. Administrarea medicamentului trebuie întreruptă dacă apar simptome ale unei reacții de hipersensibilitate sau cutanate.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează LYSOBACT DUO

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține LYSOBACT DUO

Fiecare comprimat de supt conține: clorhidrat de lizozim 20 mg (corespunzător cu 800 000 U-FIF), clorură de cetilpiridiniu 1,5 mg.

Celelalte componente sunt: sorbitol (E420), povidonă, aromă de izmă bună, stearat de magneziu.

Cum arată LYSOBACT DUO și conținutul ambalajului

Descrierea medicamentului

Comprimat de supt

Comprimate rotunde, biconvexe de culoare albă sau aproape albă.

Conținutul ambalajului

Câte 10 comprimate de supt în blister PVC/PVdC/Al. Câte 2 blistere împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia și Herțegovina.

Fabricantul

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia și Herțegovina.

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2021.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>