

Prospect: informații pentru consumator/pacient

Auridexan 0,5 mg/ml picături auriculare, soluție

Decametoxina

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție dversă nementionată în acest prospect, vă rugăm să-I spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Auridexan și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Auridexan
3. Cum să luați Auridexan
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Auridexan
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Auridexan și pentru ce se utilizează

Decametoxina posedă acțiune antiseptică și un spectru larg de acțiune antimicrobiană față de microorganismele gram-pozitive și gram-negative. Preparatul posedă acțiune bactericidă, sporicidă, fungicidă.

Auridexan se utilizează în tratamentul inflamației urechii, fără perforarea timpanului, provocată de bacterii și fungi.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Auridexan

Nu utilizați Auridexan

- Dacă sunteți alergic la decametoxină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

Atenționări și precauții

Administrarea la copii

Lipsește informații privind administrarea preparatului la copii cu vârsta sub 12 ani.

Auridexan împreună cu alte medicamente

Nu sunt înregistrate interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează.

3. Cum săutilizați Auridexan

Utilizați întotdeauna Auridexan exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Pentru picurare în urechi.

După deschidere flaconul se închide cu căpăcelul-picurător.

Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani se instilează în fiecare ureche câte 2-3 picături soluție caldă, de 3-4 ori pe zi.

Durata curei de tratament se determină de către medic.

Dacă ați utilizat mai mult Auridexan decât trebuie

Nu sunt relatate cazuri de supradozare.

Preparatul este bine tolerat, deși în unele cazuri se înregistrează exacerbarea reacțiilor adverse.

Dacă uitați să luați Auridexan

Dacă este ora administrării dozei următoare omiteți doza, care nu a fost administrată la timp; administrați numai o doză, ca de obicei. Nu vă administrați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Auridexan

Dacă aveți orice întrebări cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Auridexan poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați vreuna din următoarele reacții adverse opriți administrarea de Auridexan și adresați-vă medicului dumneavoastră imediat.

Reacții adverse rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți):

- este posibilă senzație de arsură de scurtă durată, de asemenea reacții de iritare locală a pielii la nivelul locului de administrare (conductul auditiv extern, pavilionul urechii) în caz de hipersensibilitate la decametoxină.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea include orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Auridexan

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Auridexan picături auriculare, soluție după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Auridexan, 1 ml soluție conține:

- *Substanța activă* este decametoxin 0,5 mg;
- *Celelalte componente* este etanol 70%.

Cum arată Auridexan și conținutul ambalajului:

Cum arată

Lichid transparent, incolor, cu miros de alcooletilic.

Ambalaj

Câte 5 ml în flacon din sticlă.

Câte 1 flacon, împreună cu capacul picurător în ambalaj.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Uzina experimentală GNȚLS SRL,

or. Harkov, str. Vorobiov, 8.

Ucraina.

Fabricantul

”FARMEX GRUP” SRL,

Regiunea Kiev, or. Borispol,

str. Șevcenco 100.

Ucraina.

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>