

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

CHLOROPHYLLIN-OZ 10 mg/ml soluție alcoolică

Extractum folia Eucalypti

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Chlorophyllin-OZ
3. Cum să utilizați Chlorophyllin-OZ
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează

Chlorophyllin-OZ prezintă un amestec de clorofile din frunzele de eucalipt. Preparatul posedă acțiune antibacteriană față de stafilococi, inclusiv tulpinile rezistente la antibiotice.

Este utilizat în:

- Tratatamentul maladiilor provocate de tulpinile stafilococice rezistente la antibiotice; boala arșilor, ulcere trofice și ulcere trenante ale membrilor, în tratamentul complex al stărilor septic postoperatorii, postpartum și de altă genă; în tratamentul disbiozelor stafilococice ale intestinului și sanarea purtătorilor de stafilococi, eroziuni ale colului uterin.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI Chlorophyllin-OZ

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ

- dacă sunteți alergic la clorofil, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);

Aveți grijă deosebită când utilizați Chlorophyllin-OZ

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Chlorophyllin-OZ împreună cu alte medicamente

Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune.

Consultați medicul în condițiile în care mai luați:

Potențiază acțiunea antisepticelor.

Se va lua în considerație că la prezența în rană a resturilor de peroxid de hidrogen Chlorophyllin-OZ se sedimentează. De aceea după lavajul plăgii cu peroxid de hidrogen, plagă se spală cu soluție 0,9% de clorură de sodiu sterilă.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Preparatul nu se administrează în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Deoarece preparatul conține etanol 96%, se recomandă respectarea precauției la conducerea vehiculelor sau la folosirea utilajelor.

Acest medicament conține 1484 mg/doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii și grupuri cu risc crescut cum sunt pacienți cu boli hepatice sau epilepsie.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI Chlorophyllin-OZ

Chlorophyllin-OZ trebuie administrat exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani preparatul se administrează oral, local, sub formă de clisme.

La copii cu vârsta peste 12 ani preparatul se administrează la indicația medicului. Pe cale orală Chlorophyllin-OZ se administrează la purtătorii de stafilococi în intestin și pentru profilaxia complicațiilor postoperatorii. La adulți și copii cu vârsta peste 12 ani se administrează câte 5 ml soluție alcoolică de 1% dizolvată în 30 ml apă, de 3 ori pe zi cu 40 de minute până la mese, zilnic. Durata tratamentului se determină în mod individual în funcție de eficacitatea tratamentului și severitatea maladiei.

În tratamentul purtătorilor de stafilococi în intestin Chlorophyllin-OZ se administrează și sub formă de clisme (câte 20 ml soluție alcoolică 1% se dizolvă într-un litru de apă – aceasta este doza pentru o clismă). Procedura se efectuează o dată pe zi.

Clisma cu preparat se efectuează peste fiecare 2 zile.

Cura de tratament constituie 10 proceduri.

Pentru administrarea locală (tratamentul arsurilor și ulcerelor trofice) soluția alcoolică 1% se dizolvă în raport de 1: 5 cu soluție novocaină de 0,25%.

În tratamentul eroziunii colului uterin în prealabil se usucă cu tifon toate plicele mucoasei vaginale și părții vaginale ale colului uterin și se prelucrează cu soluție de 1% Chlorophyllin-OZ canalul colului uterin. Pentru irigarea vaginului 15 ml soluție alcoolică 1% se dizolvă într-un litru de apă.

Durata tratamentului depinde de evoluția bolii și este determinată în mod individual de medic.

Dacă ați utilizat mai mult Chlorophyllin-OZ decât trebuie

Medicul care vă tratează este instruit pentru a se ocupa de reacțiile adverse grave care pot să apară în cazul administrării unei doze prea mari de Chlorophyllin-OZ. Este posibilă exacerbarea reacțiilor adverse.

Dacă uitați să utilizați Chlorophyllin-OZ

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați CHLOROPHYLLIN-OZ

Luăți CHLOROPHYLLIN-OZ întreaga perioadă a tratamentului stabilită de medicul dumneavoastră, chiar și atunci când începeți să vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Chlorophyllin-OZ poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă prezentați vreuna din următoarele reacții adverse opriți administrarea de Chlorophyllin-OZ și adresați-vă medicului dumneavoastră imediat.

Acestea pot fi:

Rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 utilizatori):

Erupții cutanate, prurit, înroșirea pielii, edem angioneurotic (umflarea buzelor, mucoasei nazale, laringelui și etc.)

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amed.md> sau email: farmacovigilenta@amed.md Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ Chlorophyllin-OZ

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Chlorophyllin-OZ

1 ml soluție conține:

Substanța activă extract dens de chlorofilipt (10,76:1).

Celălalt component este etanol 93%.

Cum arată CHLOROPHYLLIN-OZ și conținutul ambalajului

Cum arată

CHLOROPHYLLIN-OZ se prezintă sub formă de lichid transparent de culoare verde.

Ambalaj

Câte 100 ml în flacon de 125 ml de culoare cafeniu închis din polivinil clorid netransparent cu gât filetat și flacon de 125 ml de culoare cafeniu închis din polimer netransparent cu gât filetat.

Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul Certificatului de Înregistrare

Uzina experimentală GNȚLS SRL,

or. Harkov, str. Vorobiov, 8. Ucraina.

Fabricantul

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.

61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22

Acest prospect este revizuit în Octombrie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>