

## **Prospect: Informații pentru consumator/pacient**

### **CHLOROPHYLLIN-OZ 2 mg/ml spray bucofaringian/cutanat/vaginal, soluție**

*Extract dens de clorofilipt*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Chlorophyllin-OZ
3. Cum să utilizați Chlorophyllin-OZ
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Chlorophyllin-OZ și pentru ce se utilizează**

Chlorophyllin-OZ conține în calitate de substanță activă extractul dens de clorofilipt, care prezintă un amestec de clorofile din frunze de eucalipt.

Medicamentul manifestă acțiune antimicrobiană, în special față de stafilococi, de asemenea posedă acțiune antiseptică și antiinflamatoare..

Chlorophyllin-OZ se utilizează pentru tratamentul maladiilor produse de stafilococii rezistenți la antibiotice: eroziuni ale colului uterin, combustii, ulcere trofice, infecții respiratorii acute (IRA), amigdalite.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Chlorophyllin-OZ**

##### **Nu utilizați Chlorophyllin-OZ:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la Chlorophyllin-OZ, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);

##### **Atenționări și precauții**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

După prima administrare e necesar de făcut o pauză de 6-8 ore. Tratamentul cu medicament e posibilă după confirmarea lipsei reacțiilor alergice la extractul dens de clorofilipt (posibilitatea edemului buzelor, mucoasei nazale, faringelui și altor reacții alergice). În cazul apariției oricăror dintre aceste simptome, opriți administrarea medicamentului și consultați medicul.

##### **Copii**

Experiența administrării medicamentului la copii lipsește.

### **Chlorophyllin-OZ împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Dacă luați acest medicament împreună cu altele, se poate schimba modul lor de acțiune. Consultați medicul dacă utilizați și alte antiseptice, deoarece Chlorophyllin-OZ le intensifică acțiunea.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Eficacitatea și siguranța medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării nu au fost studiate, de aceea medicamentul nu trebuie utilizat la această categorie de pacienți.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu influențează negativ asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

### **Informație importantă privind unele componente ale Chlorophyllin-OZ**

Acest medicament conține metilparahidroxibenzoat (E 218) și propilparahidroxibenzoat (E 216). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

### **3. Cum să utilizați Chlorophyllin-OZ**

Utilizați întotdeauna Chlorophyllin-OZ exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Chlorophyllin-OZ se administrează local: bucofarongian, vaginal, cutanat.

În maladii inflamatoare ale căilor respiratorii superioare (amigdalită, infecții respiratorii acute) adulților se va pulveriza în gât, presând de 2 ori pe valva flaconului, de 3-4 ori pe zi timp de 3-4 zile.

În tratamentul eroziunilor, ulcerelor trofice, combustiilor se va umezi cu Chlorophyllin-OZ o meșă de tifon și se va aplica pe piele sau mucoase pentru 15-20 min. Procedura se va efectua de 2 ori pe zi, timp de 10 zile, zilnic.

### **Dacă ați utilizat mai mult Chlorophyllin-OZ decât trebuie**

Medicul care vă tratează este instruit pentru a se ocupa de reacțiile adverse grave care pot să apară în cazul administrării unei doze prea mari de Chlorophyllin-OZ .

### **Dacă uitați să utilizați Chlorophyllin-OZ**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați CHLOROPHYLLIN-OZ**

Utilizați Chlorophyllin-OZ întreaga perioadă a tratamentului, stabilită de medicul dumneavoastră, chiar și atunci când începeți să vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Chlorophyllin-OZ poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Dacă apare această reacție adversă gravă, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:**

- reacție alergică gravă cu umflare dureroasă a buzelor, limbii, feței sau gâtului și dificultate bruscă în respirație, când vorbiți sau la înghițire (edem angioneurotic).

Alte reacții adverse, care pot apărea pe durata tratamentului cu Chlorophyllin-OZ

*Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):*

- reacții alergice (posibil întârziate), inclusiv erupții cutanate, mâncărime, înroșirea pielii;
- dureri de cap, amețeli;
- iritarea mucoasei cavității bucale, grețuri, vomă.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Chlorophyllin-OZ**

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

A se feri de lumina solară directă.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Chlorophyllin-OZ după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Chlorophyllin-OZ**

*Substanța activă este extractul dens de clorofilipt.*

1 flacon (15 ml soluție) conține extract dens de clorofilipt 30 mg.

*Celelalte componente sunt:* etanol (96%), glicerol, polisorbit-80, metilparahidroxibenzoat (E 218), propilparahidroxibenzoat (E 216), apă purificată.

**Cum arată CHLOROPHYLLIN-OZ și conținutul ambalajului**

Chlorophyllin-OZ se prezintă sub formă de lichid opalescent de culoare de la verde-deschis până la verde, cu miros specific.

Chlorophyllin-OZ este disponibil în cutii cu 1 flacon, prevăzut cu pompă dozatoare, care conține 15 ml soluție.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul****Deținătorul Certificatului de Înregistrare**

Uzina experimentală GNȚLS SRL, Ucraina.

or. Harkov, str. Vorobiov, 8.

**Fabricantul**

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina.

61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22

**Acest prospect este revizuit în Aprilie 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>