

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Depantol 52,5 mg +8,02 mg/g cremă
Dexpanthenolum + Chlorhexidinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10-14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Depantol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Depantol
3. Cum să utilizați Depantol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Depantol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Depantol cremă și pentru ce se utilizează

Depantol conține două substanțe active - dexpanthenol și clorhexidină bigluconat. Dexpanthenolul ajută la vindecarea leziunilor mici și a iritațiilor pielii. Clorhexidina bigluconat este un agent antimicrobian, protejează suprafața plăgii de infecții, inhibă dezvoltarea unui proces infecțios.

Depantol este utilizat pentru:

- Prelucrarea și tratamentul:
 - rănilor mici cu pericol de infectare (pătrunderea microbilor), cum ar fi escorații, zgârieituri, tăieturi mici și leziuni de grataj, fisuri, arsuri ușoare;
 - pentru tratamentul plăgilor infectate (cu aspect inflamator) a țesutului de la exterior;
 - fisuri la nivelul mameloanelor în timpul alăptării;
- Pentru rănilor cronice, de exemplu, ulcere trofice ale gambei, escarelor și rănilor postoperatorii.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Depantol

Nu utilizați Depantol:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la bigluconat de clorhexidină, dexpanthenol sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct.6);
- dacă aveți leziuni grave, profunde și contaminate (astfel de răni necesită intervenție medicală);
- Nu tratați canalul auditiv cu cremă, mai ales dacă aveți un proces inflamator la ureche și știți sau suspectați că aveți un timpan lezat.

Atenționări și precauții

Înainte de administrarea preparatului Depantol cremă adresați-vă medicului sau farmacistului pentru consultație.

A se evita contactul cremei cu ochii, cu urechile și membranele mucoase.

Depantol nu trebuie utilizată pentru tratarea iritațiilor cutanate care nu sunt predispuse la infecții (de exemplu arsuri solare).

Aplicarea frecventă în una și aceeași zonă a pielii poate duce la iritații.

Medicamentul este destinat pentru tratamentul rănilor mici, deaceia ar trebui evitate aplicarea cantităților mari de cremă.

Adresați-vă medicului dacă aveți zone mari afectate, răni contaminate și adânci, precum și rănilor cu rupturi și rănilor cu perforație (pericolul tetanosului).

Adresați-vă medicului, dacă dimensiunea răni rămâne mare și nu se modifică după o perioadă de timp sau dacă rana nu se vindecă în decurs de 10-14 zile.

Consultația medicului este necesară și în următoarele cazuri: marginile plăgii sunt extrem de hiperemiate (este puternic înroșită), în rană sunt procese inflamatorii, durere severă sau leziunea este însoțită de febră (pericol de sepsis).

Depantol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alt medicament.

Clorhexidina este incompatibilă cu săpunul sau cu alte substanțe anionice. Ca măsură de precauție cu privire la posibila interacțiune (antagonism (reducerea acțiunii) sau inactivare), nu trebuie de folosit simultan cu alte preparate antiseptice.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Depantol cremă se poate de utilizat în timpul sarcinii și alaptării. Dar se vor evita aplicarea cremei pe suprafețe extinse ale corpului. Dacă preparatul se utilizează pentru fisurile mamiloanelor în timpul perioadei de alăptarea, mamilonul se va spăla bine înainte de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează capacitatea de a conduce autovehicole sau de a manevra utilaje potențial periculoase.

Depantol conține propilenglicol. Poate provoca iritație cutanată.

Depantol conține alcool cetostearilic. Poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Depantol

Utilizați întotdeauna Depantol exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Depantol cremă se utilizează numai cutanat.

Crema se aplică în strat subțire pe suprafața afectată o dată sau de câteva ori pe zi, în funcție de indicație.

La femeile ce alăptează se prelucrează mamelonul după alăptare.

Sugarilor se aplică pe regiunea infectată după schimbul de albituri sau după baie.

Spălați-vă mâinile după aplicarea cremei cu excepția cazului în care mâinile sunt locul de tratament.

Dacă nu există nici o îmbunătățire după tratament sau simptomele se înrăutățesc sau apar simptome noi, este necesar să se consulte un medic. Utilizați medicamentul numai în conformitate cu indicațiile, metoda de administrare și dozele indicate în acest prospect.

Dacă utilizați mai mult Depantol decât trebuie

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

Dacă ați administrat o doză semnificativ de mare adresați-vă medicului (luați ambalajul preparatului cu dumneavoastră).

Dacă uitați să utilizați Depantol

Dacă ați uitat să utilizați medicamentul la timpul necesar, nu vă neliniștiți, utilizați medicamentul imediat cum v-ați amintit, apoi utilizați preparatul conform recomandărilor.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Depantol

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții adverse au fost raportate la utilizarea Depantol:

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):

-reacții alergice, cum ar fi dermatita de contact, dermatita alergică, prurit, eritem (înroșire), eczemă, erupție cutanată, urticarie, iritarea pielii;

- reacție anafilactică, șoc anafilactic (reacții alergice care pot pune viața în pericol, care se pot manifesta prin mâncărime severă a întregului corp, umflarea feței, laringelui, dificultăți de respirație, scăderea bruscă a tensiunii arteriale).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Depantol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultimazi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și informații suplimentare

Ce conține Depantol

- *Substanțele active sunt:* dexpanthenol și bigluconat de clorhexidină. 1 g crema conține substanțe active: dexpanthenol – 52,5 mg, soluție de bigluconat de chlorhexidina 20%– 42,7 mg, în

recalcul la bigluconat de clorhexidina – 8,02 mg.

- *Celelalte componente sunt:* propilenglicol, macrogol cetostearil, alcool cetostearilic [alcool cetilic nu mai mult de 60%, alcool stearilic nu mai puțin de 40%], parafină lichidă, vaselină, hidrogenofosfat de sodium dodecahidrat, dihidrogenofosfat de potasiu, apă purificată.

Cum arată Depantol și conținutul ambalajului

Cremă de culoare albă sau aproape albă.

Câte 30g în tuburi de aluminiu sau tuburi de polietilenă laminată. Fiecare tub împreună cu prospectul se plasează în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Nijfarm”, Rusia
603950, Nijnii Novgorod,
str. Salganskaya, 7
tel.: (831) 278-80-88
tax: (831) 430-72-28

Fabricantul

SA „Nijfarm”, Rusia
603950, Nijnii Novgorod,
str. Salganskaya, 7

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>