

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Dixipantol 100 mg/16 mg ovule

Dexpantenol / digluconat de clorhexidină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Dixipantol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dixipantol
3. Cum să utilizați Dixipantol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Dixipantol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Dixipantol și pentru ce se utilizează

Dixipantol este un medicament combinat pentru administrare locală, cu acțiune regenerantă, metabolică și antiseptică. Aparține grupului de medicamente antiinfecțioase și antiseptice ginecologice. Conține ca substanțe active dexpantenol și digluconat de clorhexidină.

Dixipantol se utilizează pentru:

- tratamentul vaginitelor acute și cronice, vaginozei bacteriene, endo/exocervicitelor, eroziunilor colului uterin de etiologie specifică (în tratamentul complex);
- profilaxia complicațiilor infecțioase și inflamatorii în obstetrică și ginecologie: înainte de tratamentul chirurgical al bolilor ginecologice, naștere, întreruperea medicală a sarcinii, examinări intrauterine (inclusiv histeroscopie, histerosalpingografie), înainte de instalarea unui contraceptiv intrauterin;
- sporirea regenerării mucoasei vaginului și a colului uterin după utilizarea metodelor distructive de tratament (diatermocoagulare, criodenaturare, lazerocoagulare), în perioada postoperatorie și postpartum (postnatală).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Dixipantol

Nu utilizați Dixipantol

- dacă sunteți alergică (hipersensibilă) la dexpantenol, digluconat de clorhexidină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Dixipantol, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă apar reacții adverse, întrerupeți utilizarea medicamentului și consultați un medic.

Pe durata tratamentului se recomandă să vă abțineți de la relații sexuale.

Spălați-vă pe mâini înainte și după utilizarea medicamentului

Dixipantol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Datorită posibilității de interacțiune (antagonism sau inactivare), Dixipantol nu trebuie utilizat concomitent cu alte preparate antiseptice administrate vaginal.

Acest medicament nu este compatibil cu săpunurile și alți compuși anionici (saponine, laurilsulfat de sodiu, carboximetilceluloză sodică), dacă se administrează vaginal.

Nu se recomandă tratament simultan cu medicamente care conțin iod utilizate vaginal.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a administra acest medicament.

Medicamentul poate fi administrat în timpul sarcinii și alăptării la recomandarea medicului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Dixipantol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se administrează pe cale vaginală. Câte un ovul de 2 ori pe zi timp de 7-10 zile. În caz de necesitate cura de tratament poate fi prelungită până la 20 zile.

Dacă utilizați mai mult Dixipantol decât trebuie

Cazuri de supradozaj n-au fost semnalate.

Dacă v-ați administrat o doză mai mare decât cea recomandată, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Dixipantol

Utilizați Dixipantol imediat ce v-ați amintit. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Dixipantol

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

1) Pe durata tratamentului pot apărea reacții adverse severe:

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori):

- reacții de hipersensibilitate, inclusiv reacții alergice severe și anafilaxie, provocate de digluconatul de clorhexidină.

În cazul apariției unor astfel de reacții adverse severe opriți utilizarea de Dixipantol și adresați-vă IMEDIAT medicului dumneavoastră.

2) Alte reacții adverse care pot să apară:

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):

- reacții alergice, prurit (mâncărime), senzație de arsură la locul de aplicare.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Dixipantol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Dixipantol

- Substanțele active sunt dexpanenol și digluconat de clorhexidină (sub formă de digluconat de clorhexidină soluție 20 %). Fiecare ovul conține dexpanenol 100 mg, digluconat de clorhexidină (sub formă de digluconat de clorhexidină soluție 20 %) 16 mg.
- Celelalte componente sunt macrogol 1500, macrogol 400.

Cum arată Dixipantol și conținutul ambalajului

Ovule de formă cilindro-conică de culoare albă sau albă cu nuanță cenușie sau albă cu nuanță gălbuie.

Este disponibil în cutii de carton cu 2 blistere a câte 5 ovule împreună cu prospectul.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FARMAPRIM SRL

str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,

Republica Moldova, MD-4829

telefon (+373 22) 28-18-45

fax (+373 22) 28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md

Fabricantul

FARMAPRIM SRL

str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,
Republica Moldova, MD-4829

Acest prospect a fost aprobat August 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>