

Prospect: informații pentru consumator/pacient

ENGYSTOL comprimate

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Engystol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Engystol
3. Cum să utilizați Engystol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Engystol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Engystol și pentru ce se utilizează

Engystol este un medicament homeopat, care se utilizează ca adjuvant în activarea sistemului imun nespecific pentru tratamentul infecțiilor de tipul gripei sau, în general, a infecțiilor de origine virală.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Engystol

Nu utilizați Engystol:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Atenționări și precauții

Dacă simptomele persistă sau se agravează, trebuie să consultați un medic sau un profesionist din domeniul sănătății.

Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiența de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament.

Engystol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Engystol nu interacționează cu alte medicamente.

Engystol împreună cu alimente, băuturi și alcool

Ca și orice medicament homeopat, Engystol trebuie administrat cu 15-20 minute înainte sau cu 1 oră după mese.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există informații disponibile despre utilizarea produsului în perioada de sarcină și alăptare. Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării. Nu au fost raportate careva efecte adverse.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Engystol nu influențează capacitatea de a conduce vehicule să de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Engystol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard

Adulți (și copiii cu vârsta ≥ 12 ani): câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Nou-născuți și copiii cu vârsta până la 2 ani: câte 1 comprimat pe zi. A se mărunți și dizolva comprimatul în 1 linguriță de apă.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: câte 1 comprimat de 1-2 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: câte 1 comprimat de 2 ori pe zi.

Doza în stări acute sau doza inițială

Adulți (și copiii cu vârsta ≥ 12 ani): câte 1 comprimat la fiecare 0,5-1 ore, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Nou-născuți și copiii cu vârsta până la 2 ani: câte 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 4 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard. A se mărunți și dizolva comprimatul în 1 linguriță de apă.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani: câte 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 6 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani: câte 1 comprimat la fiecare 1-2 ore, până la 8 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Mod de administrare

Comprimatele se vor menține în gură până la dizolvare. Preparatul trebuie administrat în afara meselor.

Este posibilă sfărâmarea comprimatului până la obținerea pulberii și dizolvarea acesteia într-o cantitate mică de apă (pentru a fi mai ușor administrat copiilor).

Durata tratamentului – 1 săptămână.

Dacă utilizați mai mult Engystol decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Engystol

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Engystol

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Engystol:

Foarte rare (care afectează mai puțin de 1 din 10000 persoane)

- reacții alergice pe piele, cum ar fi – apariția de pete roșii pe piele, mâncărimi, înroșirea pielii.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi stabilită în baza informațiilor disponibile)

- acuze gastrointestinale (durere abdominală sau discomfort abdominal)

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Engystol

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Engystol

1 comprimat conține:

Substanțe active:

Sulfur	D10	37,5 mg
Sulfur	D4	37,5 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D30	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D10	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D6	75,0 mg

celelalte componente sunt: lactoză, stearat de magneziu.

Cum arată Engystol și conținutul ambalajului

Engystol se prezintă sub formă de comprimate rotunde, cu fațete, de culoare de la albă la alb-gălbuie.

Conținutul ambalajului

Câte 50 de comprimate ambalate în flacon din plastic. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în curție de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>