

## **Prospect: informații pentru consumator/ pacient**

### **Heparin 100 UI + 0,04 g + 0,0008 g/g unguent** Heparini natrium + Benzocainum + Benzyllic nicotinas

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întodeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **În acest prospect găsiți:**

1. Ce este Heparin unguent și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Heparin unguent
3. Cum să utilizați Heparin unguent
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Heparin unguent
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Heparin unguent și pentru ce se utilizează**

Heparin unguent este un preparat combinat, acțiunea căruia este determinată de proprietățile substanțelor din componența sa.

*Heparina* este un anticoagulant cu acțiune directă, face parte din heparine cu masa moleculară medie. La aplicare topică manifestă acțiune anticoagulantă (preîntâmpină formarea trombilor), antiexsudativă (preîntâmpină formarea infiltratelor în inflamații), antiinflamatoare moderată. Heparina favorizează absorbția hematoamelor, trombilor și reduce edemul tisular.

Nicotinatul de benzil este un vasodilatator periferic (dilată vasele sangvine mici), contribuie la îmbunătățirea microcirculației. Se utilizează în calitate de adjuvant pentru facilitarea pătrunderii heparinei.

Benzocaina manifestă acțiune analgezică locală.

Heparina unguent se folosește în:

- tromboflebita venelor superficiale, periflebită superficială;
- hematom subcutanat;
- flebite după administrarea intravenoasă a medicamentelor;
- mastită superficială;
- infiltrate și edeme locale;
- traume și contuzii (inclusiv ale țesutului muscular, tendoanelor și articulațiilor);
- hemoroizi externi, inflamația nodulilor hemoroidali postpartum,
- limfoedem (elefantiazis), limfangită.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Heparin unguent**

##### **Nu utilizați Heparin unguent**

- dacă sunteți alergic (hipersensibilitate înaltă) la substanțele active sau oricare dintre celelalte componente ale preparatului (enumerat în pct. 6);
- dereglarea integrității tegumentelor (plăgi deschise infectate, în special procese ulceronecrotice);

- copii cu vârsta până la 1 an.

### **Atenționări și precauții**

Preparatul se va administra cu precauție dacă aveți tulburări de coagulare a sângelui, trombocitopenie (micșorarea cantității de trombocite).

La aplicare îndelungată a unguentului pe suprafețe extinse și administrarea concomitentă a preparatelor orale cu acțiune asupra sistemului sanguin și/sau hematopoietic, medicul dumneavoastră vă va monitoriza timpul de coagulare și timpul protrombinic.

La necesitatea curei îndelungate de tratament și pe suprafețe extinse în sarcină și la femei cu vârsta peste 65 ani, medicul dumneavoastră vă va monitoriza timpul de coagulare și timpul protrombinic.

Nu se recomandă de aplicat pe plăgi deschise și în caz de procese purulente.

Administrarea unguentului nu se recomandă în tromboza venoasă profundă.

### **Heparin unguent împreună cu alte medicamente**

Anunțați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă administrați sau de curând ați administrat alte medicamente.

Unguentul nu se aplică concomitent cu preparatele antiinflamatoare nesteroidiene (preparate ce se utilizează în dureri, febră și inflamații), tetraciline, blocantele receptorilor H1-histaminergici (medicamente folosite în alergii).

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că sunteți gravidă sau planificați să aveți un copil, consultați medicul sau farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Administrarea unguentului în timpul sarcinii și alăptării este posibil numai dacă a fost recomandat de medicului dumneavoastră și va fi utilizat pe un termen scurt.

Inofensivitatea administrării preparatului în sarcină și perioada de alăptare nu este stabilită. Heparina nu trece bariera placentară și nu se excretă în laptele matern. Date privind excreția altor componente ale preparatului în laptele matern nu există.

Administrarea preparatului în sarcină și perioada de alăptare e posibilă numai dacă beneficiile scontate pentru mamă justifică riscul potențial pentru făt sau sugar.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Heparin unguent nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Heparin unguent**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Unguentul se aplică cutanat.

Unguentul se aplică în strat subțire pe porțiunea afectată (câte 0,5-1 g (2-4 cm unguent) pe o suprafață cu diametrul 3-5 cm) și se fricționează ușor în piele. Unguentul se aplică de 2-3 ori pe zi, zilnic, până la dispariția semnelor de inflamație, în medie timp de 3-7 zile. Posibilitatea continuării tratamentului este determinată de medicul dumneavoastră.

În caz de tromboză a nodurilor hemoroidali externi unguentul se aplică pe un pansament de bumbac, care se aplică nemijlocit pe noduli și se fixează. Tamponul umezit cu unguent se introduce în rect.

Unguentul se aplică zilnic, până la dispariția simptomelor, în mediu de la 3 până la 14 zile.

### **Dacă ați utilizat mai mult Heparin unguent decât trebuie**

Nu utilizați unguent de două ori pentru a compensa doza uitată.

Utilizați unguentul, de îndată ce vă amintiți și continuați să-l aplicați în conformitate cu recomandările.

## **Dacă ați utilizat mai mult Heparin unguent decât trebuie**

La aplicare cutanată supradozarea e imposibilă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

La utilizarea unguentului au fost raportate următoarele reacții adverse:

*Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile)* - reacții alergice (erupții cutanate, prurit); hiperemie cutanată (înroșirea pielii), scăderea sensibilității la locul de aplicare (la utilizare un timp îndelungat).

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www: amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail :[farmacovigelenta@amed.md](mailto:farmacovigelenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Heparin unguent**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 20 °C.

Nu utilizați Heparin unguent după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți.

Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține Heparin unguent**

-*Substanțele active sunt* heparina sodică, benzocaina, nicotinat de benzil. 1 g unguent conține: heparină sodică – 100 UI (0, 833 mg heparina sodica cu activitatea de 120 UI/mg), benzocaină – 40 mg, nicotinat de benzil – 0,8 mg;

-*Celelalte componente sunt:* glicerol, vaselina, acid stearic (acid stearic 50), ulei de piersici, emulgator N 1, parahidroxibenzoat de metil ( 218), parahidroxibenzoat de propil (216), apa purificata.

### **Cum arată Heparin unguent și conținutul ambalajului**

Unguent 100UI+0,04g+0,0008g/g.

Unguent de culoare albă până la alb cu nuanță gălbuie.

Câte 25 g în tuburi de aluminiu sau în tuburi de polietilenă laminate. Câte 1 tub împreună cu prospectul se plasează în cutie de carton.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

SA „Nijfarm”, Rusia  
603950, or. Nijnii Novgorod,  
str. Salganskaya, bl. 7  
Tel.: (831) 278-80-88;  
Fax: (831) 430-72-28

**Fabricantul**

SA „Nijfarm”, Rusia  
603950, or. Nijnii Novgorod,  
str. Salganskaya, bl. 7

**Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2018.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>