

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Herbion Ivy 7 mg/ml sirop *Hederæ heliçis folii extractum siccum*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 - Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
 - Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
 - Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Herbion Ivy sirop și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Herbion Ivy
3. Cum să luați Herbion Ivy sirop
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Herbion Ivy sirop
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Herbion Ivy sirop și pentru ce se utilizează

Herbion Ivy sirop conține extract uscat de frunze de iederă.
Herbion Ivy este un medicament din plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Herbion Ivy sirop

Nu luați Herbion Ivy sirop:

- dacă sunteți alergic la extractul de frunze de iederă, la alte plante din familia *Araliaceae* (iederă) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Nu administrați acest medicament copiilor cu vârsta sub 2 ani, din cauza riscului agravării simptomelor respiratorii asociate cu medicamente care fluidifică mucusul gros în tractul respirator.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Herbion Ivy sirop, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă apare dificultate la respirație, febră sau spută purulentă (cu conținut de puroi), trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- dacă simptomele bolii nu se ameliorează timp de 7 zile de utilizare a acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

- nu este recomandată utilizarea acestui medicament împreună cu alte medicamente care inhibă tusea (antitusive cum sunt codeina sau dextrometorfanul) fără indicație medicală.
- dacă aveți probleme la stomac (gastrită, ulcer la stomac), acest medicament trebuie utilizat cu precauție.

Copii și adolescenți

Dacă copiii cu vârsta între 2-4 ani prezintă tuse persistentă sau recurentă, este necesar consult medical înainte de începerea tratamentului.

Herbion Ivy sirop împreună cu alte medicamente

Comunicați medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați orice alte medicamente. Nu există date privind influența Herbion Ivy asupra efectelor altor medicamente.

Herbion Ivy sirop împreună cu alimente și băuturi

Puteți lua Herbion Ivy sirop indiferent de orarul meselor.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Herbion Ivy sirop nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu există date suficiente privind utilizarea extractului de frunze de iederă la femei gravide și mame care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu s-a raportat ca Herbion Ivy sirop să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Herbion Ivy sirop conține sorbitol (E420) și alcool etilic

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l contactați înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament conține cantități mici de alcool etilic, mai puțin de 100 mg per doză.

3. Cum să luați Herbion Ivy sirop

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți

Doza recomandată pentru **adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste** este de 5 până la 7,5 ml sirop, de două ori pe zi.

Utilizarea la copii și adolescenți

Doza recomandată pentru **copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani și 11 ani** este de 5 ml sirop de două ori pe zi.

Doza recomandată pentru **copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 5 ani** este de 2,5 ml sirop de două ori pe zi.

Utilizarea la **copii cu vârsta sub 2 ani** este contraindicată.

Administrați siropul dimineța și după-amiaza devreme (după masa de prânz). Puteți lua medicamentul independent de orarul meselor.

Când luați Herbion Ivy sirop, consumați multă apă sau alte lichide calde, care nu conțin cofeină.

Dacă utilizați acest medicament și simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână, consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă luați mai mult Herbion Ivy sirop decât trebuie

Nu luați doze mai mari decât cele recomandate. Administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate (mai mult de o doză de două ori pe zi) poate provoca greață, vărsături, diaree și agitație. Tratamentul este simptomatic.

Dacă uitați să luați Herbion Ivy sirop

Nu luați o doză dublă, pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- greață, vărsături, diaree, reacție alergică manifestată sub formă de blânde (urticarie), erupție cutanată și dificultăți la respirație (dispnee).

- reacție alergică severă (reacție anafilactică), care se poate manifesta prin umflarea feței, buzelor și pleoapelor și dificultăți de respirație.

Dacă apar aceste simptome, încetați să luați medicamentul și solicitați ajutor medical urgent.

Dacă apare vreo reacție alergică, întrerupeți utilizarea medicamentului și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amdm.gov.md> sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Herbion Ivy sirop

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Aceste medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.
Siropul trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Herbion Ivy sirop

- Substanța activă este extractul uscat de frunze de iederă. 1 ml sirop conține 7 mg extract uscat din frunze de iederă (*Hedera helix* L., folium) (5–7,5:1).
Solvent de extracție: alcool etilic 30% (m/m).
- Celelalte componente sunt: Sorbitol lichid (necristalizabil)(E420), glicerol (E 422), benzoat de sodiu (E211), acid citric monohidrat (E330), aromă balsamică de lămâie (propilenglicol (E1520), alcool etilic (E1510), ulei esențial de citronella, citral din *Litsea cubeba*, ulei esențial de lămâie distilat; ulei de coriandru), apă purificată. Vezi pct. 2 *Herbion Ivy sirop conține sorbitol (E420) și alcool etilic.*

Cum arată Herbion Ivy sirop și conținutul ambalajului

Siropul are o culoare galben-brun, miros și gust specific. Poate fi observat un sediment în cantitate redusă.

Siropul este disponibil în cutie cu 1 flacon cu 150 ml sirop și o linguriță dozatoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia.

Fabricantul

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Slovenia

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>