

Prospect: Informații pentru utilizator

Hexicon 16 mg ovule

Chlorhexidinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întodeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Hexicon ovule și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hexicon ovule
3. Cum să utilizați Hexicon ovule
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Hexicon ovule
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Hexicon ovule și pentru ce se utilizează

Hexicon este un preparat antiseptic pentru administrare locală, activ față de protozoare, bacterii gram-pozitive și gram-negative, virusuri, inclusiv: *Treponema pallidum*, *Chlamidia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, virusul Herpes. Față de preparat posedă o sensibilitate joasă unele tulpini de *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., precum și unele forme de bacterii acidorezistente, sporii bacteriilor, fungii.

Hexicon nu afectează funcția lactobacililor. Își menține activitatea (deși e mai redusă) în prezența sângelui, puroiului.

Hexicon se utilizează în

- profilaxia infecțiilor sexual-transmisibile (chlamidioză, ureaplasmoză, trichomoniază, gonoree, sifilis, herpes genital și etc.).
- profilaxia complicațiilor infecțios-inflamatorii în practica obstetrico-ginecologică (înainte de tratamentul chirurgical al maladiilor ginecologice, înainte de naștere și avort, înainte și după aplicarea dispozitivului intrauterin (DIU), înainte și după diatermocoagularea colului cervical, înainte de examenul intrauterin).
- tratamentul vaginitei bacteriene, colpitei (inclusive nespecifice, mixte, trichomoniazice).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hexicon ovule

Nu utilizați Hexicon ovule

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la acidul lactic sau oricare dintre celelalte componente ale preparatului (enumerat în pct.6);

Aveți grijă deosebită când utilizați Hexicon ovule

Înainte de utilizarea preparatului Hexicon ovule adresați-vă medicului sau farmacistului pentru

consultație. În cazul unor simptome necunoscute sau noi, Dumnevoastră trebuie să vă adresați la medic.

Dacă apar senzații neplăcute (arsură, prurit) se recomandă de întrerupt tratamentul. La utilizarea medicamentului pot crește secrețiile vaginale. De regulă, o cantitate mică de secreții transparente, nu necesită întreruperea tratamentului. Odată cu apariția secrețiilor sangvinolente, se recomandă întreruperea utilizării medicamentului și consultarea medicului dumneavoastră.

Spălați-vă bine pe mâini după contactul cu medicamentul.

Igiena organelor genitale externe nu afectează eficacitatea și tolerabilitatea ovulelor Hexicon.

Hexicon ovule împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alt medicament.

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu preparate de iod.

Hexicon este incompatibil cu detergenții, care conțin grupa anionică (saponine, laurilsulfat de sodiu, carboximetilceluloză sodică), precum și cu săpunuri.

Igiena organelor genitale externe nu afectează eficacitatea și tolerabilitatea ovulelor Hexicon, deoarece preparatul se utilizează vaginal.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Este posibilă administrarea în sarcină și în perioada de alăptare.

Este posibilă administrarea în sarcină și în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Hexicon ovule nu influențează capacitatea de a conduce autovehicole sau de a manevra utilaje potențial periculoase.

3. Cum să utilizați Hexicon ovule

Utilizați întotdeauna Hexicon ovule exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Hexicon ovule se administrează vaginal.

Înainte de administrare ovulul se eliberează de ambalajul de contur.

Pentru tratament: câte 1 ovul de 2 ori pe zi, timp de 7-10 zile.

Pentru profilaxia bolilor sexual-transmisibile: câte 1 ovul nu mai târziu de 2 ore după raportul sexual neprotejat.

Dacă ați utilizat mai mult Hexicon ovule decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult decât trebuie Hexicon ovule anunțați cât mai urgent posibil medicului sau farmacistului. Dacă e posibil luați ambalajul cu dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Hexicon ovule

Dacă ați uitat să folosiți Hexicon, luați-l cum v-ați amintit.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții adverse au fost raportate la utilizarea Femilex ovule:

Foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți)

- reacții de hipersensibilitate, inclusiv reacții alergice severe și anafilaxie

Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile):

- reacții alergice (urticărie, prurit),
- senzație de arsură,
- eliminări sangvinolente vaginale.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

www.amed.md sau e- [mail: farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Hexicon ovule

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Condiții de păstrare:

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și informații suplimentare

Ce conține Hexicon ovule

1 ovul conține

– *substanța activă:* soluție de bigluconat de clorhexidină 20% – 85,2 mg (în recalcul la bigluconat de clorhexidină - 16 mg);

– *celelalte componente sunt:* amestec de macrogol (Macrogol - 1500, Macrogol - 400)-până la obținerea ovulului cu masa de 3,10 g.

Cum arată Hexicon ovule și conținutul ambalajului

Ovule de formă cilindrico-conică, de culoare albă sau albă cu nuanță gălbuie,. Se admite suprafața marmorată , prezența în secțiune a unui ax aerian și a depresiunii în formă de pâlnie.

Câte 1 sau 5 supozitoare în blister din folie de clorură de polivinil laminat cu polietilenă.

1 blister cu 1 supozitor și 2 degetare, 2 blistere a câte 5 supozitoare, însoțite de prospect se plasează în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA „Nijfarm”, Rusia
603950, or. Nijni Novgorod
str. Salganskaya, 7
Tel.: (831) 278-80-88, fax: (831) 430-72-28

Fabricantul

SA „Nijfarm”, Rusia

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2019

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>