

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

LINKUS PLUS sirop

Combinație

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este LINKUS PLUS și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS PLUS
3. Cum să utilizați LINKUS PLUS
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează LINKUS PLUS
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este LINKUS PLUS și pentru ce se utilizează

LINKUS PLUS prezintă un amestec optim de plante medicinale minuțios selectate cu o acțiune expectorantă, mucolitică, bronhodilatatoare, antiinflamatoare și emolientă. Mucilagiile vegetale acoperă mucoasele într-un strat subțire, care se menține timp îndelungat și le protejează de iritare.

Calmează tusa, diluează sputa vâscoasă și contribuie la eliminarea rapidă a ei din căile respiratorii, reduce edemul și inflamația mucoasei bronhiilor, stimulează imunitatea.

LINKUS PLUS se utilizează în calitate de remediu expectorant în afecțiunile respiratorii, însoțite de tuse productivă:

- inflamația bronhiilor și a plămânilor, astm bronșic și tuberculoză;
- răceală, reacții alergice și tusea „fumătorului”;
- afecțiuni inflamatoare ale căilor respiratorii superioare (inflamația laringelui și a faringelui, a sinusurilor paranazale, traheei, amigdalelor).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS PLUS

Nu utilizați LINKUS PLUS:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- dacă aveți tensiune arterială înaltă;
- dacă aveți afecțiuni renale, cardiovasculare sau hepatice;
- dacă aveți nivel redus de potasiu în sânge (hipokaliemie);
- la copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza LINKUS PLUS.

A se agita flaconul înainte de utilizare.

Copii

A nu se utiliza copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

LINKUS PLUS împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

În special informați medicul dumneavoastră, dacă utilizați următoarele medicamente, deoarece nu se recomandă administrarea lor împreună cu LINKUS PLUS:

- medicamente utilizate pentru a calma tusea (antitusive);
- medicamente care reduc eliminarea sputei;
- diuretice (utilizate pentru a elimina apa din organism);
- glicozide cardiace (utilizate în boli de inimă);
- corticosteroizi (utilizate în boli inflamatoare);
- laxative (utilizate în constipații).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în timpul sarcinii și perioadei de alăptare este posibilă doar la indicația medicului dumneavoastră, dacă el consideră că beneficiul scontat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unii excipienți ai LINKUS PLUS

LINKUS PLUS sirop conține 7 g zaharoză per 10 ml. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat, de asemenea persoanele care urmează un regim hipocaloric.

LINKUS PLUS sirop conține metilhidroxibenzoat (E218) și propilhidroxibenzoat (E216). Pot provoca reacții alergice (chiar întârziate) și, în mod excepțional, bronhospasm.

3. Cum să utilizați LINKUS PLUS

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Adulți: câte 1 lingură de desert (10 ml) de 3 ori pe zi

Medicamentul se administrează independent de mese.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 7-10 zile.

Dacă utilizați mai mult LINKUS PLUS decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați LINKUS PLUS

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați LINKUS PLUS

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează LINKUS PLUS

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a flaconului reprezintă 8 săptămâni.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține LINKUS PLUS

10 ml sirop conține extracte din:

10 ml sirop conține extracte din:

- frunze de nuc de Malabar (<i>Adhatoda vasica</i>)	70 mg
- fructe de anason stelat (<i>Illicium verum</i>)	50 mg
- fructe de <i>Solanum xanthocarpum</i>	30 mg
- frunze și flori de busuioc (<i>Ocimum basilicum</i>)	30 mg
- semințe de nalbă mare (<i>Althaea officinalis</i>)	15 mg
- rădăcini de lemn-dulce (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	15 mg
- fructe de piper indonezian (<i>Piper longum</i>)	10 mg
- fructe de <i>Cordia latifolia</i>	10 mg

Celelalte componente sunt: zaharoză, acid citric anhidru, clorură de amoniu

metilhidroxibenzoat (E218), propilhidroxibenzoat (E216), propilenglicol, ulei de eucalipt, ulei de mentă, aromă „gumă de mestecat”, apă purificată.

Cum arată LINKUS PLUS și conținutul ambalajului

LINKUS PLUS se prezintă sub formă de sirop de culoare maro cu gust caracteristic.

LINKUS PLUS este disponibil în cutii cu 1 flacon de sticlă de culoarea chihlimbarului a câte 120 ml sirop în set cu măsură dozatoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>