

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Omeprazol 20 mg capsule gastrorezistente

Omeprazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Omeprazol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Omeprazol
3. Cum să utilizați Omeprazol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Omeprazol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Omeprazol și pentru ce se utilizează

Omeprazol aparține unui grup de medicamente numite „inhibitori ai pompei de protoni”. Acestea acționează prin reducerea cantității de acid pe care stomacul dumneavoastră o produce.

Omeprazol este utilizat pentru a trata următoarele afecțiuni:

Adulți

- ulcere la nivelul părții superioare a intestinului (ulcer duodenal) sau stomac (ulcer gastric);
- profilaxia reapariției ulcerelor la nivelul părții superioare a intestinului (ulcer duodenal) și la nivelul stomacului (ulcer gastric);
- ulcere care sunt, de asemenea, infectate cu o bacterie numită *Helicobacter pylori*. Dacă suferiți de această afecțiune, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă prescrie medicamente antibacteriene (antibiotice) pentru a trata infecția și pentru a permite ulcerului să se vindece;
- ulcere determinate de medicamente numite antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Omeprazol poate fi de asemenea utilizat pentru a stopa formarea ulcerelor dacă luați AINS;
- tratamentul bolii de reflux gastro-esofagian. Aceasta se produce când acidul din stomac ajunge în esofag (tubul care unește gâtul dumneavoastră cu stomacul) și determină durere, inflamație și senzație de arsură. De asemenea, Omeprazol este utilizat pentru profilaxia reapariției bolii de reflux gastro-esofagian;
- cantitate prea mare de acid în stomac, determinată de o tumoare la nivelul pancreasului (sindromul Zollinger-Ellison).

Copii

Copii cu vârsta mai mare de 1 an și greutatea corpului ≥ 10 kg:

- boală de reflux gastro-esofagian. Aceasta se produce când acidul din stomac ajunge în esofag (tubul care unește gâtul cu stomacul) și determină durere, inflamație și senzație de arsură.

La copii simptomele acestei afecțiuni pot include întoarcerea conținutului din stomac în gură (regurgitare), stare de rău (vărsături) și reducerea creșterii în greutate.

Copii cu vârsta mai mare de 4 ani și adolescenți:

- ulcere (ulcer duodenal sau gastric) care sunt infectate cu o bacterie numită *Helicobacter pylori*. Dacă copilul sau adolescentul suferă de această afecțiune, este posibil ca medicul dumneavoastră să prescrie antibiotice pentru a trata infecția și pentru a permite ulcerului să se vindece.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Omeprazol

Nu utilizați Omeprazol:

- dacă sunteți alergic la omeprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă sunteți alergic la medicamente ce conțin alți inhibitori ai pompei de protoni (de exemplu, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);
- dacă luați un medicament ce conține nelfinavir (utilizat pentru infecția cu HIV).

Este contraindicată utilizarea acestui medicament la copii cu vârsta sub 1 an.

Nu luați acest medicament dacă vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să luați acest medicament.

Atenționări și precauții

Omeprazol poate masca simptomele altor boli. Astfel, dacă oricare dintre următoarele simptome apar înainte de a începe tratamentul cu Omeprazol sau în timp ce-l luați, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să luați Omeprazol:

- dacă scădeți în greutate fără niciun motiv și aveți probleme la înghițit;
- dacă aveți durere de stomac sau indigestie;
- dacă începeți să vomitați alimente sau sânge;
- dacă aveți scaun închis la culoare (materii fecale cu sânge);
- dacă aveți diaree persistentă sau severă, deoarece omeprazolul a fost asociat cu o ușoară creștere a diareei infecțioase;
- dacă aveți probleme grave cu ficatul;
- dacă ați avut vreodată reacții la nivelul pielii după tratamentul cu un medicament similar omeprazolului care reduce acidul de la nivelul stomacului.

În cazul în care sunteți în tratament cu Omeprazol de mai mult de trei luni, este posibil să scadă concentrațiile de magneziu din sânge. Concentrațiile scăzute de magneziu se pot manifesta prin oboseală, contracții musculare involuntare, dezorientare, convulsii, amețeli, creștere a frecvenței de bătaie a inimii. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, vă rugăm să vă adresați imediat medicului dumneavoastră. Concentrațiile scăzute de magneziu pot duce, de asemenea, la o reducere a concentrațiilor de potasiu sau de calciu în sânge. Medicul dumneavoastră poate decide să efectueze periodic teste de sânge pentru a vă monitoriza concentrațiile de magneziu.

Tratamentul cu inhibitor de pompă de protoni cum este Omeprazol, mai ales pentru o perioadă de peste un an, poate crește ușor riscul de fractură la nivelul șoldului, mâinii sau coloanei vertebrale. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți osteoporoză sau dacă luați corticosteroizi (care pot crește riscul de osteoporoză).

Dacă observați o erupție la nivelul pielii mai ales în zonele expuse la soare, spuneți medicului dumneavoastră cât mai repede deoarece e posibil să fie nevoie să întrerupeți tratamentul cu omeprazol. De asemenea amintiți-vă să spuneți orice alte semne de boală cum este durerea la nivelul articulațiilor.

Dacă nu sunteți sigur că vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să utilizați Omeprazol.

Omeprazol împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Aceasta este necesar deoarece Omeprazol poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta modul în care acționează Omeprazol.

Nu utilizați Omeprazol dacă urmați tratament cu medicamente ce conțin nelfinavir (utilizat pentru a trata infecția cu HIV).

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați oricare dintre următoarele medicamente:

- ketoconazol, itraconazol, posaconazol sau voriconazol (utilizat pentru a trata infecțiile cauzate de fungi);
- erlotinib (utilizat pentru anumite tipuri de cancer);
- atazanavir (utilizată pentru a trata infecția cu HIV);
- digoxină (utilizat pentru a trata afecțiunile inimii);
- clopidogrel (pentru a preveni îngroșarea sângelui (formarea trombilor));
- medicamente utilizate pentru a vă subția sângele, cum este warfarina sau alți antagoniști ai viatminei K. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă monitorizeze când începeți și când întrerupeți tratamentul cu Omeprazol;
- cilostazol (pentru a trata claudicația intermitentă);
- diazepam (utilizat pentru a trata anxietatea, pentru a relaxa mușchii sau în epilepsie);
- fenitoină (utilizată în epilepsie). Dacă luați fenitoină, va trebui ca medicul dumneavoastră să vă monitorizeze când începeți sau când întrerupeți tratamentul cu Omeprazol;
- saquinavir (pentru a trata infecția cu HIV);
- tacrolimus (în caz de transplant de organ);
- metotrexat (un medicament utilizat în chimioterapie, în doze mari, pentru tratamentul cancerului); dacă luați o doză mare de metotrexat, medicul dumneavoastră vă poate opri temporar tratamentul cu omeprazol;
- rifampicină (utilizată pentru a trata tuberculoza);
- sunătoare (*Hypericum perforatum*) (utilizat pentru a trata depresia ușoară).

Dacă medicul dumneavoastră v-a prescris antibioticele amoxicilină și claritromicină ca de altfel și Omeprazol pentru a trata ulcerele determinate de infecția cu *Helicobacter pylori*, este foarte important să spuneți medicului dumneavoastră despre oricare alte medicamente pe care le utilizați.

Omeprazol împreună cu alimente, băuturi și alcool

Se recomandă să luați capsulele fără alimente. Acestea NU trebuie mestecate sau sfărâmate. Trebuie înghițite întregi cu un pahar de apă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți însărcinată, încercați să rămâneți însărcinată sau dacă alăptați. Medicul dumneavoastră va decide dacă puteți să luați Omeprazol în aceste perioade.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În cele mai multe cazuri, medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule și

de a folosi utilaje. La utilizarea acestui medicament pot apărea reacții adverse cum sunt amețeli și tulburări de vedere. Dacă acestea apar, nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

Omeprazol conține zaharoză (sucroză). Dacă ați fost informat că aveți intoleranță la anumite zahăruri, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luați Omeprazol

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicul dumneavoastră vă va spune câte capsule să luați și pentru ce perioadă. Acest lucru depinde de afecțiunea dumneavoastră și de ce vârstă aveți.

Adulți

Pentru tratamentul ulcerelor în partea superioară a intestinului (ulcer duodenal):

- doza recomandată este de 20 mg o dată pe zi timp de 2 săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune să luați aceeași doză pentru încă 2 săptămâni dacă ulcerul dumneavoastră nu s-a vindecat;
- dacă ulcerul dumneavoastră nu este complet vindecat, doza poate fi crescută până la 40 mg o dată pe zi timp de 4 săptămâni.

Pentru tratamentul ulcerului la nivelul stomacului (ulcerului gastric):

- doza recomandată este de 20 mg o dată pe zi timp de 4 săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune să luați aceeași doză pentru încă 4 săptămâni dacă ulcerul dumneavoastră nu s-a vindecat.
- dacă ulcerul dumneavoastră nu este complet vindecat, doza poate fi crescută până la 40 mg o dată pe zi timp de 8 săptămâni.

Pentru prevenirea ulcerelor duodenale și gastrice din antecedente:

Doza recomandată este de 10 mg sau 20 mg o dată pe zi. Medicul dumneavoastră poate crește doza până la 40 mg o dată pe zi.

Pentru prevenirea ulcerelor determinate de infecția cu Helicobacter pylori și pentru a împiedica recăderea:

- doza recomandată este de 20 mg omeprazol de două ori pe zi sau 40 mg omeprazol o dată pe zi, timp de o săptămână.
- medicul dumneavoastră vă va spune să luați și două medicamente antibacteriene. Medicul dumneavoastră vă poate indica următoarele combinații:
 - 20 mg omeprazol + 500 mg claritromicină + 1000 mg amoxicilină, de 2 ori pe zi timp de 1 săptămână, sau
 - 20 mg omeprazol + 250 mg (sau, dacă este necesar, 500 mg) claritromicină + 400 mg (sau, dacă este necesar, 500 mg) metronidazol (sau 500 mg tinidazol), de 2 ori pe zi timp de 1 săptămână, sau
 - 40 mg omeprazol o dată pe zi + 500 mg amoxicilină + 400 mg (sau, dacă este necesar, 500 mg) metronidazol (sau 500 mg tinidazol), ambele de 3 ori pe zi, timp de 1 săptămână.

Pentru tratamentul ulcerului duodenal și gastric determinat de tratamentul cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS):

- doza recomandată este de 20 mg o dată pe zi timp de 4-8 săptămâni.

Prevenirea apariției ulcerelor gastrice și duodenale asociate tratamentului cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) la pacienții cu factori de risc crescut:

- pentru prevenirea apariției ulcerelor gastrice sau duodenale asociate AINS la pacienții cu risc crescut (vârsta >60 ani, istoric de ulcere gastrice și duodenale, istoric de hemoragie digestivă superioară) doza recomandată este de 20 mg omeprazol o dată pe zi.

Pentru tratamentul esofagitei de reflux:

- dacă medicul dumneavoastră a constatat că tubul prin care trece mâncarea (esofagul) a fost ușor lezat, doza recomandată este de 20 mg o dată pe zi timp de 4-8 săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune să luați o doză de 40 mg omeprazol pentru încă 8 săptămâni dacă esofagul dumneavoastră nu s-a vindecat.

Pentru tratamentul de lungă durată al pacienților cu esofagită de reflux vindecată:

- pentru tratamentul de lungă durată al pacienților cu esofagită de reflux vindecată, doza recomandată este de 10 mg omeprazol o dată pe zi. Dacă este necesar, doza poate fi crescută la 20-40 mg omeprazol o dată pe zi.

Pentru tratamentul simptomatic al bolii de reflux gastro-esofagian

- doza recomandată constituie 20 mg omeprazol pe zi. Dacă esofagul dumneavoastră nu a fost lezat, doza recomandată este de 10 mg omeprazol o dată pe zi. Dacă după 4 săptămâni de tratament simptomele nu dispar, medicul dumneavoastră poate efectua o examinare suplimentară.

Pentru tratamentul acidului în exces din stomac determinat de o formațiune din pancreas (sindrom Zollinger-Ellison):

- doza recomandată este de 60 mg pe zi.
- medicul dumneavoastră vă va ajusta doza în funcție de nevoile dumneavoastră și de asemenea va decide pentru cât timp trebuie să luați medicamentul.

Copii

Pentru tratamentul simptomelor bolii de reflux gastro-esofagian cum sunt pirozismul și regurgitarea acidă:

- copiii cu vârsta mai mare de 1 an și cu greutatea mai mare de 10 kg pot lua Omeprazol. Doza recomandată pentru copii este în funcție de greutatea copilului și medicul va decide doza corectă.

Pentru tratamentul ulcerelor determinate de infecția cu Helicobacter pylori și prevenirea recurenței:

- copiii cu vârsta mai mare de 4 ani pot lua Omeprazol. Doza recomandată pentru copii este în funcție de greutatea copilului și medicul va decide doza corectă.
- medicul dumneavoastră va prescrie, de asemenea, două medicamente antibacteriene (amoxicilină și claritromicină) pentru copilul dumneavoastră.

Mod de administrare

Se recomandă să luați capsulele fără alimente. Înghițiți capsulele întregi cu jumătate de pahar de apă. Nu mestecați sau sfărâmați capsulele. Aceasta se datorează faptului că, capsulele conțin granule acoperite care opresc ca medicamentul să fie descompus de acid în stomac. Este important să nu se distrugă granulele.

Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră nu puteți înghiți capsulele:

- deschideți capsulele și înghițiți direct conținutul cu jumătate de pahar cu apă sau puneți conținutul într-un pahar cu apă plată (nu minerală), orice suc de fructe (de exemplu, de mere, portocală sau ananas) sau compot de mere, iaurt sau chefir;
- întotdeauna agitați amestecul chiar înainte de a-l bea. Apoi beți amestecul imediat sau în cel mult 30 de minute;

- pentru a fi sigur că ați băut tot medicamentul, clătiți paharul foarte bine cu apă și beți-l. Componentele solide (granulele) conțin medicamentul - nu le mestecați sau sfărâmați.

Dacă luați mai mult Omeprazol decât trebuie

Dacă ați luat sau credeți că ați luat mai mult Omeprazol decât trebuie (supradozaj), spuneți imediat medicului dumneavoastră sau prezentați-vă la cea mai apropiată unitate medicală. Aduceți medicamentele rămase cu dumneavoastră.

Dacă uitați să luați Omeprazol

Dacă uitați să luați o doză, luați-o atunci când vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru o nouă doză, nu mai luați doza uitată. Nu luați o doză dublă, pentru recuperarea unei doze uitate.

Dacă încetați să utilizați Omeprazol

Urmați tratamentul atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Nu întrerupeți tratamentul, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă opriți tratamentul mai devreme, boala poate să reapară.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse rare dar grave, întrerupeți administrarea de Omeprazol și contactați imediat medicul dumneavoastră:

- apariție bruscă a respirației șuierătoare, umflarea buzelor, limbii și a gâtului sau a corpului, erupție tranzitorie la nivelul pielii, leșin sau dificultate la înghițire (reacție alergică severă);
- înroșirea pielii cu vezicule sau descumarea pielii. Pot apărea vezicule severe și sângerare la nivelul buzelor, ochilor, gurii, nasului și organelor genitale. Acesta poate fi „sindromul Stevens-Johnson” sau „necroliza epidermică toxică”;
- probleme grave cu ficatul ce pot determina insuficiență hepatică și inflamația creierului. Simptomele includ icter ce poate determina îngălbenirea pielii, urină închisă la culoare și oboseală.

Alte reacții adverse includ:

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 pacienți):

- durere de cap;
- efecte asupra stomacului sau intestinelor: diaree, durere de stomac, constipație, gaze (flatulență);
- senzație de rău (greață) sau stare de rău (vărsături);
- polipi benigni în stomac.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 pacienți):

- umflarea picioarelor și a gleznelor;
- tulburări de somn (insomnii);
- amețeli, paretezii cum sunt înțepăturile și furnicăturile, somnolență;
- senzația de rotire (vertij);
- modificări ale analizelor de sânge care controlează cum funcționează ficatul;
- erupție la nivelul pielii, bășici (urticarie), mâncărime, inflamație a pielii;
- slăbiciune (lipsă de energie);
- fractură de șold, mână și coloană vertebrală.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 pacienți):

- tulburări ale sângelui cum sunt scăderea numărului de celule albe din sânge sau de plachete; Aceasta poate determina slăbiciune, învinețire sau pot face mai probabilă apariția infecțiilor;
- reacții alergice, uneori foarte severe, incluzând umflarea buzelor, limbii și gâtului, febră, respirație șuierătoare;
- concentrații scăzute de sodiu în sânge;
- senzația de agitație, confuzie sau depresie;
- tulburări ale gustului;
- tulburări de vedere (vederea încetoșată);
- senzația bruscă de șuierat în piept sau scurtarea respirației (bronhospasm);
- uscăciunea gurii;
- inflamație a interiorului gurii;
- infecție numită „aftă” care poate afecta intestinul și este cauzată de o ciupercă (candidoză);
- tulburări hepatice, incluzând icter care poate determina îngălbenirea pielii, urină închisă la culoare și oboseală;
- căderea părului (alopecie);
- erupție la nivelul pielii la expunerea la lumina soarelui;
- durere de articulații (artralgie) sau durere musculară (mialgie);
- transpirații abundente;
- tulburări renale severe (nefrită interstițială).

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 pacienți):

- modificări ale hemogramei, inclusiv agranulocitoză (lipsa globulelor albe din sânge);
- agresivitate;
- vederea, simțirea sau auzirea de lucruri care nu există (halucinații);
- tulburări hepatice severe care duc la insuficiență hepatică și la inflamația creierului;
- apariția bruscă a unei erupții tranzitorii la nivelul pielii sau formarea de vezicule sau descumarea pielii. Acestea se pot asocia cu febră mare și dureri articulare (eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică);
- slăbiciune musculară;
- sâni măriți la bărbați.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- inflamație la nivelul intestinelor (care provoacă diaree);
- dacă urmați tratament cu omeprazol de mai mult de trei luni, este posibil ca nivelul de magneziu din sângele dumneavoastră să scadă. Concentrațiile scăzute de magneziu se pot manifesta prin oboseală, contracții musculare involuntare, dezorientare, convulsii, amețeli, alura ventriculară rapidă. Dacă manifestați oricare dintre aceste simptome, vă rugăm să spuneți imediat medicului dumneavoastră. Concentrațiile scăzute de magneziu din sânge pot determina o reducere a concentrației de potasiu și calciu din sânge. Medicul dumneavoastră poate decide să efectuați periodic analize de sânge pentru a vă monitoriza concentrația de magneziu;
- erupție trecătoare pe piele, posibil cu dureri la nivelul articulațiilor.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <https://amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Omeprazol

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Omeprazol

Substanța activă este omeprazol. Fiecare capsulă conține 20 mg omeprazol (sub formă de peleți 8,5%).

Celelalte componente sunt: manitol (E421), fosfat disodic, carbonat de calciu, laurilsulfat de sodiu, zaharoză, hidroxipropilmetilceluloză, copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1), dispersie 30%; *învelișul capsulelor conține:* gelatină, dioxid de titan (E171).

Cum arată Omeprazol și conținutul ambalajului

Omeprazol se prezintă sub formă de capsule gelatinoase de culoare albă, de formă cilindrică cu capete emisferice. Conținutul capsulelor - peleți de formă sferică, de culoare albă sau aproape albă.

Omeprazol este disponibil în cutii de carton ce conțin 3 blistere a câte 10 capsule gastrorezistente și prospectul pentru pacient/utilizator.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Lekpharm SRL
str. Minskaya 2a, or. Logoisk 223141,
Republica Belarus
Tel./fax: (01774)-53801
e-mail: office@lekpharm.by

Fabricantul

Lekpharm SRL
str. Minskaya 2a, or. Logoisk 223141,
Republica Belarus

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2021.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>