

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

Clorură de sodiu / Clorură de potasiu / Clorură de calciu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală cu ale dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacție adversă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte de a vi se administra SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă
3. Cum vi se va administra SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este SOLUȚIA RINGER și pentru ce se utilizează

SOLUȚIA RINGER este o soluție de lichide și electroliți (săruri sau ioni), care se administrează prin picurare într-o venă (perfuzie intravenoasă). Concentrația în sodiu, potasiu și calciu este similară cu cea din sângele dumneavoastră. Medicamentul normalizează balanța între cantitatea de apă și săruri minerale, înlătură deficitul de lichid în organismul uman.

SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă se utilizează:

- în caz de hipovolemie (diminuare a volumului de sânge circulant) și deshidratare extracelulară ca urmare a vomei îndelungate, diareei, arsurilor vaste, degerăturilor, peritonitei, bolilor infecțioase severe, stărilor de șoc, colapsului; în timpul intervenției chirurgicale și în perioada postoperatorie;
- pentru diluarea soluțiilor concentrate de electroliți.

2. Ce trebuie să știți înainte de a vi se administra SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

Nu vi se va administra SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă:

- dacă aveți prea mult sodiu în sânge (hipernatremie);
- dacă aveți probleme grave cu inima (insuficiență cardiacă decompensată);
- dacă aveți prea mult potasiu în sânge (hiperkaliemie);
- dacă aveți o eliminare de urină în cantități foarte mici (oligurie) sau în caz de încetare a urinării (anurie);
- dacă aveți probleme grave cu rinichii (insuficiență renală acută);
- dacă aveți lichid în plămâni (edem pulmonar);
- dacă aveți creierul umflat (edem cerebral);
- dacă aveți o tendință sporită de coagulare a sângelui (hipercoagulare);

- dacă aveți prea mult lichid în organism (hiperhidratare);
- dacă aveți inflamații ale venelor cu formarea de cheaguri (tromboflebită);
- dacă aveți un nivel anormal de scăzut al acidului în sânge (alcaloză metabolică);
- dacă aveți prea mult calciu în sânge (hipercalcemie).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Medicul dumneavoastră vă va supraveghea și este posibil să dorească să efectueze testări suplimentare (din sânge și din urină), mai ales dacă vi se administrează volume mari din acest medicament.

În următoarele situații, SOLUȚIA RINGER vi se va administra cu prudență:

- dacă inima dumneavoastră nu pompează suficient sânge în organism (insuficiență cardiacă) sau suferiți de afecțiuni severe ale rinichilor, medicul dumneavoastră va lua în considerare riscul crescut de acumulare exagerată a lichidelor în organism) și modificarea modului de administrare a medicamentului;
- dacă aveți prea mult lichid în organism (edeme periferice);
- dacă aveți o afectare severă a funcției rinichilor (insuficiență renală);
- dacă suferiți de stări, asociate cu reținerea sodiului în organism;
- dacă aveți risc de creștere a concentrației potasiului în sânge, de exemplu, suferiți de o afectare severă a funcției rinichilor;
- dacă urmați tratament concomitent cu medicamente, precum corticosteroizi, corticotropină, glicozide cardiace;
- la administrarea concomitentă cu preparatele din sânge din cauza riscului de coagulare.

SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

E posibilă creșterea reținerii de sodiu în organism la administrarea concomitentă a următoarelor medicamente: antiinflamatoare nesteroidiene, androgeni, hormoni anabolici, estrogeni, corticotropină (hormon adrenocorticotrop), mineralocorticoizi, vasodilatatoare sau ganglioblocante. La asocierea cu diuretice care economisesc potasiul (medicamente utilizate pentru a crește volumul de urină), inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (medicamente care scad tensiunea arterială) și preparatele de potasiu crește riscul dezvoltării hiperkaliemiei (conținut crescut de potasiu în sânge).

În asociere cu glicozidele cardiace (medicamente utilizate pentru tratamentul bolilor de inimă) crește riscul efectelor lor toxice.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a vi se administra acest medicament.

Studii privind administrarea SOLUȚIEI RINGER în sarcină nu s-au efectuat.

SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă poate fi administrată în timpul alăptării numai dacă medicul dumneavoastră consideră acest lucru necesar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lipsește date.

Informație privind unele componente ale SOLUȚIEI RINGER

Soluția Ringer conține 147,2 mmol/l sodiu. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții ce urmează o dietă cu restricție de sodiu.

Soluția Ringer conține 4,02 mmol/l potasiu. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu funcție renală diminuată sau la pacienții ce urmează o dietă cu restricție de potasiu.

3. Cum vi se va administra SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

Acest medicament se administrează prin picurare într-o venă (perfuzie intravenoasă), de către medicul dumneavoastră sau asistenta medicală.

Medicul dumneavoastră va decide doza de care aveți nevoie, în funcție de vârstă, masa corporală, starea clinică a dumneavoastră și valoarea indicilor de laborator.

Doza obișnuită pentru adulți constituie până la 1-2 l timp de 24 ore, doza maximă depinde de starea echilibrului hidro-electrolitic, a sistemului cardiovascular și rinichilor.

Viteza perfuziei la adulți – 60-80 picături/minut sau în jet.

Înainte de utilizarea soluției perfuzabile trebuie inspectată vizual în vederea prezenței particulelor și modificării culorii.

Copii

Studii privind utilizarea de SOLUȚIA RINGER la copii nu au fost efectuate.

Dacă vi s-a administrat mai mult SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă decât trebuie

Deoarece acest medicament vă este administrat de către medicul dumneavoastră sau asistenta medicală, este puțin probabil să vi se administreze mai mult SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă decât trebuie.

Supradozajul cu lichid poate conduce la exces de lichid în organism, cu:

- creșterea volumului de sânge din organism;
- dezechilibru al apei, acizilor și sărurilor din sânge.

Dacă aceste semne apar, medicul dumneavoastră va opri perfuzia cu acest medicament și va lua măsurile necesare pentru eliminarea excesului de apă din organismul dumneavoastră.

Dacă s-a uitat să vi se administreze SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

Deoarece acest medicament vă este administrat de către medicul dumneavoastră sau asistenta medicală, este imposibil să se uite să vi se administreze SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă.

Dacă se încetează să vi se administreze SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

Medicul va decide, cât timp vi se va administra SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- dezechilibre ale sărurilor din sânge (potasiului, calciului, sodiului, clorului);
- exces de aciditate a sângelui, cauzată de acumularea de sânge clorinat (acidoză hipercloremică);
- prea mult lichid în organism (hiperhidratare);
- modificări la nivelul locului de administrare.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se congela.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală va verifica, înainte de administrare, dacă soluția este limpede și fără particule vizibile.

Orice soluție rămasă după tratament trebuie aruncată.

Medicul dumneavoastră sau farmacistul spitalului sunt responsabili pentru păstrarea, utilizarea și eliminarea corectă a acestui medicament.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă

- *Substanțele active* sunt clorură de sodiu, clorura de potasiu și clorura de calciu.

1 ml soluție perfuzabilă conține clorură de sodiu 8,6 mg, clorură de potasiu 0,3 mg, clorură de calciu dihidrat (în recalcul la clorură de calciu) 0,24 mg.

- *Celelalte componente sunt:* apă pentru injecții.

Cum arată SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă și conținutul ambalajului

SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă este un lichid transparent, incolor.

SOLUȚIA RINGER soluție perfuzabilă este disponibilă în flacoane din sticlă a câte 200 ml și 400 ml soluție perfuzabilă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina.

03680, or. Kiev, str. N. Amosov, 10

Fabricantul

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina,
str. Kobzarskaya 108, 18030, Cerkassy.

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>