

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

SOLUȚIE RINGER, soluție perfuzabilă

Clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de calciu.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Soluție Ringer și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Soluție Ringer
3. Cum să utilizați Soluție Ringer
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Soluție Ringer
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE SOLUȚIE RINGER ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Soluție Ringer este soluția apoasă a următoarelor săruri: clorură de sodiu, clorură de calciu, clorură de potasiu.

Soluție Ringer se utilizează pentru a suplini necesarul de lichid și săruri în organism, dacă aveți:

- deshidratări predominant extracelulare (de exemplu în caz de vărsături, diaree, fistule);
- hipovolemie (determinată de șoc hemoragic, arsuri, pierderi hidroelectrolitice perioperatorii).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ LUAȚI SOLUȚIE RINGER

Nu utilizați Soluția Ringer:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).
- insuficiență cardiacă congestivă;
- dacă aveți prea mult lichid în organism (hiperhidratare, predominant extracelulară);
- dacă aveți prea mult potasiu în organism (hiperkaliemie);
- dacă aveți prea mult calciu în organism (hipercalcemie);
- asociere cu digitale și diuretice care economisesc potasiu.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Soluție Ringer, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Această soluție nu trebuie administrată prin injecție intramusculară este destinat numai pentru administrare intravenoasă. În caz de transfuzii concomitente, sângele și Soluția Ringer nu trebuie administrate în același dispozitiv de perfuzie, datorită riscului de coagulare.

În timpul tratamentului cu Soluție Ringer poate să apară supraîncărcare circulatorie cu edem pulmonar, îndeosebi la pacienții cu risc.

În timpul tratamentului cu Soluție Ringer este necesară supravegherea echilibrelor hidroelectrolitice și acido-bazice.

Atenționări speciale

Utilizarea soluției necesită supraveghere clinică și biologică, în special la pacienții cu insuficiență renală severă, edeme cu retenție sodată, tratament cu glucocorticoizi și derivați.

Deoarece soluția conține potasiu, kaliemia trebuie monitorizată în special la pacienții cu risc de hiperkaliemie, de exemplu insuficiență renală severă.

Soluție Ringer împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Acest produs poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării, numai dacă este necesar și sub supraveghere atentă a echilibrelor hidroelectrolitice și acido-bazice.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI SOLUȚIE RINGER

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur.

Doza de administrare și durata tratamentului o va determina medicul dumneavoastră.

Doza zilnică maximă se stabilește în funcție de vârstă, greutate și starea clinică a pacientului, precum și de tabloul biologic al acestuia.

Doza orientativă la adulți este de 500-1000 ml Soluție Ringer, în perfuzie intravenoasă lentă, în ritm de 60-70 picături/min; la copii doza se stabilește în funcție de vârstă și greutate corporală.

Mod de administrare

Soluția Ringer se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, în condiții riguroase de asepsie.

Incompatibilități

Soluția Ringer nu trebuie administrată prin același dispozitiv de perfuzie cu sângele, deoarece există riscul de coagulare, datorită conținutului în calciu.

Soluția Ringer nu trebuie amestecată cu soluții care conțin carbonați sau fosfați anorganici, datorită riscului de precipitare.

În cazul în care Soluția Ringer trebuie amestecată cu alte medicamente, este obligatoriu să se verifice compatibilitatea, să se asigure sterilitatea și uniformizarea amestecului. După realizarea amestecului, acesta trebuie administrat imediat.

Instrucțiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării și manipularea sa

Înainte de administrare se verifică flacoanele, care trebuie să fie intacte, iar soluția trebuie să fie limpede. Înainte de utilizare trebuie dezinfectat dopul de cauciuc, este obligatoriu de dezinfectat mâinile înainte de manipulare.

Nu se utilizează flacoanele deteriorate, ale căror dopuri au fost perforate anterior sau din care s-a extras lichid.

Produsul se utilizează imediat după deschiderea ambalajului.

Dacă utilizați mai mult Soluție Ringer decât trebuie

Supradozajul poate determina supraîncărcare lichidiană, dezechilibre hidroelectrolitice, hiperosmolaritate.

Tratamentul constă în întreruperea perfuziei cu Soluție Ringer și administrarea de diuretice, de exemplu furosemidă. În caz de oligurie sau anurie pot fi necesare hemodializă sau dializă peritoneală

Dacă uitați să utilizați Soluție Ringer

Preparatul se administrează de către personalul medical care va avea grijă de administrat preparatul la timpul necesar.

Dacă încetați să utilizați Soluție Ringer

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest preparat poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În condițiile utilizării conform recomandărilor de mai sus, cu supravegherea atentă a echilibrelor hidroelectrolitice și acido-bazice, nu există riscul apariției nici unei reacții adverse.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigelenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SOLUȚIE RINGER

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalajul primar și secundar după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Se vor folosi numai flacoanele intacte cu soluție limpede.

Flacoanele sunt destinate unei singure utilizări. După administrare flaconul se va arunca chiar dacă mai rămâne soluție. Nu se va folosi flaconul repetat.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Soluție Ringer

- Substanțele active sunt: clorură de sodiu, clorură de calciu, clorură de potasiu. 1000 ml de soluție perfuzabilă conțin: clorură de sodiu 8,60 g, clorură de calciu 0,33 g, clorură de potasiu 0,30 g.
- Celelalte componente sunt: hidroxid de sodiu – până la pH-ul 5,0 – 7,0; acid clorhidric până la pH-ul 5,0 – 7,0; apă pentru injecții – până la 1000 ml.

Conținutul de electroliți:

Na⁺ : 147 mmol ;

K⁺ : 4 mmol ;

Ca⁺⁺ : 2,25 mmol ;

Cl⁻ : 155,6 mmol ;

Osmolaritatea teoretică = 309 mOsm/l

Cum arată Soluție Ringer și conținutul ambalajului

Soluție incoloră, transparentă.

Soluție perfuzabilă 500 ml în flacoane (din polietilenă cu densitatea mică) cu suport încorporat, scară de picurare marcată, un capac etanș din cauciuc și polietilenă, cu inel de control al primei deschideri. Câte 10 flacoane împreună cu prospectele în cutie din carton (ambalaj pentru staționare).

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Hemofarm AD, Serbia.

26300 or.Vršac, Beogradski put b.b.,

tel.: 13/803100, fax: 13/803424

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2017

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>