

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII, 1405 mg**
Glicerol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 10 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Supozitoare cu glicerină pentru copii și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii
3. Cum să utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Supozitoare cu glicerină pentru copii
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Supozitoarele cu glicerină sunt medicamente laxative și sunt utilizate pentru tratarea constipației, pentru ușurarea defecației după intervenții chirurgicale sau înaintea rectoscopiei. Supozitoarele cu glicerină stimulează secreția la nivelul mucoasei rectale și simultan declanșează mecanismul defecației.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII**Nu utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii**

-dacă sunteți alergic (hipersensibil) la glicerină sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.

Aveți grijă deosebită când utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii

- La copii cu vârsta sub 2 ani, deoarece poate împiedica funcționarea normală a reflexului de defecație.
- La copii cu diverse afecțiuni la nivelul intestinului gros sau a rectului (crize hemoroidale, fisuri anale, rectocolite hemoragice). Adresați-vă medicului sau farmacistului dacă aveți nelămuriri.

Supozitoarele cu glicerină sunt doar un adjuvant al tratamentului igienico-dietetic. Pentru normalizarea scaunelor, suplimentați alimentația cu fibre și lichide și efectuați activități fizice. Nu utilizați supozitoare cu glicerină timp îndelungat. Tratamentul constipației nu trebuie să depășească 10 zile. Dacă în acest interval simptomele nu se îmbunătățesc sau se înrăutățesc, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Pentru a ușura administrarea, introduceți supozitoarele în apă rece.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiuni între supozitoarele cu glicerină și alte medicamente.

Utilizarea Supozitoare cu glicerină pentru copii cu alimente și băuturi

Nu se cunosc interacțiuni cu alimentele sau băuturile.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu este cazul.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Supozitoare cu glicerină pentru copii nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII

Supozitoarele cu glicerină se administrează intrarectal. Doza uzuală este un supozitor la nevoie. În pregătirea examenului endoscopic al rectului:

-un supozitor cu 5-30 de minute înainte de ora aleasă pentru intervenție.

Supozitoarele se administrează intrarectal.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Supozitoare cu glicerină pentru copii

Nu s-a semnalat supradozaj cu supozitoare cu glicerină.

Dacă uitați să utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Supozitoare cu glicerină pentru copii poate determina reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt clasificate în funcție de frecvență, folosind următoarea convenție:

-foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane);

-frecvente (apar la mai puțin de 1 din 10 persoane);

-mai puțin frecvente (apar la mai puțin de 1 din 100 persoane);

- rare (apar la mai puțin de 1 din 1000 persoane);
- foarte rare (apar la mai puțin de 1 din 10000 persoane);
- cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Reacțiile adverse apar foarte rar și sunt mai ales reacții locale, datorate utilizării supozitoarelor timp îndelungat: senzații de arsură anală, iar excepțional inflamații congestive ale rectului.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SUPOZITOARE CU GLICERINĂ PENTRU COPII

Nu utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Supozitoare cu glicerină pentru copii

- Substanța activă este glicerol. Fiecare supozitor conține glicerol 1405 mg.
- Celelalte componente sunt: stearat de sodiu, apă purificată.

Cum arată Supozitoare cu glicerină pentru copii și conținutul ambalajului

Supozitor sub formă de torpilă, cu suprafața netedă, onctuoasă, incolor sau translucid, cu miros slab caracteristic bazei utilizate.

Este disponibil în cutii cu 2 folii termoformate din Al/PE a câte 3 sau 6 supozitoare.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

Antibiotice SA
Str.Valea Lupului nr.1, 707410, Iași, România

Acest prospect a fost aprobat în februarie 2010

~~Orice reclamație va fi însoțită de cutia cu datele de identificare ale produsului.~~