

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

TROXERUTIN SOPHARMA 20 mg/g gel

Troxerutinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Troxerutin Sopharma gel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Troxerutin Sopharma gel
3. Cum să luați Troxerutin Sopharma gel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Troxerutin Sopharma gel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Troxerutin Sopharma gel și pentru ce se utilizează

Troxerutin Sopharma gel conține substanța activă troxerutină, care se atribuie grupei de preparate numite angioprotectoare. Aceste medicamente reduc permeabilitatea și fragilitatea capilarelor, posedă acțiune antioxidantă. Troxerutina posedă acțiune venotonizantă, antiinflamatoare și înlătură edemul. În rezultatul tratamentului cu troxerutină se reduce edemul picioarelor și simptomele asociate lui.

Troxerutin Sopharma gel se utilizează pentru tratamentul simptomatic în următoarele cazuri:

- insuficiența venoasă cronică;
- dilatare varicoasă a venelor;
- tromboflebită superficială, periflebită și flebotromboză;
- sindrom posttrombotic;
- edeme posttraumatice, hematoame.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Troxerutin Sopharma gel **Nu luați Troxerutin Sopharma gel**

- dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Troxerutin Sopharma gel, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Administrarea prelungită poate provoca reacții de sensibilitate crescută la locul de aplicare.

Troxerutin Sopharma gel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

La utilizarea de Troxerutin Sopharma gel nu s-au determinat interacțiuni clinic semnificative cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Troxerutin Sopharma gel poate fi utilizat dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor

Troxerutin Sopharma este un gel pentru aplicare topică. Troxerutin Sopharma gel nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Troxerutin Sopharma gel conține clorură de benzalconiu. Este iritant. Poate provoca reacții adverse cutanate. Nu trebuie să aplicați acest medicament la nivelul sânilor dacă alăptați, deoarece poate să ajungă în lapte.

3. Cum să luați Troxerutin Sopharma gel

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare cutanată.

Gelul se aplică de 2 ori pe zi (dimineața și seara), fricționând atent în sectoarele afectate ale pielii cu mișcări ușoare de masaj. La necesitate se va aplica sub pansament sau ciorapi elastici.

Dacă luați mai mult Troxerutin Sopharma gel decât trebuie

Cazuri de supradozaj sunt puțin probabile. În caz de ingerare accidentală a unor cantități mari de gel e necesar de întreprins măsuri generale pentru eliminarea preparatului, iar la necesitate de efectuat tratament simptomatic.

Dacă uitați să luați Troxerutin Sopharma gel

Nu utilizați o cantitate mai mare de preparat pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cele mai multe cazuri, medicamentul este bine tolerat.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

În cazuri rare și la aplicare prelungită e posibilă înroșirea pielii și prurit la locul aplicării.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Troxerutin Sopharma gel

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Termen de valabilitate după prima deschidere a tubului: 12 luni.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare, care este înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Troxerutin Sopharma gel

Substanța activă este: troxerutină.

1 g gel conține troxerutină 20 mg.

Celelalte componente sunt (excipienți): carbomer, edetat disodic, clorură de benzalconiu, hidroxid de sodiu, apă purificată.

Cum arată Troxerutin Sopharma gel și conținutul ambalajului

Descrierea medicamentului

Gel

Gel de culoare galbenă, fără miros.

Conținutul ambalajului

Câte 40 g în tuburi de aluminiu cu membrană, cu capac de plastic. Câte 1 tub împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Sopharma AD

16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgaria.

Fabricantul

Sopharma AD

16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgaria.

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>