

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Zinc oxid 100 mg/g unguent

Oxid de zinc

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Zinc oxid și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zinc oxid
3. Cum să utilizați Zinc oxid
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zinc oxid
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Zinc oxid și pentru ce se utilizează

Zinc oxid aparține unui grup de medicamente numite emoliente și protectoare pentru uz topic. Conține substanța activă oxid de zinc care posedă acțiune locală antiinflamatoare, astringentă, adsorbantă, desicantă și antiseptică.

Zinc oxid se utilizează pentru a trata: intertrigo (dermatoză microbiană), miliarie (erupție cutanată cauzată de caldură), dermatite, inclusiv dermatita de „scutec” (iritația și inflamația pielii sub scutec, cu scop profilactic și de tratament); plăgi superficiale, combustii (arsuri), afecțiuni ulceroase ale pielii (inclusiv ulcere trofice), escare (leziuni ulcerative la nivelul pielii și părților moi subcutanate datorită imobilizării prelungite a pacientului); eczeme (afecțiuni ale pielii cauzate de sensibilitatea organismului față de anumite substanțe), hipehidroza (transpirație abundentă anormală), herpes simplex, streptodermie (afecțiune a pielii produsă de streptococi).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zinc oxid

Nu utilizați Zinc oxid

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la oxid de zinc sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Zinc oxid, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Unguentul se aplică extern! Evitați contactul cu ochii. Nu se recomandă administrarea în cazul proceselor cutanate inflamatorii și purulente acute.

Zinc oxid împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Până în prezent la administrarea topică a unguentului, interacțiuni cu alte medicamente nu au fost semnalate.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Se recomandă administrarea cu precauție a unguentului în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează negativ asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Zinc oxid

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Zona afectată se spală și se usucă. Unguentul se aplică în strat subțire pe suprafețele afectate ale pielii, masând ușor, de 4-6 ori pe zi. Cantitatea de unguent aplicat depinde de extinderea zonei afectate. Durata tratamentului este determinată individual de către medic, însă nu mai mult de 1 lună.

În tratamentul combustiiilor și plăgilor – se aplică pansament cu unguent. Pentru administrarea la copii nu sunt restricții de vârstă. Cu scop de profilaxie a intertrigourilor la copii unguentul se aplică pe suprafețele supuse contactului îndelungat cu lenjeria umedă.

Dacă utilizați mai mult Zinc oxid decât trebuie

Cazuri de supradozaj până în prezent nu au fost semnalate.

În cazul în care v-ați administrat o doză mai mare decât cea recomandată, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Zinc oxid

Dacă ați uitat să aplicați Zinc oxid, aplicați unguentul imediat ce vă amintiți și apoi reveniți la programul normal de aplicare.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Zinc oxid

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

- reacții alergice ale pielii de contact manifestate prin mâncărime, eritem (roșeață la nivelul pielii), erupții cutanate (în caz de hipersensibilitate); la administrare îndelungată - iritația pielii.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Zinc oxid

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se congela.

Nu utilizați Zinc oxid după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Zinc oxid

- Substanța activă este oxid de zinc. 1 g unguent conține 100 mg oxid de zinc.
- Celelalte componente sunt parafină albă moale.

Cum arată Zinc oxid și conținutul ambalajului

Medicamentul se prezintă sub formă de unguent de culoare albă sau albă cu nuanță gălbuie.

Zinc oxid este disponibil în cutii cu un tub din aluminiu a câte 25 g unguent însoțit de prospect.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FARMAPRIM SRL, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,
MD-4829

telefon (+373 22) 28-18-45

fax (+373 22) 28-18-46

e-mail: safety@farmaprim.md

Fabricantul

FARMAPRIM SRL, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni, MD-4829

Acest prospect a fost aprobat în octombrie 2018

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>