

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

CRATAL 867 mg /43 mg /87 mg comprimate Taurinum /Crataegus sanguinea /Leonurus cardiaca

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l oferiți altor persoane. Le poate dăuna, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea include orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cratal și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Cratal
3. Cum să luați Cratal
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cratal
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cratal și pentru ce se utilizează

Cratal – medicament pe bază de plante, care constă din următoarele componente: taurină, fructe de păducel, extract dens de talpa-gâștei. Aparține la remedii binecunoscute, este utilizat pentru patologii cardiace.

Cratal este utilizat ca parte a unui tratament complex la distonii neurocirculatorii (tulburările funcțiilor sistemului nervos), în componența terapiei complexe în cardiopatie ischemică cronică (insuficiența de aprovizionare cu oxigen a mușchiului cardiac), sindrom postiradiere (iradiere cu radiații ionizante), diabet zaharat tip II (creșterea cronică a nivelului glucozei în sânge ca urmare a insuficienței de insulină – hormonul pancreatic).

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Cratal

Nu luați Cratal:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la componentele medicamentului;
- dacă aveți hipotensiune arterială (scădere tensiunii arteriale) și bradicardie marcată (scădere a ritmului cardiac);
- sarcina, perioada de lactație,
- la copii.

Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Cratal.

Atenționări și precauții:

Informați-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist înainte de a vi se administra acest medicament, dacă:

- aveți edem al membrelor inferioare,
- aveți dureri cardiace, care pot iradia în mîna stîngă, în regiunea abdomenului sau în zona gâtului,
- aveți dispnee.
- Dacă în timpul tratamentului simptomele persistă sau se agravează.

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Cratal.

Cratal împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală sau preparate pe bază de plante medicinale. Acest lucru este important deoarece Cratal poate influența acțiunea unor medicamente. De asemenea, anumite medicamente pot influența acțiunea Cratalului.

În mod special, spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

- antiaritmice de generația III, cizapridă.
- Cratal potențează efectele antianginoase ale nitraților, β -adrenoblocantelor, blocantelor canalelor de calciu, remediilor antihipoxante, neuroprotectoare, glicozidelor cardiace. Atenuază simptomele intoxicației digitale.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Este contraindicat în timpul sarcinii.

Administrarea medicamentului în sarcină și perioada de alăptare e posibilă doar după consultarea medicului, care va determina raportul beneficiu/risc.

La necesitatea administrării în perioada de lactație se va suspenda alăptarea la sân pe durata tratamentului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Pe perioada tratamentului pacienții trebuie să se abțină de la conducerea mijloacelor de transport auto și de la manevrarea mecanismelor potențial periculoase.

3. Cum să luați Cratal

Nu vă administrați singur acest medicament. Cratal vi se va administra de către un medic.

Medicamentul este luat înaintea mesei.

Numărul de zile sau de săptămâni în care vi se va administra Cratal depinde de tipul bolii pe care o aveți.

Instrucțiuni pentru utilizarea corectă

Adulților li se indică câte câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, înaintea mesei.

Durata curei de tratament constituie 3-4 săptămâni.

La diabetul zaharat tip II cura de tratament constituie 8 săptămâni.

Copii

Acest medicament nu se administrează copiilor.

La copiii cu vârsta de la 6 ani se prescrie medicament Cratal pentru Copii, comprimate filmate.

Dacă luați mai mult Cratal decât trebuie

Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. Dacă vi se pare că vi s-a administrat mai mult Cratal decât trebuie întrebați imediat personalul medical, pentru a lua măsurile necesare.

Dacă apar simptome de hipersensibilitate, reacții alergice, fenomene dispeptice, slăbiciune generală, somnolență, hipotensiune arterială, bradicardie - adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să luați Cratal

Dacă ați uitat să luați o doză din medicamentul dumneavoastră, nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Doza uitată trebuie administrată numai dacă intervalul de timp pînă la următoare doză este suficient de lung.

Luăți doza următoare la momentul obișnuit.

Dacă încetați să luați Cratal

Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe utilizarea acestui medicament. Administrarea neregulată sau întreruperea prea devreme a tratamentului pot compromite rezultatul tratamentului sau pot duce la revenirea bolii, a cărui tratament este mai dificil. Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Cratal poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă aveți o reacție adversă severă, adresați-vă imediat unui medic.

Foarte rare (pot afecta pînă la 1 din 10000 persoane):

- manifestări de hipersensibilitate,
- reacții alergice (hiperemie, erupții, prurit, edemul tegumentelor, urticarie).
- bradicardie (scădere a ritmului cardiac),
- hipotensiune arterială (scădere tensiunii arteriale).

Alte reacții adverse posibile:

Cu frecvență necunoscută

- vertij,
- somnolență,
- fenomene dispeptice (diaree),
- slăbiciune generală,
- fatigabilitate sporită.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

<http://www.amed.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cratal

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25 °C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cratal

1 comprimat conține:

substanțe active: extract dens de fructe de păducel (*Crataegiae fructus extractum spissum*) (3,0-3,3 :1), (extragent: etanol 70 %), în recalcul la substanța uscată - 43 mg, extract dens de talpa-gâștei (*Leonuriae herba extractum spissum*) (4,5-5,6 :1), (extragent: etanol 70 %), în recalcul la substanța uscată - 87 mg, taurină, în recalcul la 100 % substanța uscată - 867 mg;

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

Cum arată Cratal și conținutul ambalajului

Comprimate ovale, de culoare de la cenușiu-deschisă sau brun-deschisă până la brun-închisă, cu suprafața biconvexă și incluziuni.

Câte 10 comprimate în blister, câte 2 blistere împreună cu prospect pentru utilizator în cutie de carton.

Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul

Deținătorul Certificatului de Înregistrare

Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, 03134, str. Mira, 17, or. Kiev, Ucraina.

Fabricantul

Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, 03134, str. Mira, 17, or. Kiev, Ucraina.

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>