

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Aciclovir-Vishpha 25 mg/g unguent

Aciclovirum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este **Aciclovir-Vishpha** și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați **Aciclovir-Vishpha**
3. Cum să utilizați **Aciclovir-Vishpha**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **Aciclovir-Vishpha**
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Aciclovir-Vishpha și pentru ce se utilizează

Aciclovir-Vishpha conține o substanță activă numită aciclovir. Aciclovir-Vishpha este folosit pentru a trata ulcerările herpetice și alte infecții ale pielii determinate de virusul herpes simplex.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aciclovir-Vishpha

Nu utilizați Aciclovir-Vishpha:

- Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la aciclovir, valaciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Dacă nu sunteți sigur, întrebați medicul sau farmacistul înainte să utilizați Aciclovir-Vishpha.

Atenționări și precauții

A se evita contactul cu ochi. Dacă ajunge totuși unguent, la nivelul ochilor dumneavoastră spălați cu multă apă rece. Dacă apar ulcerări, informați medicul.

Preparatul trebuie să fie administrat numai pentru a trata herpesul pe buze și față. Nu se va administra în ochi, în interiorul gurii sau al vaginului. Nu se va administra pentru a trata herpesul genital.

În cazuri de afecțiuni severe nu vă tratați singur cu Aciclovir-Vishpha decât dacă medicul vă recomandă aceasta.

Nu se recomandă administrarea preparatului la persoane cu virusul HIV fără consultația medicului.

În acest caz, o infecție a pielii poate fi mai serioasă pentru dumneavoastră decât pentru alte persoane.

Informați medicul dumneavoastră de fiecare dată când apar ulcerări herpetice.

Aciclovir-Vishpha împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală, deși nu au fost identificate interacțiuni clinice semnificative, cu alte medicamente.

Aciclovir-Vishpha cu alimente, băuturi și alcool

Efectul Aciclovir-Vishpha nu este influențat de aportul de alimente și băuturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu există informații privind efectul dăunător al dozelor terapeutice de aciclovir asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Aciclovir-Vishpha

Adulți și copii de la 12 ani

Utilizați întotdeauna Aciclovir-Vishpha exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Spălați-vă de fiecare dată mâinile înainte și după ce folosiți unguent. Aciclovir-Vishpha acționează cel mai bine atunci când este folosit de la primele semne ale bolii. Dacă aceasta este prima infecție cu virus herpes simplex, folosiți imediat unguent. Dacă apar umflături herpetice în mod regulat, începeți să folosiți unguent imediat ce simțiți apariția uneia. Acestea se manifestă prin senzații de înțepături, mâncărime sau dureri ascuțite.

Aplicați unguent pe aria afectată la fiecare patru ore în timpul zilei. Aceasta înseamnă de aproximativ 5 ori pe zi.

Folosiți Aciclovir-Vishpha unguent pentru o perioadă nu mai puțin de 4 zile. Dacă ulcerațiile nu s-au vindecat complet după patru zile, folosiți cu atenție unguent pentru încă cinci-șase zile. Dacă ulcerațiile nu s-au vindecat după zece zile, opriți folosirea unguentului și adresați-vă medicul.

Copii

Nu sunt date suficiente privind siguranța administrării la copii sub 12 ani. Nu se recomandă administrarea preparatului la aceasta grupa de pacienți.

Dacă utilizați mai mult Aciclovir-Vishpha decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Aciclovir-Vishpha

Dacă ați omis o doză de unguent, aplicați imediat ce vă aduceți aminte. Apoi, continuați ca mai înainte.

Dacă încetați să utilizați Aciclovir-Vishpha

Trebuie să utilizați Aciclovir-Vishpha atâta timp cât vă recomandă medicul.

Adresați-vă mai întâi medicului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Aciclovir-Vishpha poate determina reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Unele persoane pot fi alergice/sensibile la Aciclovir-Vishpha. Au existat cazuri rare de reacții alergice incluzând umflături în special ale buzelor, feței și/sau pleoapelor; înroșirea tegumentelor sau umflături dureroase ale pielii. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, informați imediat medical dumneavoastră și nu mai folosiți unguent până când medicul sau farmacistul nu vă spune să o faceți. Aciclovir-Vishpha poate determina înțepături sau senzație ușoară de arsuri atunci

când îl aplicați pentru prima dată. Anumite persoane își pot simți pielea uscată sau prea moale, pot avea senzații de înțepături ușoare sau pot observa înroșirea acesteia. Dacă oricare dintre aceste efecte adverse vă supără, informați medicul.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Aciclovir-Vishpha

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Aciclovir-Vishpha după data de expirare înscrisă pe ambalaj după exp.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Aciclovir-Vishpha

- Substanța activă este aciclovir 25 mg/g.

- Celelalte componente sunt: polietilenglicol 1500, polietilenglicol 400, propilenglicol, emulgator N1.

Cum arată Aciclovir-Vishpha și conținutul ambalajului

Aciclovir-Vishpha se prezintă sub formă de unguent de culoare albă.

Cutie cu un tub a câte 10 g unguent.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

DKP Fabrica farmaceutică,
str. Koroliova, 4, s-l Stanișovka, r-ul Jitomir,
reg. Jitomir, 12430, Ucraina

Fabricantul

DKP Fabrica farmaceutică,
str. Koroliova, 4, s-l Stanișovka, r-ul Jitomir,
reg. Jitomir, 12430, Ucraina

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2020.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>