

## **Prospect: Informații pentru consumator/pacient**

### **Herbion Ivy 7 mg/ml sirop** *Hederae heliis folii extractum siccum*

#### **Citiți cu atenție și în întregime acest prospect deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Herbion Ivy și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Herbion Ivy
3. Cum să luați Herbion Ivy
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Herbion Ivy
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Herbion Ivy și pentru ce se utilizează**

Herbion Ivy conține extract uscat de frunză de iederă.

Herbion Ivy este un medicament din plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Herbion Ivy**

##### **Nu luați Herbion Ivy:**

- dacă sunteți alergic la extractul de frunză de iederă, la alte plante din familia *Araliaceae* (iederă) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Nu administrați acest medicament copiilor cu vârsta sub 2 ani, din cauza riscului agravării simptomelor respiratorii.

##### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați Herbion Ivy, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

- dacă apare dificultate la respirație, febră sau spută purulentă (cu conținut de puroi), trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- dacă simptomele bolii nu se ameliorează timp de 7 zile de utilizare a acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

- nu este recomandată utilizarea acestui medicament împreună cu alte medicamente care inhibă tusea (antitusive cum sunt codeina sau dextrometorfanul) fără indicație medicală.  
- dacă aveți probleme la stomac (gastrită, ulcer la stomac), acest medicament trebuie utilizat cu precauție.

### **Copii și adolescenți**

Dacă copiii cu vârsta între 2-4 ani prezintă tuse persistentă sau recurentă, este necesar consult medical înainte de începerea tratamentului.

### **Herbion Ivy împreună cu alte medicamente**

Comunicați medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați orice alte medicamente. Nu există date privind influența Herbion Ivy asupra efectelor altor medicamente.

### **Herbion Ivy împreună cu alimente și băuturi**

Puteți lua Herbion Ivy indiferent de orarul meselor.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Herbion Ivy nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu există date suficiente privind utilizarea extractului de frunză de iederă la femei gravide și mame care alăptează.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu s-a raportat ca Herbion Ivy să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Herbion Ivy conține sorbitol (E420) și alcool etilic**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l contactați înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament conține cantități mici de alcool etilic, mai puțin de 100 mg per doză.

## **3. Cum să luați Herbion Ivy**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Adulți**

Doza recomandată pentru **adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani** este de 5 până la 7,5 ml sirop, de două ori pe zi.

### **Utilizarea la copii și adolescenți**

Doza recomandată pentru **copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani și 12 ani** este de 5 ml sirop de două ori pe zi.

Doza recomandată pentru **copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 5 ani** este de 2,5 ml sirop de două ori pe zi.

Utilizarea la **copii cu vârsta sub 2 ani** este contraindicată.

Administrați siropul dimineața și după-amiaza devreme. Puteți lua medicamentul independent de orarul meselor.

Când luați Herbion Ivy, consumați multă apă sau alte lichide calde, care nu conțin cofeină.

Dacă utilizați acest medicament și simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână, consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

#### **Dacă luați mai mult Herbion Ivy decât trebuie**

Nu luați doze mai mari decât cele recomandate. Administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate (mai mult de o doză de două ori pe zi) poate provoca greață, vărsături, diaree și agitație. Tratamentul este simptomatic.

#### **Dacă uitați să luați Herbion Ivy**

Nu luați o doză dublă, pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):*

- greață, vărsături, diaree.

*Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):*

- reacție alergică manifestată sub formă de blânde (urticarie), erupții trecătoare pe piele, mici hemoragii ale vaselor capilare, mai ales la nivelul obrazilor și nasului (cuperoză) și dificultăți la respirație.

**Dacă apare vreo reacție alergică, întrerupeți utilizarea medicamentului și adresați-vă medicului dumneavoastră.**

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amed.md> sau prin e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Herbion Ivy**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Aceste medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.  
Siropul trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Herbion Ivy**

- Substanța activă este extractul uscat de frunză de iederă. 1 ml sirop conține 7 mg extract uscat de frunză de iederă (*Hedera helix* L., folium) (5–7,5:1).

Solvent de extracție: alcool etilic 30% (m/m).

- Celelalte componente sunt: sorbitol lichid (necristalizabil)(E420), glicerol (E 422), benzoat de sodiu (E211), acid citric monohidrat (E330), aromă balsamică de lămâie (propilenglicol (E1520), alcool etilic (E1510), ulei esențial de citronella, citral din *Litsea cubeba*, ulei esențial de lămâie distilat; ulei de coriandru), apă purificată. Vezi pct. 2 *Herbion Ivy conține sorbitol (E420) și alcool etilic.*

### **Cum arată Herbion Ivy și conținutul ambalajului**

Siropul are o culoare galben-brun, miros și gust specific. Poate fi observat un sediment în cantitate redusă.

Siropul este disponibil în cutie cu 1 flacon cu 150 ml sirop și o linguriță dozatoare.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

KRKA, d.d., Novo mesto,  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
Slovenia

#### **Fabricantul**

KRKA, d.d., Novo mesto,  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
Slovenia

### **Acest prospect a fost revizuit în August 2017**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>