

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Tinctură de Ginseng picături orale, soluție

Panax ginseng

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 7 zile de tratament nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tinctură de Ginseng și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tinctură de Ginseng
3. Cum să luați Tinctură de Ginseng
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tinctură de Ginseng
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE TINCTURĂ DE GINSENG ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Medicamentul conține extract de rădăcini de Ginseng, cu proprietăți de stimulare a sistemului nervos central, manifestă acțiune tonizantă generală, de creștere a tensiunii arteriale și de scădere a nivelului de zahăr în sânge: ameliorează pofta de mâncare, crește capacitatea de muncă fizică și intelectuală; stimulează funcția sexuală; reduce slăbiciunea generală, oboseala sporită, somnolența, scade nivelul de colesterol și zahăr în sânge; stimulează funcția corticosuprarenalelor.

Tinctură de Ginseng este indicat în caz de tensiune arterial scăzută, sindrom astenic, epuizare psihică și fizică, sindrom neurastenic, perioada de convalescență după maladii îndelungate și severe suportate, inclusiv infecțioase; distonie vegetativă de tip hipotonic, terapia complexă a diminuării forței sexuale pe fundal de neurastenie.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ LUAȚI TINCTURĂ DE GINSENG

Nu luați Tinctură de Ginseng dacă:

- sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6),
- aveți tensiune arterială crescută
- suferiți de hiperexcitabilitate
- suferiți de epilepsie sau aveți stări convulsive
- aveți tulburări de somn
- aveți boli infecțioase acute
- sunteți predispus la hemoragii
- suferiți de boli cornice ale ficatului

- sunteți gravidă sau alăptați.

Tinctură de Ginseng nu se utilizează la copii cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Tinctură de Ginseng.

Preparatul nu se va administra în a doua jumătate a zilei, pentru a evita tulburările de somn. S-a stabilit că medicamentul posedă o acțiune sezonieră distinsă: utilizarea sa este mai eficientă toamna și iarna.

Tinctură de Ginseng împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

Vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră dacă utilizați:

- medicamente cu acțiune stimulantă asupra sistemului nervos central (psihostimulante)
- medicamente care stimulează sistemul nervos central și funcția respiratorie (analeptice), inclusiv cafeină, camforă
- medicamentele cu acțiune deprimantă asupra sistemului nervos central (antiepileptice, neuroleptice, tranchilizante și sedative).
- medicamente care scad nivelul de zahăr în sânge (hipoglicemizante)
- medicamente care subțiază sângele, inclusiv warfarina
- medicamente care elimină apa din organism (diuretice de ansă).

Tinctură de Ginseng împreună cu alimente și băuturi

Tinctură de Ginseng trebuie utilizat cu 30-40 min înainte de masă.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Tinctură de Ginseng nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Conține etanol, care ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Informații importante despre unele componente ale medicamentului

Conține alcool etilic cel puțin 67 vol%, adică până la 212 mg per doză maximă pentru o utilizare, echivalent cu 5,4 ml bere sau 2,2 ml vin/doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii și grupuri cu risc crescut cum sunt pacienți cu boli hepatice sau epilepsie.

3. CUM SĂ LUAȚI TINCTURĂ DE GINSENG

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Câte 15-20 picături, de 2-3 ori pe zi, cu 30-40 min înainte de masă.
Durata curei de tratament – 30-40 zile.
Cura de tratament poate fi repetată la recomandarea medicului.

Copii și adolescenți

Medicamentul nu se va indica copiilor cu vârsta sub 18 ani.

Dacă luați mai mult Tinctură de Ginseng decât trebuie

În caz de supradozaj accidental, adresați-vă medicului dumneavoastră sau mergeți la departamentul de urgență a celui mai apropiat spital.

În caz supradozaj reacțiile adverse se pot agrava.

Dacă uitați să luați utilizați Tinctură de Ginseng

Dacă ați omis o doză, continuați regimul de tratament obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Tinctură de Ginseng

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacții alergice, dureri de cap, tulburări de somn, bătăi prea rapide ale inimii (tahicardie), tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială), scăderea nivelului de zahăr în sânge (hipoglicemie).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TINCTURĂ DE GINSENG

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Tinctură de Ginseng

- Substanța activă este: 25 ml de extract hidroalcoolic (extractant - etanol 70 %) din 2,5 g rădăcini de Ginseng (*Panax ginseng*).
- Celălalt component este: etanol 70 % (extractant).

Cum arată Tinctură de Ginseng și conținutul ambalajului

Lichid transparent de culoare gălbuie, cu miros specific.

Este disponibil câte 25 ml în flacoane de sticlă de culoare oranj. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SAÎ «VIFITEH»,
Rusia, 142279, reg. Moscova;
r-ul Serpuhov, s. Obolensk, CȘSMA.
Tel./fax: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Fabricantul

SAÎ «VIFITEH»,
Rusia, 142279, reg. Moscova;
r-ul Serpuhov, s. Obolensk, CȘSMA.

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>