

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă 500 mg/200 UI comprimate masticabile Calciu/Colecalciferol (vitamina D₃)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă
3. Cum să luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă și pentru ce se utilizează

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă reprezintă comprimate masticabile care conțin calciu și vitamina D₃, ambele fiind substanțe importante în formarea oaselor.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă este utilizat pentru prevenirea și tratamentul deficitului de calciu și vitamina D și în calitate de supliment în tratamentul specific al osteoporozei.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă

Nu luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă:

- dacă sunteți alergic la calciu, vitamina D sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți probleme severe cu rinichii;
- dacă aveți cantități excesive de calciu în sânge sau în urină;
- dacă aveți pietre la rinichi;
- dacă aveți cantități excesive de vitamina D în sânge.

Atenționări și precauții

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă:

- dacă sunteți în tratament pe termen lung, mai ales dacă luați, de asemenea, diuretice (utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute sau edemului) sau glicozide cardiace (utilizate pentru tratamentul tulburărilor inimii);
- dacă aveți semne de afectare a funcției renale sau tendință crescută de formare a pietrelor la rinichi;

- dacă aveți sarcoidoză (o tulburare a sistemului imunitar, care poate crește nivelul de vitamina D în organism);
- dacă aveți osteoporoză și, în același timp, nu sunteți capabil să vă mișcați;
- dacă luați alte produse care conțin vitamina D. Dozele suplimentare de calciu și vitamina D trebuie luate sub supraveghere medicală atentă.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Dacă luați în același timp tetraciclina (un tip de antibiotice), trebuie să le luați cu cel puțin 2 ore înainte sau peste 4-6 ore după administrarea Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă. Carbonatul de calciu poate interfera cu absorbția preparatelor de tetraciclină dacă sunt luate în același timp.

Medicamentele care conțin bifosfonați trebuie administrate cu cel puțin o oră înainte de administrarea de Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă.

Calciul poate reduce efectul levotiroxinei. Din acest motiv, levotiroxina trebuie luată cu cel puțin 4 ore înainte sau 4 ore după Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă.

Efectul antibioticelor chinolone poate fi redus dacă sunt luate în același timp cu calciu. Luați antibioticele chinolone cu 2 ore înainte sau peste 6 ore după administrarea Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă.

Sărurile de calciu pot scădea absorbția fierului, zincului și ranelatului de stronțiu. În consecință, preparatele de fier, zinc sau ranelat de stronțiu trebuie luate cu cel puțin 2 ore înainte sau după Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă.

Alte medicamente care pot influența sau pot fi influențate de Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă sunt:

- diureticele tiazidice (utilizate în tratamentul tensiunii arteriale mari și a edemului)
- glicozidele cardiace (utilizate în tratamentul bolilor de inimă).

Orlistatul (utilizat pentru a trata obezitatea) poate deregla absorbția vitaminelor solubile în grăsimi, de exemplu, vitamina D₃.

Dacă luați oricare dintre medicamentele menționate mai sus, medicul dumneavoastră vă va oferi instrucțiuni suplimentare.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă cu împreună cu alimente, băuturi și alcool

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă poate fi luat cu sau fără alimente și băuturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Dacă sunteți gravidă, puteți utiliza Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă în cazul unui deficit de calciu și vitamina D. În timpul sarcinii nu trebuie să luați mai mult de 2500 mg calciu și 4000 UI vitamina D pe zi, deoarece supradozajul poate dăuna fătului.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă poate fi utilizat în timpul alăptării. Calciul și vitamina D trec în laptele matern. Acest lucru trebuie luat în considerare dacă administrați suplimentar vitamina D copilului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă nu are nici o influență cunoscută asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă conține izomaltitol (E 953) și zaharoză.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă conține zaharoză (0,4 mg), care poate dăuna dinților. Comprimatul, de asemenea, conține izomaltitol (E 953). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă practic este lipsit de sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 23 mg sodiu per comprimat, adică, practic este lipsit de sodiu.

3. Cum să luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Doza recomandată este de 1 comprimat de 1-3 ori pe zi.

Utilizarea la copii

Doza recomandată pentru copii este de un comprimat de 1-2 ori pe zi.

Comprimatul poate fi mestecat sau supt.

Dacă luați mai mult Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă decât trebuie

Dacă ați luat mai mult Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă decât trebuie, contactați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Dacă uitați să luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă

Nu luați o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă aveți orice alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să luați Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă

Dacă aveți orice alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile de hipersensibilitate au apărut cu o frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Dacă prezentați următoarele simptome, trebuie să vă adresați imediat unui medic: umflarea feței, limbii, buzelor (angioedem) sau umflarea gâtului (edem laringian).

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

Pot să apară cantități excesive de calciu în sânge (hipercalcemie) sau în urină (hipercalciurie) la utilizarea dozelor mari.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

Constipație, tulburări digestive, balonare, greață, dureri de stomac, diaree.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10 000 de persoane)

Mâncărime, erupții pe piele și urticarie. Sindromul lapte-alkaline (de asemenea, numit sindromul Burnett, de obicei, este observat doar la ingerarea cantităților excesive de calciu), simptomele incluzând: nevoia de a urina frecvent, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare, greață sau vărsături, oboseală sau slăbiciune neobișnuită, concomitent cu niveluri ridicate de calciu în sânge și afectarea funcției rinichilor.

Dacă aveți insuficiență renală, s-ar putea să fiți expus riscului apariției unor cantități crescute de fosfat în sânge, formării de pietre la rinichi și cantităților crescute de calciu în rinichi.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Calcium-D3 Nycomed cu gust de mentă

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

A se ține flaconul bine închis.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă

Substanțele active sunt:

- carbonat de calciu 1250 mg (echivalent cu 500 mg calciu)
- colecalciferol (vitamina D₃) 200 UI (5 micrograme).

Celelalte componente sunt: xilitol (E 967), povidonă, izomaltitol (E 953), aromă (mintă), stearat de magneziu, sucraloză (E 955), mono- și digliceride ale acizilor grași, DL- α -tocoferol, zaharoză, amidon de porumb modificat, trigliceride cu lanț mediu, ascorbat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

Cum arată Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă și conținutului ambalajului

Calcium-D3 Nycomed cu gust de mintă se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă, rotunde, biconvexe. Pot avea incluziuni mici.

Ambalaj:

Câte 30 comprimate masticabile în flacon din HDPE. Câte 1 flacon în cutie împreună cu prospectul.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Takeda AS
Drammensverien 852
NO-1383 Asker
Norvegia

Fabricantul

Takeda AS
Drammensveien 852
NO-1383 Asker
Norvegia

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>