

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### ALLOCHOL comprimate filmate

Combi-nație

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l oferiți altor persoane. Le poate dăuna, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea include orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Allochol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Allochol
3. Cum să luați Allochol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Allochol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Allochol și pentru ce se utilizează**

Medicamentul dumneavoastră se numește Allochol.

Allochol – medicament pe bază de plante, care constă din următoarele componente: bilă uscată, pulbere de usturoi uscat, frunze de urzică, cărbune activat. Allochol se referă la un grup de medicamente utilizate în afecțiuni conductele biliare și sfincterelor.

Allocholul este utilizat ca parte a unui tratament complex de colecistita cronică (inflamație a vezicii biliare); dischinezie a vezicii biliare; sindromului postcolecistectomic (simptomele după îndepărtarea chirurgicală a veziculei biliare); constipației atonice (tonusul muscular a intestinului scăzut); colesteroză biliară (depunerea de colesterol anormal în țesuturi).

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Allochol**

**Nu luați Allochol:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la componentele medicamentului (vezi pct.6);
- dacă aveți hepatită acută (inflamație a ficatului);
- litiaza biliară;
- icter mecanic (gălbuie colorare a pielii și a mucoaselor);
- spasmul sfincterului Oddi (impermeabilitatea ductelor biliare și sucului pancreatic);
- pancreatită acută (inflamație a pancreasului);
- ulcer gastric și duodenal (formarea de defecte pe mucoasa);
- enterocolită acută (inflamație a colonului și intestinului subtire).

Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Allochol.

**Atenționări și precauții:**

Informați-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist înainte de a vi se administra acest medicament, dacă:

- Aveți litiază renală.

Dacă nu sunteți sigur dacă oricare dintre cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza Allochol.

### **Allochol împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală sau preparate pe bază de plante medicinale. Acest lucru este important deoarece Allochol poate influența acțiunea unor medicamente. De asemenea, anumite medicamente pot influența acțiunea Allocholului.

În mod special, spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

- coleretice de origine sintetică sau vegetală;
- laxativele;
- vitamine liposolubile;
- antisepticele sau remediile chimioterapice;
- preparatele care conțin hidroxid de aluminiu, holestiramin, colestipol.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în sarcină și perioada de alăptare e posibilă doar după consultarea medicului, care va determina raportul beneficiu/risc.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu sunt date despre influența negativă a medicamentului asupra vitezei reacțiilor psihomotorii în caz de conducere a autovehiculelor și de manevrare a utilajului.

## **3. Cum să luați Allochol**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se administrează oral, după mese.

Numărul de zile sau de săptămâni în care vi se va administra Allocholul depinde de tipul bolii pe care o aveți.

### **Instrucțiuni pentru utilizarea corectă**

Adulților li se indică câte 1-2 comprimate de 3-4 ori pe zi după mesă timp de 3-4 săptămâni.

Ulterior – câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi după mesă timp de 1-2 luni.

La necesitate cura de tratament se repetă de 2-3 ori cu interval de 3 luni între curele de tratament.

Primele semne de ameliorare clinică apar la a 5-8 zi de la inițierea tratamentului (diminuarea durerilor în hipocondrul drept, dispariția fenomenelor dispeptice).

### **Copii**

Acest medicament nu se administrează copiilor.

### **Dacă luați mai mult Allochol decât trebuie**

Dacă ați luat mai mult Allochol decât trebuie, anunțați imediat medicul dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital. Luați acest prospect sau comprimatele produsului cu dumneavoastră pentru ca medicul să știe ce ați luat.

S-a raportat că la administrarea îndelungată în doze mai mari decât cele recomandate, pot apărea următoarele simptome: diaree, greață, senzație de mâncărime a pielii, creșterea nivelului transaminazelor în sânge.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Dacă uitați să luați Allochol**

Dacă ați uitat să luați o doză din medicamentul dumneavoastră, nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Doza uitată trebuie administrată numai dacă intervalul de timp pînă la următoare doză este suficient de lung.

Luați doza următoare la momentul obișnuit.

### **Dacă încetați să luați Allochol**

Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a întrerupe utilizarea acestui medicament. Administrarea neregulată sau întreruperea prea devreme a tratamentului pot compromite rezultatul tratamentului sau pot duce la revenirea bolii, a cărui tratament este mai dificil. Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Allochol poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Dacă aveți o reacție adversă, adresați-vă unui medic.**

**Reacții adverse cu frecvență necunoscută, care sunt:**

- reacții alergice,
- diaree.

Reacții adverse sunt foarte rare și neînsemnate.

## **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament

## **5. Cum se păstrează Allochol**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25 °C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Allochol**

1 comprimat filmat conține:

substanțe active: bilă uscată (în recalcul la substanță anhidră și compoziția calitativă a acidului colic) – 80 mg, pulbere de usturoi uscat – 40 mg, frunze mărunțite de urzică – 5 mg, cărbune activat – 25 mg;

Celelalte componente sunt: nucleul: celuloză microcristalină, croscarmeloză de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; filmul: hipromeloză, dioxid de titan (E 171), polietilenglicol (macrogol, PEG 400, PEG 4000), alcool polivinilic, talc, lecitină, galben de chinolină E 104, indigocarmin E 132.

### **Cum arată Allochol și conținutul ambalajului**

Comprimate filmate de culoare de la galben până la galben-verzuie, rotunde, biconvexe. La secțiunea transversală se vizualizează nucleul, înconjurat de un strat de film.

Câte 10 comprimate filmate în blister, câte 5 blistere împreună cu prospect pentru utilizator în cutie de carton.

## **Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul**

### **Deținătorul Certificatului de Înregistrare**

Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, 03134, str. Mira, 17, or. Kiev, Ucraina.

### **Fabricantul**

Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, 03134, str. Mira, 17, or. Kiev, Ucraina.

**Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2020.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>