

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Cinnarizin 25 mg comprimate

Cinarizină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cinnarizin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cinnarizin
3. Cum să utilizați Cinnarizin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cinnarizin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cinnarizin și pentru ce se utilizează

Cinnarizin este un medicament care îmbunătățește circulația cerebrală. Aparține grupului de medicamente pentru tratamentul și prevenirea amețelilor.

Adulți

Terapie de întreținere în cazul simptomelor de tulburări labirintice, precum amețeli, tinitus (țiuială în urechi), nistagmus, greață și vomă.

Rău de mișcare.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cinnarizin

Nu luați Cinnarizin:

- dacă aveți boală Parkinson;
- dacă aveți tensiune arterială scăzută (hipotensiune arterială);
- dacă dumneavoastră aveți afecțiuni la nivelul ficatului sau rinichilor;
- dacă obișnuiți să consumați băuturi alcoolice;
- dacă luați alte medicamente inclusiv tranchilizante (medicamente utilizate pentru relaxarea mușchilor sau pentru reducerea anxietății) sau antidepressive triciclice sau hipnotice (medicamente utilizate pentru tratarea tulburărilor de dispoziție sau de somn).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cinnarizin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cinarizina poate provoca disconfort gastric. Iritația gastrică se diminuează prin administrarea medicamentului după mese.

La pacienții cu boală Parkinson, cinarizina se va administra doar dacă beneficiile terapeutice depășesc riscul de agravare a bolii.

Cinarizina trebuie utilizată cu precauție la pacienții cu insuficiență hepatică sau renală.

La persoanele predispuse la hipotensiune este necesar să fie măsurată tensiunea arterială în timpul tratamentului.

În cazul administrării prelungite este recomandat un examen de control al funcției ficatului, rinichilor și sângelui periferic.

Datorită efectului antihistaminic, administrarea cinarizinei trebuie întreruptă cu 4 zile înaintea de efectuarea unui test alergic al pielii.

Cinarizina poate afecta rezultatul testului antidoping al sportivilor (fals pozitiv).

Copii și adolescenți

Dată fiind lipsa de date suficiente, medicamentul este contraindicat copiilor sub 12 ani.

Cinnarizin împreună cu alte medicamente

Cinnarizin poate spori efectul asupra sistemului nervos central al analgezicelor narcotice, somniferelor, preparatelor pentru anestezie generală și alcoolului.

Cinnarizin poate crește efectul sedativ asupra SNC (sistemului nervos central) al următoarelor substanțe: alcool, barbiturice (fenobarbital), alte hipnotice (somnifere), analgezice narcotice (codeină), anxiolitice (diazepam), antidepresante triciclice și antipsihotice.

Nu au fost observate interacțiuni nedorite în timpul administrării cinarizinei împreună cu medicamentele antihipertensive (pentru scăderea tensiunii arteriale), diuretice (pentru stimularea formării urinei), anticoagulante (medicamente care influențează procesul de coagulare a sângelui) sau medicamentele hipoglicemice (pentru scăderea nivelului glicemiei). Cu atropină și alți agenți anticolinergici (analgezice antispasmodice) se poate aștepta un efect aditiv (complementar).

Dacă trebuie să faceți teste cutanate pentru reactivitatea histaminică (hipersensibilitate), tratamentul cu cinarizină trebuie întrerupt cu 4 zile înainte de teste, din cauza pericolului de a obține un rezultat fals negativ.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Cinnarizin Sopharma împreună cu alimentare și băuturi

Nu se recomandă consumul de băuturi alcoolice în timpul curei de tratament cu medicamente.

Sarcina și alăptarea

Sarcina

Nu se recomandă administrarea medicamentului Cinnarizin în timpul sarcinii. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Alăptarea

În perioada de alăptare trebuie evitată administrarea medicamentului Cinnarizin.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

La unii pacienți Cinnarizin poate avea un efect negativ asupra atenției și a reflexelor. Prin urmare, medicamentul trebuie să fie administrat cu atenție specială de persoanele care lucrează ca șoferi de vehicule, muncitori la altitudine și angajați din cadrul altor profesii potențial periculoase care necesită concentrare și viteză a reacțiilor psihomotorii, deoarece medicamentul încetinește reacțiile, în special la începutul tratamentului.

Informații importante privind unele componente ale Cinnarizinei

Cinnarizin conține lactoză și amidon de grâu.

Lactoza poate fi periculoasă pentru persoanele cu deficit de lactază, galactozemie sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză (o tulburare a descompunerii și absorbției substanțelor în intestinul subțire).

Amidonul de grâu poate fi periculos pentru persoanele cu enteropatie glutenică (intoleranță la gluten).

3. Cum să utilizați Cinnarizin

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur

Comprimatele se administrează după mese.

Doza

Adulți:

În cazul tulburărilor labirintice va fi administrat un comprimat de 3 ori pe zi.

În caz de cinetoză (rău de mișcare): 1 comprimat cu jumătate de oră înainte de drum, iar dacă este necesar, se repetă la fiecare 6 ore.

Doza zilnică maximă nu trebuie să depășească 225 mg (9 comprimate) pe zi.

Cura de tratament este de la câteva săptămâni până la câteva luni. Durata administrării medicamentului este determinată de medic.

Utilizarea la copii

Nu este recomandat pentru utilizare la copii. Doza pentru copiii peste 12 ani corespunde cu doza pentru adulți.

Dacă ați luat mai mult Cinnarizin decât trebuie și au apărut semne de somnolență, vomă, slăbiciune musculară, tremur al membrelor, contactați imediat medicul pentru ajutor.

Dacă ați uitat să luați Cinnarizin

Nu luați o doză dublă, încercând să compensați doza ratată. Luați următoarea doză la ora obișnuită de administrare.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

4. Reacții adverse posibile

De regulă, medicamentul este bine tolerat de pacienți. Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele

Cele mai frecvent întâlnite reacții nedorite- somnolență. greață. hiperhidroză (transpirație excesivă), keratoză lichenoidă, creștere ponderală.

Alte reacții adverse întâlnite mai rar (puțin frecvente): hipersomnie, cefalee. disconfort stomacal, dispepsie, senzație de uscăciune în gură, oboseală

Reacții nedorite cu frecvență foarte rară – dischinezii, parkinsonism, tulburări extrapiramidale (tremurul extremităților și creșterea tonusului muscular, hipokinezie), depresie, letargie. lichen plat, lupus eritematos cutanat subacut (simptome cutanate de tip lichen plat și lupus) rigiditate musculară.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și

Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cinnarizin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25° C în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate .

Perioada de valabilitate este de 3 ani.

Nu folosiți medicamentul după data de expirare indicată pe blister și cutia de carton.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Fiecare comprimat conține substanța activă cinnarizină 25 mg.

Celălalte componente sunt lactoză monohidrat, amidon de grâu, povidonă K25 (polivinilpirolidonă), aerosil 200 (dioxid de siliciu coloidal), talc, stearat de magneziu.

Cum arată Cinnarizin și conținutul ambalajului

Comprimatele sunt rotunde, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă. Blister cu 50 de comprimate. Cutie de carton care conține 1 blister, împreună cu prospectul pentru pacient.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

„PHARMA” AD

Bulgaria, 2600 Dupnitsa, str. Neofit Rilski 13

Tel.: (0701) 50286, fax: (0701) 50290

E-mail: pharmaad@gmail.com

Fabricantul

„PHARMA” AD

Bulgaria, 2600 Dupnitsa, str. Neofit Rilski 13

Tel.: (0701) 50286, fax: (0701) 50290

E-mail: pharmaad@gmail.com

Acest prospect a fost revizuit în martie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>