

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

FURAGIN 50 mg comprimate

Furazidină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este FURAGIN și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați FURAGIN
3. Cum să utilizați FURAGIN
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează FURAGIN
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE FURAGIN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

FURAGIN este un remediu antimicrobian. FURAGIN inhibă sisteme enzimatice ale microorganismelor, la fel și alte procese biochimice în celula bacteriană, ceea ce duce la moartea lor.

FURAGIN se utilizează în tratamentul infecțiilor acute și cronice ale rinichilor, vezicii urinare, uretrei, prostatei, de asemenea a infecțiilor după intervenții chirurgicale pe organele sistemului urogenital.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI FURAGIN

Nu utilizați FURAGIN

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la furazidină, alți derivați de nitrofurani sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți probleme grave cu rinichii;
- dacă aveți probleme grave cu ficatul;
- dacă suferiți de tulburări senzoriale la nivelul mâinilor și picioarelor (polineuropatie), inclusiv în caz de diabet zaharat;
- dacă suferiți de o boală ereditară rară, cauzată de un deficit al unei enzime, numită 6-glucozo-fosfatdehidrogenaza;
- dacă suferiți de o boală ereditară rară, numită porfirie (cu erupții de vezicule pe pielea expusă luminii);
- dacă aveți afecțiuni ereditare rare de intoleranță la unele zaharuri;
- dacă vă aflați la hemodializă sau dializă peritoneală.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați FURAGIN, adresați-vă medicului dumneavoastră:

- dacă aveți probleme cu rinichii, inclusiv infecții ale rinichilor sau căilor urinare;
- dacă aveți un număr scăzut de globule roșii în sânge (anemie);
- dacă aveți deficit al vitaminelor grupei B și acidului folic;
- dacă aveți probleme cu plămâni;
- dacă aveți diabet zaharat.

Spuneți medicului, dacă pe durata tratamentului apar:

- durere și tulburări de sensibilitate ale unei zone;
- diaree persistentă – în acest caz nu administrați medicamente, care încetinesc motilitatea intestinală.

FURAGIN acționează nefavorabil asupra funcției testiculelor, manifestată prin reducerea cantității de spermă și ejaculat, reducerea mobilității spermatozoizilor și modificarea patologică a morfologiei lor.

Medicul poate să vă efectueze teste sanguine pe durata tratamentului, pentru a vă urmări starea sângelui, ficatului și rinichilor și funcția pulmonară.

Acest medicament poate, de asemenea, influența rezultatele testelor de urină pentru zahăr. Dacă aveți diabet zaharat și vă testați frecvent urina, spuneți medicului dumneavoastră. Faceți acest lucru deoarece trebuie utilizate alte teste.

Pentru profilaxia tulburărilor senzoriale medicul poate să vă recomande să utilizați concomitent medicamente antialergice și vitaminele grupei B (nicotinamidă, tiamină).

Copii

FURAGIN nu se administrează la copii.

FURAGIN împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați luat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripția medicului.

Spuneți medicului dacă luați:

- produse alcaline;
- acid ascorbic;
- clorura de calciu;
- cloramfenicol, ristomicină, sulfamide, chinolone (acidul nalidixic, acidul oxolinic, norfloxacină), aminoglicozide – remedii antimicrobiene, utilizate în infecții;
- probenicid sau sulfonpirazonă – utilizate în tratamentul gutei;
- antiacide (care conțin trisilicat de magneziu) – utilizate în caz de aciditate gastrică crescută.

FURAGIN împreună cu alimente, băuturi și alcool

Evitați consumul alcoolului pe durata tratamentului deoarece el poate intensifica manifestările reacțiilor adverse (bătăi puternice de inimă, dureri în regiunea inimii, durere de cap, grețuri, vomă, convulsii, scăderea tensiunii arteriale, febră, neliniște).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

FURAGIN este contraindicat în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

De obicei medicamentul nu influențează viteza reacției la conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor, dar persoanele, la care în timpul tratamentului apar amețeli, somnolență sau alte reacții adverse din partea sistemului nervos central, trebuie să respecte o precauție deosebită.

FURAGIN conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI FURAGIN

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Adulților FURAGIN se indică în doza de 100-200 mg (2-4 comprimate) de 2-3 ori pe zi. Doza zilnică maximă – 600 mg.

Durata tratamentului constituie 7-10 zile, în funcție de severitatea bolii, eficacitatea tratamentului și starea funcțională a rinichilor. La necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 10-15 zile.

Copii. Medicamentul nu se utilizează la copii.

Mod de administrare

Medicamentul se administrează pe cale orală, imediat după luarea mesei, cu o cantitate mare de apă.

Dacă utilizați mai mult FURAGIN decât trebuie

Dacă ați luat prea mult din acest medicament (supradoză), adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat spital.

De obicei, manifestările toxice sunt posibile la pacienții cu tulburări ale funcției renale: dureri de cap, amețeli, tristețe patologică, senzație de amorțire și furnicături a membrelor, reacții alergice, grețuri, vomă, scăderea numărului de globule roșii în sânge; rar – afectarea funcției hepatice.

Dacă uitați să utilizați FURAGIN

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați FURAGIN

Luați întotdeauna medicamentul până terminați schema de tratament, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă întrerupeți medicamentul prea repede, infecția poate să reapară.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar aceste reacții adverse grave, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la secția de urgență a celui mai apropiat spital.

- reacții alergice grave cu senzație de sufocare, umflarea feței, limbii, gâtului cu dificultăți de înghițire și respirație (edem angioneurotic);
- pete roșii sau violete pe piele la nivelul palmelor și tălpilor picioarelor, zone asemănătoare urticariei, zone sensibile la nivelul gurii, ochilor și organelor genitale (eritem polimorf);
- îngălbenire a pielii sau a albului ochilor sau urină închisă la culoare și scaun decolorat: aceasta este un semn al problemelor de la nivelul ficatului.

Aceste reacții adverse apar foarte rar.

De asemenea, sunt posibile următoarele reacții adverse:

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 pacienți):

- amețeli, somnolență;
- tulburări de vedere;
- scăderea poftei de mâncare, balonarea abdomenului, grețuri.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 pacienți):

- tulburări senzoriale la nivelul mâinilor și picioarelor (neuropatie periferică);
- reacții pulmonare acute și cronice. Reacția pulmonară acută se dezvoltă foarte rapid și se manifestă prin insuficiența severă de aer, febră, dureri în cutia toracică, tuse cu/fără spută, creșterea numărului de eozinofile în sânge. La baza reacției pulmonare acute stă reacția de hipersensibilitate, care poate să se dezvolte timp de câteva ore, mai rar – timp de câteva minute. Reacția pulmonară acută poartă un caracter reversibil și dispare la întreruperea administrării medicamentului.

Reacția pulmonară cronică poate să se dezvolte peste un interval îndelungat de timp după oprirea tratamentului cu furazidină. Este caracteristic creșterea treptată a insuficienței de aer, accelerarea respirației, febră instabilă, creșterea eozinofilelor în sânge, tuse progresivă și inflamația plămânilor;

- vomă, diaree;
- erupții sub formă de papule, mâncărime;
- slăbiciune generală, creșterea temperaturii corporale;
- căderea temporară a părului.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10 000 pacienți):

- lipsa granulocitelor (globule albe speciale) în sânge, scăderea numărului de plachete (trombocitopenie), scăderea numărului de globule roșii din cauza incapacității de producere a lor de către măduva osoasă (anemie aplastică);
- reacții de hipersensibilitate, inclusiv mâncărime, erupții cutanate, urticarie,
- dureri de cap, hipertensiune intracraniană slab manifestată, inflamarea nervilor (nevrită, polinevrită);
- inflamația pancreasului (pancreatită);
- inflamația ficatului (hepatită), tulburări ale funcției hepatice;
- dermatită;
- dureri articulare.

FURAGIN colorează urina în galben-întunecat sau cafeniu.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ FURAGIN

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține FURAGIN

- *Substanța activă* este furazidina.

1 comprimat conține furazidină în recalcul la 100% substanță – 50 mg.

- *Celelalte componente sunt:* celactoză 80 (amestec de lactoză monohidrat și celuloză microcristalină în raport de 3:1), amidon de cartofi, stearat de magneziu, polisorbat-80.

Cum arată FURAGIN și conținutul ambalajului

FURAGIN se prezintă sub formă de comprimate rotunde, biconvexe, de culoare de la galbenă până la galbenă cu nuanță oranj, cu colorare ușor neomogenă a suprafeței, se admite prezența unor incluziuni de culoare mai intensă.

FURAGIN este disponibil în cutii cu 3 blistere a câte 10 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Kievmedpreparat SAP,

str. Saksaganskogo, 139, 01032, or. Kiev, Ucraina.

Fabricantul

Kievmedpreparat SAP,

str. Saksaganskogo, 139, 01032, or. Kiev, Ucraina.

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>