

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

LUGS

11.7 mg/ml, spray bucofaringian.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luăți întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Lugs și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lugs
3. Cum să utilizați Lugs
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lugs
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE LUGS ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Lugs face parte din grupa farmacoterapeutică - medicamente care sunt utilizate pentru boli ale gâtului. Antiseptice. Este utilizat pentru afecțiuni inflamatorii ale gâtului și ale faringelui (tonzilită, faringită, angină, glossită, stomatită aftoasă) - ca parte a terapiei complexe.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI LUGS

Nu utilizați Lugs

- hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1;
- hiperfuncția glandei tiroide;
- cardiace decompensate;
- insuficiență renală;
- insuficiență hepatică;
- cercetare sau tratament cu iod radioactiv (cu 2 săptămâni înainte și după studiu sau terapie);
- vârsta sub 8 ani.

Aveți grijă deosebită când utilizați Lugs

Medicamentul nu este destinat administrării orale. Nu inhalați și / sau nu înghițiți medicamentul. Folosiți cu prudență la laringită datorită posibilității de laringism, cu tuberculoză, diateză hemoragică.

Evitați contactul cu ochi.

Utilizarea altor medicamente

Nu utilizați în același timp cu soluție de peroxid de hidrogen și alte dezinfectante.

Sarcina și alăptarea

Nu utilizați în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu este afectată.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI LUGS

Doze

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 8 ani

Aplicați medicamentul de 1-2 ori pe zi (cu o pauză de cel puțin 6 ore).

Mod de administrare

Se va administra după mese.

Setați pulverizatorul în sus apăsați capacul de 1-2 ori, astfel încât soluția să ajungă la sticla de pulverizare și, după apăsarea acesteia, să fie pulverizată. După introducerea nebulizatorului 2-3 cm în cavitatea orală, închideți gura, rețineți respirația și apăsați de 2 ori pe capac astfel încât o irigare să se efectueze spre dreapta, a doua - spre stânga. Clatiți cu apă caldă partea detașabilă după administrare.

Durata administrării

Cursul tratamentului depinde de gravitatea și evoluția bolii, precum și de natura terapiei concomitente.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Reacțiile adverse sunt indicate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență:

foarte frecvente (>1/10),

frecvente (>1/100 și <1/10),

mai puțin frecvente (>1/1000 și <1/100),

rare (>1/10000 și <1/1000),

foarte rare (<1/10000),

cu frecvență necunoscută (nu pot fi estimate din datele disponibile).

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

În cazul utilizării prelungite, se pot manifesta simptome de iodism (nas curbat, urticarie, sindrom Quinke, rupere, salivare, erupție cutanată, slăbiciune musculară, letargie), urticarie.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5 CUM SE PĂSTREAZĂ LUGS

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6 CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Lugs

100 g soluție conțin iod 1g.

Excipienți: iodură de potasiu, glicerină, tinctură de eucalipt (conține etanol), apă purificată.

Cum arată Lugs și conținutul ambalajului

Soluție. Câte 20 ml în flacon cu pulverizator mecanic. Câte 1 flacon împreună cu prospect pentru pacient se plasează în cutie individuală din carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul Deținătorul certificatului de înregistrare

"DKP "Fabrica farmaceutică" SRL,
Ucraina, 10014, reg. Jitomir, or. Jitomir,
r-ul Koroliov, str. Lermontovska, 5

Fabricantul

"DKP "Fabrica farmaceutică" SRL,
Ucraina, 12430, reg. Jitomir, r-1 Jitomir,
s. Stanishivka, str. Koroliova, 4.

Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>