

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Tătăneasă Artolia 100 mg/10 mg/g unguent

Tinctură de tătăneasă (Symphyti tinctura)

Vitamina E

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 7 zile de tratament nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Tătăneasă Artolia și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tătăneasă Artolia
3. Cum să utilizați Tătăneasă Artolia
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tătăneasă Artolia
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE TĂTĂNEASĂ ARTOLIA ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Tătăneasă Artolia unguent conține tinctură de tătăneasă și vitamina E.

Medicament tradițional pe bază de plante utilizat pentru ameliorarea simptomatică a entorselor minore și vânătăilor.

Produsul este un medicament tradițional din plante pentru utilizare în indicația specificată exclusiv pe baza utilizării îndelungate.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI TĂTĂNEASĂ ARTOLIA

Nu luați Tătăneasă Artolia dacă:

- Sunteți alergic (hipersensibil) la naftifină sau la oricare dintre celelalte componente ale Tătăneasă Artolia unguent (enumerate la punctul 6).

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Tătăneasă Artolia.

Pentru a evita reacțiile adverse, se recomandă aplicarea mai întâi a unei cantități mici de unguent pe tegumente pentru a determina sensibilitatea individuală.

Nu se aplică pe tegumentele cu manifestări ale unei reacții alergice, pe mucoase, răni deschise.

Se va evita nimerirea unguentului în ochi.

Din cauza lipsei datelor adecvate a se evita utilizarea la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Tătăneasă Artolia împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Medicamentul este contraindicat în timpul sarcinii și în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu se cunoaște influența medicamentului asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Informații importante despre unele componente ale Tătăneasă Artolia.

Conține parahidroxibenzoat de metil (E 218). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

3. CUM SĂ UTILIZAȚI TĂTĂNEASĂ ARTOLIA

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Adulți și vârstnici:

Se va aplica într-un strat subțire de 2 ori pe zi.

Nu se recomandă utilizarea la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Durata curei de tratament

A nu se utiliza mai mult de 10 zile.

Dacă simptomele persistă în timpul utilizării medicamentului, trebuie consultat un medic sau un medic calificat.

Mod de administrare

Administrare cutanată.

Dacă luați mai mult Tătăneasă Artolia decât trebuie

În caz de supradozaj accidental, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să luați utilizați Tătăneasă Artolia

Dacă ați omis o doză, continuați regimul de tratament obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Tătăneasă Artolia

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Nu se cunosc.

Dacă apar reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TĂTĂNEASĂ ARTOLIA

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Tătăneasă Artolia

- Substanța activă este tinctura de tătăneasă (*Symphyti tinctura*) și vitamina E. Fiecare gram unguent conține tinctură de tătăneasă (*Symphyti tinctura* (1:10), extragent - etanol 40%) – 100 mg, vitamina E soluție uleioasă 98% (în recalcul la conținut de vitamina E 100%) – 10 mg.

- Celelalte componente sunt: parafină albă moale, ulei de măsline, glicerol, emulgator T-2, parahidroxibenzoat de metil (E 218), aromă 482.056, apă purificată.

Cum arată Tătăneasă Artolia și conținutul ambalajului

Tătăneasă Artolia se prezintă sub forma unui unguent de culoare de la crem până la brun-deschis, cu miros caracteristic.

Este disponibil câte 40 g în tub de Al sau 50 g în borcan din sticlă. Câte 1 tub sau borcan în cutie.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

"DKP "Fabrica farmaceutică" SRL,

Ucraina, 10014, reg. Jitomir, or. Jitomir,

r-ul Koroliiov, str. Lermontovska, 5

Fabricantul

“DKP “Fabrica farmaceutică” SRL,
Ucraina, 12430, reg. Jitomir, r-nul Jitomir,
s-l Stanishivka, str. Koroliova, 4

Acest prospect a fost aprobat în martie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>