

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### DECASAN 0,2 mg/ml soluție de inhalat prin nebulizator

*Decametoxină*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, sau farmacistului

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Decasan și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Decasan
3. Cum să utilizați Decasan
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Decasan
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE DECASAN ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Decasan conține în calitate de substanță activă decametoxina, care este un medicament cu acțiune împotriva bacteriilor, fungilor, protozoarelor și virusurilor.

Decametoxina este înalt activă față de microorganismele rezistente la antibiotice.

Decasan se utilizează pentru tratamentul afecțiunilor inflamator-purulente ale tractului respirator și plămânilor (abces pulmonar, boala bronșiectatică, hipoplazie pulmonară chistică complicată cu supurație, bronșită cronică în faza de acutizare).

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI DECASAN**

##### **Nu utilizați Decasan:**

- dacă aveți alergie (hipersensibilitate) la componentele medicamentului.

##### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Administrarea îndelungată a Decasan nu provoacă reacții toxice.

Încălzirea medicamentului până la 38 °C înainte de administrare sporește eficacitatea lui.

##### **Copii**

Lipsesc date privind administrarea la copii.

##### **Decasan împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați luat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

##### **Sarcină și alăptare**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
Nu sunt atenționări privind administrarea în sarcină și perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor**

Nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **3. CUM SĂ UTILIZAȚI DECASAN**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul sau asistenta medicală. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur.

Decasan se administrează:

- prin cateter nazal câte 5-10 ml 1 dată pe zi;
- prin inhalări cu ultrasunete câte 5-10 ml de 1-2 ori pe zi.

Durata curei de tratament – 2-4 săptămâni.

Dacă aveți impresia că efectul soluției Decasan este prea puternic sau prea slab, discutați cu medicul dumneavoastră.

### **Dacă utilizați mai mult Decasan decât trebuie**

Din cauza lipsei absorbției sistemice cazuri de supradozare nu s-au semnalat.

### **Dacă ați uitat să utilizați Decasan**

Dacă ați uitat să utilizați o doză de Decasan, medicamentul se va utiliza de cum vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, utilizați-o doar pe aceasta și continuați să utilizați medicamentul cu intervale obișnuite între doze. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să luați Decasan**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Decasan poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Foarte rare (pot apărea până la 1 din 10 000 pacienți):*

- hipersensibilitate individuală, inclusiv erupții cutanate, senzația de arsură, uscăciune, mâncărime după administrarea topică a medicamentului;
- la administrarea endotraheopulmonară poate apărea o senzație de arsură în piept, care dispare de sine stătător peste 20-30 min după finisarea procedurii.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul oficial al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ DECASAN**

A se păstra la loc ferit de lumină, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se congela.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține Decasan**

- *Substanța activă* este decametoxina.

1 ml soluție conține 0,2 mg decametoxină.

- *Celelalte componente sunt:* clorură de sodiu, apă pentru injecții.

### **Cum arată Decasan și conținutul ambalajului**

Decasan se prezintă sub formă de lichid transparent incolor.

Decasan este disponibil în cutii de carton cu 10 recipiente unidoză a câte 2 ml soluție.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina,  
str. N. Amosov 10, 03680, or. Kiev.

#### **Fabricantul**

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina,  
str. Kobzarskaya 108, 18030, Cerkassy.

**Acest prospect a fost revizuit în Mai 2020.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>